https://nhathuocngocanh.com/

GC-237-15/157

MẪU HỘP AULAKAN XIN LƯU HÀNH

Kích thước thực: 10,0 cm x 7,0 cm x 1,7 cm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 9/9/2015

Ngày 09 tháng 04 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
M.S.D.N: 0302408317 - C.T.C.P
QUẬN 3 - T.PHỐ CHÍ MINH

DS. Lê Thanh Sử

https://nhathuocngocanh.com/

MẪU VỈ AULAKAN XIN LƯU HÀNH

Kích thước thực: 8,8 cm x 6,2 cm

Ngày 9 tháng 4 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

M.S.D.N: 0302408317 - C.T.C.P - QUẬN 3 - T.PHỐ CHÍ MINH

DS. Lê Thanh Sử

https://nhathuocngocanh.com/

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XIN LƯU HÀNH

Kích thước thực: 9,2 cm x 15,0 cm

aulakan®

Viên nén bao phim

CÔNG THỨC: Công thức cho 1 viên nén bao phim
- Cao khô lá bạch quả chứa 24% flavonoid toàn phần ... 40 mg
(Extractum folium Ginkgo biloba siccum)
- Tá dược: Lactose monohydrat, Microcrystalline cellulose, Nipagin, Nipasol, Talc, Colloidal silica anhydrous, Magnesi stearat, Tinh bột ngô, Hydroxypropyl Methylcellulose 615, Titan dioxid, Tween 80, Oxyd sắt đỏ, Oxyd sắt vàng, Polyethylen glycol 6000.

CHỈ ĐỊNH:
Suy giảm trí nhớ; hỗ trợ điều trị triệu chứng đau cách hồi của bệnh động mạch chi dưới mạn tính (giai đoạn II), cải thiện một số triệu chứng chóng mặt, ù tai, giảm thính lực, suy võng mạc do thiếu máu não cục bộ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Pha nhồi máu não cấp, nhồi máu tim cấp, chảy máu não, phụ nữ có thai.
- Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết.

THẬN TRỌNG:
Ginkgo biloba không phải là thuốc hạ huyết áp và không thể dùng để điều trị thay thế cho các thuốc chống cao huyết áp đặc trị.
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không nên dùng Ginkgo cho phụ nữ có thai và cho con bú vì chưa có tài liệu chứng minh tính an toàn của thuốc trên những đối tượng này.
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:
Không ảnh hưởng đến lái xe và vận hành máy móc

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Không dùng cùng thuốc chống đông máu, chỉ huyết, chống kết tập tiểu cầu

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Hiếm gặp các trường hợp như rối loạn tiêu hóa, rối loạn da, nhức đầu.
Thông báo ngay cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:
Người lớn: uống mỗi lần 1 viên. Ngày 3 lần, uống trong bữa ăn.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:
- Dùng liều cao có thể xảy ra tiêu chảy, buồn nôn, nôn, kích ứng và bồn chồn.
- Khi có quá liều cần điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim.
BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

- *Viên nén bao phim AULAKAN đạt theo TCCS.*
- *Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*
- *Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.*
- *Sản xuất tại: Công ty cổ phần dược phẩm MEDISUN. 521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương*

Theo hợp đồng gia công với: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Bên đặt gia công:

F.T.PHARMA **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2**
Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

Bên nhận gia công:

MEDISUN **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDISUN**
521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

Ngày 09 tháng 04 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0302408317 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

DS. Lê Thanh Sử

BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy