

## Gel dùng đường trực tràng

# BIBONLAX<sup>®</sup> Adults

**1. Dạng bào chế:** Gel dùng đường trực tràng

**2. Công thức:** Cho 1 tuýp 8g:

Sorbitol .....4,0g

Natri citrat .....0,576g

Tá dược: Natri laurylsulfat, methyl paraben, propyl paraben, natri carboxymethyl cellulose, agar - agar, dầu paraffin, nước tinh khiết.....vd 8,0 g

**3. Chỉ định:**

- Điều trị táo bón do các nguyên nhân ở vùng trực tràng và hậu môn.
- Chuẩn bị nội soi trực tràng.

**4. Cách dùng và liều dùng:**

*Dùng cho người lớn:* Bơm 1 tuýp/ngày. Dùng trước thời điểm dự định đi đại tiện 5 - 20 phút.

**5. Chống chỉ định:**

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

**6. Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Không.

**7. Tác dụng không mong muốn:**

Dùng thuốc kéo dài có thể gây cảm giác rất bỏng tại chỗ và hãn hữu gây viêm đại trực tràng xung huyết.

*Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc*

**8. Quá liều:** Khi sử dụng quá liều có thể chuyển từ nhuận tràng sang tẩy, cần ngưng thuốc và sử dụng đúng liều lượng quy định

**9. Các đặc tính dược động học:**

Sorbitol được hấp thu kém qua đường tiêu hoá sau khi đặt trực tràng. Một phần rất nhỏ sorbitol không chuyển hoá được đào thải qua thận, phần còn lại được đào thải dưới dạng CO<sub>2</sub> khi thở ra trong quá trình hô hấp.

**10. Các đặc tính dược lực học:** Thuốc có tác dụng nhuận tràng, tẩy.

- Cơ chế gây nhuận tràng:

+ Sorbitol: Là thuốc thuộc nhóm thuốc nhuận tràng thẩm thấu, thuốc thúc đẩy sự hydrat - hoá các chất chứa trong ruột. Sorbitol kích thích tiết cholecystokinin - pancreazymín và tăng nhu động ruột nhờ tác dụng nhuận tràng thẩm thấu.

+ Natri citrat thuộc nhóm thuốc nhuận tràng thẩm thấu - muối, gồm các polyalcohol hoặc các muối hoà tan. Cơ chế tác dụng của các chất này là làm tăng áp suất thẩm thấu trong lòng ruột gây ra hiện tượng lưu giữ nước, làm mềm phân và tăng nhu động ruột.

**11. Bảo quản:** Để nơi khô, nhiệt độ từ 15 - 30<sup>0</sup>C, tránh ánh sáng.

**12. Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**13. Đóng gói:** Tuýp 8g, 10 tuýp/hộp.

**14. Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

*Để xa tầm tay trẻ em*

*Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

*Trụ sở chính:* 170 Đường La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Tel: 024.35113357 - Fax: 024.38511280

*Sản xuất tại:* NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Lô 15, Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

Tel: 024.35250736

