

0164

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/3/2019

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa:
Cao khô hỗn hợp dược liệu: 480 mg
(Gồm
Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*):
2g
Nhân trần (*Herba Adenosmatis caerulei*):
2g
Bồ công anh (*Herba Lactuceae indicae*): 1g)
Tá dược: vớ 1 viên.

TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Uống sau bữa ăn
- Người lớn: 3 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em: 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày.
THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ:
- Viêm gan do siêu vi B: mỗi đợt điều trị ít nhất 3 tháng; Có thể uống lâu dài.
- Các trường hợp khác, mỗi đợt điều trị thông thường là 30 ngày.

Số lô SX:
NSX: dd/mm/yy
HD: dd/mm/yy

MẪU NHẬN HỘP BÌNH CAN

Bình Can


Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MÊ DI SUN
Số 521 - Khu phố An Lợi - Phường Hòa Lợi -
Thị trấn Dư Hàng - Huyện Dư Hàng -
Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0274) 3588.038 - Fax: (0274) 3588.287



Rx Thuốc kê đơn

GMP-WHO

Bình Can



MEDISUN

CHỈ ĐỊNH: Hỗ trợ điều trị:
- Viêm gan mạn do siêu vi B, có HBsAg dương tính.
- Viêm gan cấp và mạn tính do mọi nguyên nhân.
- Các biểu hiện do suy giảm chức năng gan: Mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, vàng da.
- Dij ứng, mẫn ngứa ngoài da.
- Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan, ung thư gan.
- Viêm túi mật, ống dẫn mật.


CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Người mẫn cảm với thành phần của thuốc, phụ nữ có thai, người tỳ vị hư hàn.

BẢO QUẢN:
- Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SĐK:

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Bình Can



Rx Thuốc

Bình Can

GMP-WHO

Thuốc kê đơn



Bình Can

Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*) 2g
Nhân trần (*Herba Adenosmatis caerulei*) 2g
Bồ công anh (*Herba Lactuceae indicae*) 1g

Bình Can

Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*) 2g
Nhân trần (*Herba Adenosmatis caerulei*) 2g
Bồ công anh (*Herba Lactuceae indicae*) 1g

Bình Can

Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*) 2g
Nhân trần (*Herba Adenosmatis caerulei*) 2g
Bồ công anh (*Herba Lactuceae indicae*) 1g

Bình Can

Số lô SX: **MEDISUN** Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Mê Di Sun
HD: dd/mm/yy

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

BÌNH CAN

Để xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng
không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TÊN THUỐC: BÌNH CAN

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC:

Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao khô hỗn hợp dược liệu: 480 mg

(Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*): 2g

Nhân trần (*Herba Adenosmatis caerulei*): 2g

Bồ công anh (*Herba Lactucae indicae*): 1g)

Tá dược: Tinh bột mì, Talc, Magnesi stearat, Calci carbonat, Nang số 0 màu xanh lá cây, vừa đủ 1 viên.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH:

Hỗ trợ điều trị:

- Viêm gan mạn do siêu vi B, có HBsAg dương tính.
- Viêm gan cấp và mạn tính do mọi nguyên nhân.
- Các biểu hiện do suy giảm chức năng gan: Mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, vàng da.
- Dị ứng, mẩn ngứa ngoài da.
- Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan, ung thư gan.
- Viêm túi mật, ống dẫn mật.

LIỀU DÙNG – CÁCH DÙNG: Uống sau bữa ăn

- Người lớn: 3 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em: 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày.

Thời gian điều trị:

- Viêm gan do siêu vi B: Mỗi đợt điều trị ít nhất 3 tháng; Có thể uống lâu dài.
- Các trường hợp khác: Mỗi đợt điều trị thông thường là 30 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người mẫn cảm với thành phần của thuốc, người bị tỳ vị hư hàn

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Dùng thận trọng trong những ngày đang bị hành kinh.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng gì với người vận hành máy móc tàu xe.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỊ CỦA THUỐC:

Chưa có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Chưa có hiện tượng gì xảy ra, nếu có hiện tượng bất thường khác khi dùng, nên ngừng sử dụng và báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ biết để giúp đỡ xử lý.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có thông tin về quá liều. Không có thông tin tham khảo đáng tin cậy và không có các thông báo từ dữ liệu thử nghiệm.

Thông báo với bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.



ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

Diệp hạ châu:

- Diệp hạ châu có vị ngọt kèm theo vị hơi đắng, tính mát, chúng có tác dụng sát trùng, tiêu độc, thông huyết, điều hòa kinh nguyệt ở chị em phụ nữ, giúp sáng mắt, hạ nhiệt. Ngoài ra các nhà khoa học còn tìm ra được rằng chúng có tác dụng diệt nấm và một số loại khuẩn nhờ vào tác dụng của hoạt chất acid phenolic và flavonoid có trong loài cây này, hay hoạt chất Coderacin lại được dùng để chế thuốc nhỏ mắt, mỡ tra mắt, diệt một số loại vi khuẩn gây hại cho mắt.
- Chúng còn được dùng để chữa chứng đau yết hầu, bị viêm cổ họng, giúp chữa trị cho người bị mụn nhọt, đinh râu, người mắc bệnh viêm da thần kinh, trẻ em bị tưa lưỡi, có nốt chàm trên má, phụ nữ sau sinh bị sản hậu ứ huyết. Ngoài những bệnh kể trên chúng còn được người ta dùng để trị rắn cắn, chữa bệnh sưng đau đầu khớp.

Nhân trần:

- Trong y học Trung Quốc cây nhân trần được dùng để trị bệnh gan và túi mật, giảm sốt, chống viêm sung và lợi tiểu, dùng làm cao đắp chữa đau đầu.
- Chủ trị các chứng hoàng đản, sỏi mật, mụn nhọt, ghè, phong chẩn.
- Bảo vệ gan chống nhiễm độc của carbon tetrachloride.
- Hạ lipid huyết, làm giãn mạch vành và hạ huyết áp.
- Trong nhân trần có chứa tinh dầu giúp ức chế các loại nấm gây bệnh ngoài da.

Bồ công anh:

- Bồ công anh (Đông y cho là thuộc về hàn lương) được áp dụng phương pháp lỏng cử động đã thể hiện tác dụng an thần.
- Flavonoid của Bồ công anh đã được nghiên cứu tác dụng sinh học thấy có tác dụng ức chế men Oxy hóa khử peroxydase và catalase máu chuột cống trắng. Những thí nghiệm tiến hành với huyết thanh người cũng cho những kết quả ức chế men oxy hóa khử rõ rệt.
- Theo tài liệu nước ngoài, tại một số nước, người ta có sử dụng và nghiên cứu những loài Lactuca khác như L.virosa, L. sativa (rau diếp ăn của Việt Nam), thấy những cây này không độc và có tác dụng trên hệ thần kinh trung ương gây ngủ nhẹ.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 05 vi x 10 viên nang cứng + 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

TIÊU CHUẨN: TCCS số 0650-038-2015

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC:

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN

Địa chỉ: Số 521, Khu phố An Lợi, Phường Hoà Lợi, TX. Bến Cát, T. Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3589 036 – Fax: (0274) 3589 297



TU.QU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2018



DS. LÊ MINH HOÀN