

VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA TINH HOA CHÂU ÂU



BioLife® VagiCare
Hỗ trợ điều trị Nhiễm Khuẩn Âm Đạo



Lactobacillus acidophilus 1,2 tỷ lợi khuẩn

Giúp khôi phục cân bằng hệ vi sinh âm đạo, duy trì pH lý tưởng



Dịch chiết khô cây câu gai

Chứa 63 hợp chất quý giúp kháng khuẩn, chống viêm, điều trị hiệu quả nhiễm khuẩn âm đạo



Dịch chiết khô Nam việt quất

Giúp ngăn vi khuẩn tấn công vào niêm mạc âm đạo, phòng chống nhiễm khuẩn



Acid lactic

Có vai trò như một hệ đệm, giúp phục hồi pH trong âm đạo

Mục đích sử dụng

- Hỗ trợ điều trị nhiễm khuẩn âm đạo.
- Giảm các tình trạng âm đạo tiết dịch quá nhiều, có mùi khó chịu, ngứa, kích ứng và rát.
- Phục hồi pH tự nhiên của âm đạo.

Các ưu điểm nổi bật

- Công thức dùng một lần một ngày
- Không chứa kháng sinh

Hướng dẫn sử dụng (đối với người lớn)

Sử dụng BioLife® VagiCare trong một liệu trình điều trị kéo dài 6 ngày. Đặt một viên đặt vào bên trong âm đạo 1 lần/ngày trước khi đi ngủ. Phải chú ý rửa sạch tay và nước ấm và xà phòng, và giữ khu vực xung quanh âm đạo sạch và khô ráo trước khi sử dụng viên đặt. Trong trường hợp âm đạo bị khô, khuyến cáo làm ướt

Đặt viên đặt

Cắm viên đặt bằng một tay, sử dụng tay còn lại mở rộng môi âm hộ và thận trọng đưa viên đặt vào bên trong âm đạo càng sâu càng tốt.



Lactobacillus acidophilus 1,2 tỷ lợi khuẩn

Giúp khôi phục cân bằng hệ vi sinh âm đạo, duy trì pH lý tưởng



Dịch chiết khô cây câu gai

Chứa 63 hợp chất quý giúp kháng khuẩn, chống viêm, điều trị hiệu quả nhiễm khuẩn âm đạo



Dịch chiết khô Nam việt quất

Giúp ngăn vi khuẩn tấn công vào niêm mạc âm đạo, phòng chống nhiễm khuẩn



Acid lactic

Có vai trò như một hệ đệm, giúp phục hồi pH trong âm đạo

viên đặt bằng nước trước khi đặt vào bên trong âm đạo. Không được sử dụng quả lê lâu khuyến cáo. Trong một số trường hợp, viên đặt không tan hoàn toàn, tạm thời để lại một ít cặn bên trong âm đạo. Vui lòng lưu ý rằng đây là tình trạng bình thường, và phần cặn sẽ ra khỏi âm đạo sau một thời gian.

Không được sử dụng BioLife® VagiCare liên tục trong hơn 30 ngày trong một liệu trình điều trị.

Có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm sau 4 ngày ngừng sử dụng.