

**PHIL**  
INTER PHARMA

**PHIL INTER PHARMA**

No 25, street No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong

Tel: 0650. 3767 040~ 044. Fax: 0650. 3767 039


**MẪU NHÃN HỘP**

Sản phẩm : Viên nang **BUEMINT**

Kích thước hộp : 120 x 108 x 42 mm

Tỷ lệ : 70%

Nội dung : như mẫu



60 Soft Caps. (5 Caps x 12)

**Bluemint**

WHO-GMP

**L-Cystine 500mg**



**Bluemint**

60 Soft Caps. (5 Caps x 12)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.  
READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USING.

**[Composition]**

Each soft capsule contains  
L-Cystine.....500mg

**[Indication]**

- General malaise.
- Drug-induced dermatitis.
- Pigmentation of chloasma, ephelis, sunburn, ect.
- Eczema, urticaria, skin rash and acne.
- Adjunctive treatment for epidermal symptoms of splitting nail, toenail and hair.

**[Administration, contraindications]**

See insert paper  
**[Package]** 12 blisters x 5 soft capsules/box.

**[Storage]**  
Preserve in light-resistant and cool place.

**PHIL** Manufactured by  
**PHIL INTER PHARMA**  
25, Street No. 8, VSIP,  
Thuan an, Binh Duong

WHO-GMP

**L-Cystine 500mg**



**Bluemint**

60 viên nang mềm (5 x 12 vỉ)

SEK:  
Số lô:  
NSX:  
HSD:

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

**[Thành phần]**

Mỗi viên nang mềm chứa  
L-Cystine.....500mg

**[Chỉ định]**

- Suy nhược toàn thân.
- Viêm da do thuốc.
- Sạm da, tàn nhang, sạm nắng...
- Eczema, mề đay, phát ban da, mụn trứng cá.
- Hỗ trợ điều trị trong các bệnh biểu bì, làm móng tóc khô giòn dễ gãy.

**[Cách dùng, chống chỉ định]**

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**[Bảo quản]**

Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

**[Đóng gói]**

12 vỉ x 5 viên nang mềm/hộp

**PHIL** Sản xuất tại CTY TNHH  
**PHIL INTER PHARMA**  
25, đường số 8, VSIP,  
Thuan An, Binh Duong



TP. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG



LÊ THANH HIỆU


**Bluemint**

60 Soft Caps. (5 Caps x 12)

No. 25, Street No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong  
Tel: 0650. 3767 040~ 044 Fax: 0650. 3767 039

## MẪU NHÃN VỈ


Sản phẩm : Viên nang mềm BLUEMINT  
Kích thước : 38 x 100 mm  
Tỷ lệ : 100%  
Nội dung : như mẫu.



Số lô, HSD sẽ được dập nổi trên vỉ

# MẪU NHÃN TOA THUỐC

Sản phẩm : Viên nang mềm BLUEMINT.  
Kích thước : 180 x 89 mm  
Tỷ lệ : 1/1  
Nội dung : như mẫu.



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Để xa tầm tay trẻ em.  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ

Read dosage and administration carefully before using.  
Keep out of reach of children.  
For any more information, please consult your doctor or pharmacist

**Viên nang mềm BLUEMINT**  
(500mg L-cystin)  
SDK:.....

**BLUEMINT soft cap.**  
(L-cystine 500mg)  
Visa No:.....

**THÀNH PHẦN**

Mỗi viên nang mềm chứa:

*Hoạt chất:*

L-cystin..... 500mg

*Tá dược:*

Đầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong trắng, lecithin, gelatin, glycerin đậm đặc, D-sorbitol, methyl paraben, propyl paraben, ethyl vanilin, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt đen, nước tinh khiết

**CHỈ ĐỊNH**

Hỗ trợ điều trị các trường hợp sau:

- Hỗ trợ điều trị viêm da do thuốc.
- Sạm da, tàn nhang, sạm nắng.
- Eczema, mề đay, phát ban da, mụn trứng cá.
- Hỗ trợ điều trị trong các bệnh biểu bì làm móng tóc khô giòn dễ gãy.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG**

Người lớn: Liều dùng thông thường là 2-4 viên/ ngày. Có thể dùng liên tục BLUEMINT trong thời gian 10-20 ngày mỗi tháng.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Bệnh nhân quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

**THẬN TRỌNG**

1. Nếu xảy ra buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, táo bón, ngứa, chán ăn và khó chịu ở bụng, nên ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
2. Tuân theo đúng liều dùng được đề nghị.
3. Trong trường hợp dùng thuốc đối với đối với trẻ em phải có sự hướng dẫn của người lớn. Không dùng thuốc này cho trẻ em dưới 6 tuổi.
4. Nếu thuốc không có hiệu quả sau khi dùng 2 tuần, ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

**CẢNH BÁO**

1. Không nên dùng BLUEMINT cho những bệnh nhân bị suy nhược chức năng thận nặng và hôn mê gan.
2. Nên dùng BLUEMINT thận trọng ở những bệnh nhân bị cystin niệu.

**TƯƠNG TÁC THUỐC**

Chưa có báo cáo.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú khi thật sự cần thiết và dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ.

**TÁC DỤNG PHỤ**

Chưa có báo cáo.

*Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**QUÁ LIỀU**

Chưa có báo cáo.

**DÓNG GÓI:** Hộp chứa 12 vỉ x 5 viên nang.

**BẢO QUẢN:** Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30°C.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

\* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** Tiêu chuẩn cơ sở.

Sản xuất tại  
Công ty TNHH PHIL INTER PHARMA  
Số 25, đường số 8, VSIP, Thuận An, Bình Dương.

**COMPOSITION**

Each soft capsule contains:

*Active ingredient:*

L-cystine..... 500mg

*Inactive ingredients:*

Soybean oil, palm oil, white bee's wax, lecithin, gelatin, concentrated glycerin, D-sorbitol, methyl paraben, propyl paraben, ethyl vanilin, red ferric oxide, black ferric oxide, purified water.

**INDICATION**

Supplemental treatment in cases of:

- Supplemental treatment of drug-induced dermatitis.
- Pigmentation of chloasma, ephelis, sunburn, etc.
- Eczema, urticaria, skin rash and acne.
- Adjunctive treatment for epidermal symptoms of splitting nail, toenail and hair.

**DOSAGE & ADMINISTRATION**

Adults: Usual dosage is 2-4 capsules a day. BLUEMINT can be continually administered during 10-20 days a month.

**CONTRAINDICATIONS**

Patients with hypersensitivity to any component of this medicine.

**PRECAUTIONS**

1. When nausea, vomiting, diarrhea, constipation, itching, anorexia and abdominal discomfort occur, the patient should discontinue the administration and then, consult with physician or pharmacist.
2. Keep a recommended dosage.
3. In case of administering to children, use it under the direction of protector. Do not administer this drug to children under 6 years.
4. If it does not have effect after administering for 2 weeks, stop administering and consult physician or pharmacist

**WARNINGS**

1. BLUEMINT should not be used in patients who have severe renal dysfunction and hepatic coma.
2. BLUEMINT should be used with caution in patients with cystinuria.

**INTERACTIONS**

None reports.

**PREGNANCY AND LACTATION**

This medicine should be administered in pregnant women and nursing mother only if necessary and under close monitoring of doctor.

**ADVERSE EFFECTS**

None reports.

*Inform your doctor in case of undesirable effects related to drug use.*

**OVERDOSE**

No reports of overdose.

**PACKAGE:** Box contains 12 blisters x 5 capsules.

**STORAGE:** In a well-closed container, dry and cool place, below 30°C.

**SHELF LIFE:** 36 months from manufacturing date.

\* Do not use if the drug is out of date.

**SPECIFICATION:** Home standard.

Manufactured by  
**PHIL INTER PHARMA Co., LTD.**  
No. 25, street No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong.

**TP. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG**



**LÊ THANH HIỆU**