

Hộp Cadirovib: 82 x 8 x 25mm

Indications, contra-indications, dosage, administration:
Please refer to enclosed package insert.

Storage:
In a cool and dry place, below 30°C, protect from direct sunlight. Do not refrigerate.

Manufacturer:
US PHARMA USA CO., LTD.
Lot B1 - 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, H.C.M.

Cadirovib

Acyclovir 5%

Thành phần:
Mỗi tuyp kem chứa:
Acyclovir.....250mg

Chi định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Không bảo quản gần đá tủ lạnh.

Tên sản xuất:
Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
Lô B1 - 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, Tp.HCM.

Cadirovib

Acyclovir 5%

Composition:
Each tube of cream contains:
Acyclovir.....250mg

Tube 5g cream

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 8 / 11 / 2013

M

309 / 2142

<https://nhathuocngocanh.com/>

Tuyp Cadirovib: 76 x 46mm

Cadirovib

Acyclovir 5%

FOR EXTERNAL USE ONLY / Tube 5g

Keep out of reach of children.
Read the package insert carefully before use.

Manufacturer:
US PHARMA USA CO., LTD.
Lot B1 - 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, H.C.M.

Cadirovib

Acyclovir 5%

Thành phần:
Mỗi tuyp kem chứa:
Acyclovir.....250mg

Chi định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Không bảo quản gần đá tủ lạnh.

Tên sản xuất:
Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
Lô B1 - 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, Tp.HCM.

Cadirovib

Acyclovir 5%

Composition:
Each tube of cream contains:
Acyclovir.....250mg

Tube 5g cream

Bảo quản:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Không bảo quản gần đá tủ lạnh.

Thành phần:
Mỗi tuyp kem chứa:
Acyclovir.....250mg

Chi định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản:
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Không bảo quản gần đá tủ lạnh.

Tên sản xuất:
Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**
Lô B1 - 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, Tp.HCM.

Storage:
In a cool and dry place, below 30°C, protect from direct sunlight. Do not refrigerate.

Specifications:
Manufacturer:

Manufacturer:
US PHARMA USA CO., LTD.
Lot B1 - 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, H.C.M.

Tuyp 5g kem
Kem bôi da

Cadirovib

Acyclovir 5%

FOR EXTERNAL USE ONLY

SDK (Reg. No.):
Số lô SX (Batch No.):
Ngày SX (Mfg.):
HD (Exp.):

SDK (Reg. No.):
Số lô SX (Batch No.):
Ngày SX (Mfg.):
HD (Exp.):



CADIROVIB

Kem bôi ngoài da Acyclovir 5%

Thành phần

Mỗi tuýp 5g thành phẩm kem chứa:

Acyclovir

250mg

Tá dược: Emulsol AE, Cetyl Alcohol, Methyl Paraben, Dầu Paraffin, Propylen Glycol, Natri metabisulfit, Butylated hydroxytoluen (BHT), PEG 4000, Natri Lauryl Sulfat, Propyl paraben, EDTA.

Phân loại

Acyclovir là hoạt chất thuộc nhóm thuốc kháng virus.

Chỉ định

CADIROVIB được sử dụng trong các trường hợp nhiễm virus *Herpes simplex* ở da và niêm mạc, kể cả Herpes sinh dục.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Liều lượng và cách dùng

Liều dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ định của Bác sĩ điều trị. Thời gian điều trị liên tục từ 5-10 ngày.

Liều dùng thông thường như sau: Bôi 1 lớp mỏng lên vùng da bị nhiễm 4-6 lần/ngày, cách nhau mỗi 4 giờ.

Điều trị bằng Acyclovir phải được bắt đầu càng sớm càng tốt khi có dấu hiệu và triệu chứng của bệnh.

Cách dùng

Rửa sạch vùng da bị nhiễm, thoa 1 lớp mỏng CADIROVIB.

Lưu ý: Nên dùng găng tay y tế hoặc que bông bôi thuốc để tránh lây nhiễm.

Chống chỉ định

Chống chỉ định ở bệnh nhân có tiền sử dị ứng với acyclovir và bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng

Kem CADIROVIB không được khuyến cáo dùng cho niêm mạc như dùng bên trong miệng hay âm đạo. Đặc biệt tránh trường hợp vô tình đưa thuốc vào mắt.

Phụ nữ mang thai

Tuy thuốc không được hấp thu vào tuần hoàn chung nhưng cần thận trọng khi chỉ định phụ nữ mang thai, chỉ dùng khi lợi ích điều trị cao hơn nguy cơ và phải có ý kiến của Bác sĩ.

Phụ nữ cho con bú

Vì thuốc không được hấp thu vào tuần hoàn chung nên có thể dùng cho phụ nữ đang cho con bú.

Tương tác thuốc

Chưa có tương tác nào của kem CADIROVIB được báo cáo.


Tác dụng phụ

- Cảm giác rất bỏng và xót có thể xảy ra với một số bệnh nhân khi bôi thuốc.
- Nổi ban hay ngứa có thể xảy ra đối với một số bệnh nhân.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.



Handwritten signature in blue ink.



Dạng trình bày

Hộp 1 tuýp chứa 5g kem bôi dùng ngoài da.

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Không bảo quản thuốc trong ngăn đá tủ lạnh.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất

Công Ty TNHH US PHARMA USA

Lô B1 – 10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08-37908860



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

