159/151

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 09/9/15

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Rx Thuốc bán theo đơn

GMP - WHO

CHYMODK

Alpha chymotrypsin 8,4mg

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén phân tán

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

Phân phối bởi:
C.T.C.P TM DƯỢC PHẨM & TTBYT THUẬN PHÁT
Lô 44 - TT2B Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc - Hà Đông - TP. Hà Nội

CHYMODK

Thành phần/ Composition:
Mỗi viên nén phân tán chứa/ Each dispersible tablets contains:
Alpha chymotrypsin 8,4mg
(tương ứng với 8400 đơn vị chymotrypsin USP/
Equivalent to 8400 unit chymotrypsin USP).
Tá dược vđ/ Excipients q.s.f ..... 1 viên/ 1 tablet

SĐK (Reg.No):
Số lô SX (Lot No):
Ngày SX (Mfg.Date):
HD (Exp.Date):

Rx Prescription only medicine

GMP - WHO

CHYMODK

Alpha chymotrypsin 8,4mg

Box of 2 blisters of 10 dispersible tablets

Manufactured by:
HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C
Population groups No. 4 - La Khe - Ha Dong - Ha Noi

Distributed by:
THUAN PHAT COMMERCIAL PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUIPMENT J.S.C
Lot 44 - TT2B Van Quan - Yen Phuc - Ha Dong - Ha Noi City

CHYMODK

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng - Liều dùng và các thông tin khác /Indication, Contraindication, Administration - Dosage and other information : Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo/ See the package insert inside.
Bảo quản/ Storage:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/ Store in a dry place, below 30°C

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng/
Keep out of reach of children.
Carefully read the accompanying instructions before use.

Mẫu Nhãn Thuốc Đăng Ký







CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. *Nguyễn Bá Lai*

Hướng dẫn sử dụng thuốc
Rx Thuốc bán theo đơn
CHYMODK

- **Dạng thuốc:** Viên nén phân tán.
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 2 vỉ x 10 viên và hộp 10 vỉ x 10 viên. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- **Công thức bào chế cho 1 đơn vị (1 viên) thành phẩm:** Mỗi viên nén phân tán chứa:

Alpha chymotrypsin	8,4mg
(tương ứng với 8400 đơn vị chymotrypsin USP)	
Tá dược vđ	1 viên

(Tá dược gồm: Crospovidon, lactose, colloidal silicon dioxid, glyceryl behenat, aspartam, bột hương dâu)

- **Dược lực học:** Alpha chymotrypsin là enzym được điều chế bằng cách hoạt hóa chymotrypsinogen, chiết xuất từ tụy bò. Alpha chymotrypsin là enzym thủy phân protein có tác dụng xúc tác chọn lọc đối với các liên kết peptid ở liền kề các acid amin có nhân thơm. Alpha chymotrypsin được sử dụng nhằm giảm viêm và phù nề mô mềm do áp xe và loét, hoặc do chấn thương và nhằm giúp làm lỏng các dịch tiết đường hô hấp trên ở người bệnh hen, viêm phế quản, các bệnh phổi và viêm xoang.
- **Dược động học:** Thuốc hấp thu tốt qua đường tiêu hoá. Thải trừ qua phân và nước tiểu.
- **Chỉ định:**

Thuốc chống phù nề, chống viêm dạng men. Điều trị các trường hợp phù nề sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật.

Giúp làm lỏng các dịch tiết đường hô hấp trên ở người bệnh hen, viêm phế quản, các bệnh phổi và viêm xoang.

- **Cách dùng và liều dùng:**

Uống: 1-2 viên/ lần x 2 lần/ngày.

Cách dùng: Hòa tan viên thuốc trong 1 thìa đầy nước (5ml – 10ml) trước khi uống. Hoặc uống trực tiếp với nước.

(Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc)

- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc.
- **Thận trọng:** Vì khả năng gây mất dịch kính, nên không khuyến cáo dùng chymotrypsin trong phẫu thuật đục nhân mắt ở người bệnh dưới 20 tuổi. Không dùng thuốc cho người bệnh tăng áp suất dịch kính và có vết thương hở hoặc người bệnh dục nhân mắt bẩm sinh.
- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người khi đang lái xe hoặc vận hành máy móc.
- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của thuốc là tăng nhất thời nhãn áp do các mảnh vụn dây chằng bị tiêu hủy làm tắc mạng bó dây.
- **Ảnh hưởng đến phụ nữ có thai và cho con bú:** Chưa có báo cáo đầy đủ về tác dụng có hại của thuốc đối với phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú. Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết theo chỉ định của thầy thuốc.

**** Ghi chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"***

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Chưa có báo cáo
- **Quá liều và cách xử trí:** Chưa có báo cáo.

- **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất. **Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng**. Khi thuốc có biểu hiện biến màu, viên ẩm, mờ nhãn...hoặc có biểu hiện nghi ngờ khác phải hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30^0C.
- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522203 FAX: 04.33522203

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Bá Lai

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy