https://nhathuocngocanh.com/

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 26 / 5 / 15

For registration : Vietnam, Cambodia
Artwork of carton "CODEPECT" 10x10's Code : ***RC-C036-M03-14-08***
Size : 100 x 55 x 90 mm

CODEPECT
CAPSULES
COUGH SUPPRESSANT
AND EXPECTORANT
MEGA We care

Rx Thuốc kê đơn

# CODEPECT

CAPSULES

COUGH SUPPRESSANT
AND EXPECTORANT

MEGA We care

10x10 viên nang mềm

**MỖI VIÊN NANG MỀM CHỨA:**

| | |
|---|---|
| Codeine phosphat | 10 mg |
| Glyceryl Guaiacolat | 100 mg |

**CHỈ ĐỊNH:**
Làm giảm triệu chứng ho do cảm lạnh thông thường hoặc do nhiễm trùng đường hô hấp trên.

**LIỀU DÙNG:**
Người lớn: Mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần hoặc theo chỉ dẫn của Bác sĩ.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH / CÁC THÔNG TIN KHÁC:**
Đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

SĐK: VN-XXXX-XX

***Để xa tầm tay trẻ em***
***Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng***
***Bảo quản nơi khô mát dưới 30°C, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp***

Sản xuất tại:
**MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited**
384 Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate, Pattana 3 Road, Phraeksa, Mueang, Samut Prakan 10280, Thailand.
SĐK:...

Rx Prescription Drug

# CODEPECT

CAPSULES

COUGH SUPPRESSANT
AND EXPECTORANT

MEGA We care

10x10 softgel capsules

**EACH SOFTGEL CAPSULE CONTAINS :**

| | |
|---|---|
| Codeine Phosphate | 10.0 mg |
| Glyceryl Guaiacolate | 100.0 mg |

**INDICATIONS :**
For symptomatic relief of cough in upper respiratory tract infections.

**DOSAGE :**
Adult : 1 capsule three times daily or as directed by physician.

**CONTRAINDICATIONS / PRECAUTIONS / WARNING :**
Please see package insert for details.

***Keep out of reach of children.***
***Read the instructions thoroughly before use.***
***Store below 30°C in a dry place, away from direct sunlight.***

Manufactured by :
**MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited**
384 Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate, Pattana 3 Road, Phraeksa, Mueang, Samut Prakan 10280, Thailand

| MEGA LIFESCIENCES PTY. LTD. |
|---|
| Reg. : CAM 00-145? |

RC-C036-M03-14-08

Số lô SX/ LOT : XXXX
NSX/ MFD : dd/mm/yy
HD/ EXP : dd/mm/yy

8 850769 004847

Spelling checked by : .....
Date : .....
Approved by : ..... (RA Director)
Date : .....

USÒN IUM, IAWIII

https://nhathuocngocanh.com/

https://nhathuocngocanh.com/

For registration : Vietnam

Artwork of al. foil "CODEPECT" 188 mm MGC Code : ***RP-A228-M11-00-04***



https://nhathuocngocanh.com/

https://nhathuocngocanh.com/

# CODEPECT

## THÀNH PHẦN

*Mỗi viên nang mềm chứa:*

| | |
|---|---|
| Codein phosphat | 10 mg |
| Glycerin Guaiacolat | 100 mg |

*Tá dược:* Sáp ong trắng, lecithin, dầu thực vật hydro hóa, dầu đậu tương.

## MÔ TẢ

Viên nang mềm màu đỏ đục, hình bầu dục, chứa dịnh dầu màu trắng ngà bên trong.

## ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Codein có tác dụng giảm ho do tác dụng trực tiếp lên trung tâm ho ở hành não; codein làm khô dịch tiết đường hô hấp và làm tăng độ quánh của dịch tiết phế quản. Codein không đủ hiệu lực để giảm ho nặng. Codein là thuốc trấn ho trong trường hợp ho khan làm mất ngủ.

Glycerin guaiacolat làm giảm độ nhớt dịch tiết, Glycerin guaiacolat làm tăng hiệu quả của phản xạ ho và hoạt động của các lông mao, giúp loại bỏ chất nhầy trong phế quản.

## DƯỢC ĐỘNG HỌC

Codein và dạng muối của nó được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được khoảng 1 giờ sau khi uống codein phosphat. Codein được chuyển hóa ở gan (qua hệ thống cytochrom P450) thành morphin (khoảng 10% lượng codein bị khử methyl thành morphin), norcodein và những chất chuyển hóa khác, kể cả normorphin và hydrocodon. Codein và chất chuyển hóa được bài tiết qua thận, chủ yếu dưới dạng phối hợp với acid glucuronic. Khoảng 3-16% liều dùng được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi. Thời gian bán thải khoảng 2 – 4 giờ. Chất chuyển hóa chính qua thận là acid 2-methoxyphenoxy lactic.

Glycerin guaiacolat hấp thu qua đường tiêu hóa. Chuyển hóa và bài tiết qua nước tiểu.

## CHỈ ĐỊNH

Làm giảm triệu chứng ho khan do cảm lạnh thông thường hoặc do nhiễm trùng đường hô hấp trên

## LIỀU DÙNG

Người lớn: Một viên nang, mỗi ngày 3 lần hoặc theo chỉ dẫn của Bác sĩ

## TÁC DỤNG PHỤ

*Thường gặp:*

Thần kinh: Đau đầu, chóng mặt, khát và có cảm giác khác lạ.

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, táo bón.

Tiết niệu: Bí đái, đái ít.

Tim mạch: Mạch nhanh, mạch chậm, hồi hộp, yếu mệt, hạ huyết áp thế đứng.

*Ít gặp:*

Phản ứng dị ứng: Ngứa, mày đay.

Thần kinh: Suy hô hấp, an dịu, sảng khoái, bồn chồn.

Tiêu hóa: Đau dạ dày, co thắt ống mật.

*Hiếm gặp:*

Dị ứng: Phản ứng phản vệ

https://nhathuocngocanh.com/

Thần kinh: Ảo giác, mất phương hướng, rối loạn thị giác, co giật.
Tim mạch: Suy tuần hoàn.
Lạo khác: Đỏ mặt, toát mồ hôi, mệt mỏi.
Nghiện thuốc: Dùng codein trong thời gian dài với liều từ 240 -540 mg/ngày có thể gây nghiện thuốc. Các biểu hiện thường gặp khi thiếu thuốc là bồn chồn, run, co giật cơ, toát mồ hôi, chảy nước mũi. Có thể gây lệ thuộc thuốc về tâm lý, về thân thể và gây quen thuốc.
***Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.***

## TƯƠNG TÁC THUỐC

Khi dùng phối hợp có thể làm tăng hiệu quả của các thuốc chủ vận opiate, thuốc mê, thuốc giảm đau, an thần và thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm 3 vòng, thuốc ức chế monoamin oxidase, cồn và các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác.

Tác dụng giảm đau của codein tăng lên khi phối hợp với aspirin và paracetamol, nhưng lại giảm hoặc mất tác dụng bởi quinidin.

Codein làm giảm chuyển hóa cyclosporin do ức chế men cytochrom $P_{450}$.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mẫn cảm với codein, Glycerin guaiacolat hay bất cứ thành phần nào của thuốc.
Trẻ em dưới 18 tuổi vừa thực hiện cắt amidan và/hoặc thủ thuật nạo V.A.
Bệnh nhân bệnh gan, suy hô hấp.

## THẬN TRỌNG:

-Sử dụng thận trọng đối với người lớn phì đại tuyến tiền liệt, rối loạn chức năng tuyến thượng thận hoặc tuyến giáp.
-Cẩn thận khi phối hợp với phenothiazin, barbiturat, benzodiazepin, thuốc ức chế monoamin oxidase, thuốc chống trầm cảm ba vòng.
Codein chỉ nên được sử dụng ở liều thấp nhất mà có hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất.
Không khuyến cáo sử dụng codein cho trẻ em có các vấn đề liên quan đến hô hấp (Ví dụ: khó thở hoặc thở khò khè khi ngủ...)
*Lưu ý:*
Không dùng thuốc liên tục quá 7 ngày.

## TÁC DỤNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Codein có thể gây buồn ngủ. Bệnh nhân dùng thuốc này không nên lái xe hay vận hành máy móc.

## PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không nên dùng cho phụ nữ có thai
Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú (do thuốc có thể được bài tiết vào sữa mẹ)

## QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Quá liều có thể dẫn đến các triệu chứng như suy hô hấp và thần kinh trung ương, liệt ruột, táo bón, nôn mửa, lơ mơ dẫn đến trạng thái hôn mê. Nếu gặp phải các triệu chứng trên, nên ngưng dùng thuốc và tham khảo ý kiến bác sĩ.
Xử trí: Phải phục hồi hô hấp bằng cách cung cấp dưỡng khí và hô hấp hỗ trợ có kiểm soát. Chỉ định naloxon ngay bằng đường tiêm tĩnh mạch trong trường hợp nặng.

**BẢO QUẢN:** Bảo quản nơi khô mát dưới 30°C, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp

https://nhathuocngocanh.com/

https://nhathuocngocanh.com/

**HẠN SỬ DỤNG:** 24 tháng
**TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM**: Nhà sản xuất
**TRÌNH BÀY:** Mỗi vỉ 10 viên, 10 vỉ/hộp

**Lưu ý:**
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc
Không dùng thuốc quá hạn ghi trên vỉ thuốc
Không dùng những viên thuốc có bất kỳ dấu thay đổi bất thường nào
Để xa tầm tay trẻ em.

**Nhà sản xuất: Mega Lifesciences Public Company Limited**
384 Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate, Pattana 3 Road, Phraeksa, Mueang, Samut Prakan 10280, Thái Lan.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng

https://nhathuocngocanh.com/