

## THÀNH PHẦN

Thiocolchicosid ..... 4 mg

Tá dược: tinh bột khoai tây, gelatin, lactose monohydrat, magnesi stearat, đường trắng, bột talc.... v.đ.1 viên

## DẠNG TRÌNH BÀY

Hộp 1 vỉ x 12 viên nén.

## DƯỢC LỰC HỌC

Thiocolchicosid là thuốc giãn cơ. Coltramyl loại bỏ hay làm giảm đáng kể sự co thắt cơ có nguồn gốc trung ương: trong bệnh tăng lực cơ co cứng, làm giảm sự đề kháng thụ động của cơ lúc duỗi và giảm hay xóa bỏ sự co thắt cơ tồn lưu. Tác động giãn cơ còn biểu hiện trên các cơ nội tạng: đặc biệt là tử cung.

Coltramyl có ái lực chọn lọc trên receptor GABA và cũng có những tính chất đồng vận glycin. Thuốc không tác động trên cơ chủ ý, vì thế không ảnh hưởng đến hệ hô hấp, cũng như hệ tim mạch.

## DƯỢC ĐỘNG HỌC

Thiocolchicosid sau khi uống, nồng độ đỉnh huyết tương quan sát được là 50 phút. Thời gian bán hủy là 4,5 giờ. Thuốc được đào thải qua đường thận dưới dạng không đổi và cùng lúc với đào thải qua đường ngoài thận.

## CHỈ ĐỊNH

Thuốc có tác dụng giãn cơ, được chỉ định cho người lớn (trên 15 tuổi) để điều trị hỗ trợ các cơn co thắt gây đau trong:

- Các bệnh lý thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống: vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.
- Các bệnh lý do chấn thương và thần kinh (với sự co cứng).
- Phục hồi chức năng.
- Đau bụng kinh.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH

KHÔNG NÊN DÙNG thuốc trong những trường hợp sau đây:

- Có tiền sử dị ứng với thiocolchicosid, colchicin, hoặc với bất cứ thành phần nào của tá dược.
- Khi cho con bú.
- Trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

## LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Chỉ dùng thuốc cho người lớn (trên 15 tuổi).

Liều dùng thông thường là 4 viên mỗi ngày, chia làm 2 lần.

Uống nguyên viên với 1 ly nước, giữa bữa ăn.

## THẬN TRỌNG

Sử dụng thận trọng ở người có tiền sử động kinh hay co giật.

Khi bị tiêu chảy, báo bác sĩ để điều chỉnh liều dùng.

Nếu đau dạ dày, báo bác sĩ.

Do thành phần có đường trắng (sucrose) và lactose, không dùng thuốc khi có tăng galactose máu bẩm sinh, không dung nạp fructose, hội chứng kém hấp thu glucose và galactose, thiếu men lactase, sucrase-isomaltase (các bệnh chuyển hóa hiếm gặp).

## PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Các nghiên cứu trên phụ nữ có thai còn hạn chế. Việc sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai phải được cân nhắc với những nguy cơ có thể xảy ra cho bào thai. Không nên dùng thuốc trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Nếu đang dùng thuốc mà mang thai, gặp ngay bác sĩ để điều chỉnh thuốc cho phù hợp.

Không dùng thuốc khi cho con bú vì thiocolchicosid được bài tiết qua sữa mẹ.

**NÊN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẤT CỨ THUỐC NÀO**

## TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo.

**ĐỂ TRÁNH CÁC TƯƠNG TÁC CÓ THỂ XẢY RA, PHẢI LUÔN LUÔN BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ MỌI THUỐC KHÁC ĐANG DÙNG**

## TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Rất hiếm gặp các phản ứng dị ứng như: nổi mề đay, phù mắt và đặc biệt là sốc phản vệ.
- Rất hiếm gặp các phản ứng da như: ngứa, nổi ban đỏ, phát ban và đặc biệt là ban với mụn và bóng nước.
- Hiếm khi có các rối loạn tiêu hóa: tiêu chảy, đau dạ dày (xem Thận trọng).

**THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ MỌI TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC NÀY**

## SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo về quá liều. Nếu uống thuốc quá liều, báo ngay cho bác sĩ.

**BẢO QUẢN:** nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất theo TCCS

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

**THUỐC BÁN THEO ĐƠN**