

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Companity	VD-25146-16

Đơn đề nghị số: **1670/2017/CV-CPC1HN**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: **Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội**

Địa chỉ: **Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội**

Phương tiện quảng cáo: **Trên tờ rơi cho công chúng**

Số giấy xác nhận: ...0513.../2018/XNQC/QLD

Hà Nội, ngày 12 tháng 4. năm 2018

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt




✓
06/04/2018



COMPANITY

Lactulose 670 mg/ml

ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN



Tài liệu này gồm có 04 trang
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc
của Bộ Y tế:.../XNQC/..., ngày... tháng... năm...
Thông tin chi tiết xem tại trang 2, trang 3 và trang 4
Ngày ... tháng ... năm ... in tài liệu

Tin tức về sản phẩm


Thứ 7

20/07/2018

YTHIMACAPLOR

Fatty acids 650 mg/ml

ĐIỀU TRỊ TÀU BÒ



Thực hiện 100% công nghệ hiện đại
và tiên tiến nhất hiện nay
để đảm bảo chất lượng
tuyệt đối và hiệu quả
trong điều trị các bệnh lý
này. Sản phẩm được
chứng nhận bởi các
nhà khoa học hàng đầu
tại Việt Nam.

COMPANITY

Dung dịch Lactulose 670 mg/ml tương đương 5 g/ống 7,5ml,

100 g lactulose/ lọ 150 ml, 200 g lactulose/ lọ 300 ml

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ, dược sĩ.

8

Tên thuốc: COMPANITY

Thành phần:

Hoạt chất: Lactulose 670 mg/ml tương đương 5 g/ống 7,5ml, 100 g lactulose/ lọ 150 ml, 200 g lactulose/ lọ 300 ml.

Tá dược: Không có.

Dạng bào chế: Dung dịch uống.

Đường dùng: Đường uống.

Quy cách đóng gói: 7,5 ml/ống nhựa, 10, 20, 30, 40 ống nhựa/hộp.

150 ml, 300 ml/lọ, 1 lọ/hộp.

Đặc tính dược lực học

Lactulose là một disacharid tổng hợp, chứa galactose và fructose, được chuyển hóa bởi các vi khuẩn đường ruột thành acid lactic và một lượng nhỏ acid acetic và acid formic. Những acid này làm giảm pH của phân và chuyển amoniac (NH_3) là dạng khuếch tán sang dạng ion amoni (NH_4^+) không khuếch tán được từ ruột vào máu. Hơn nữa, do môi trường ở ruột có tính acid hơn ở máu, nên amoniac có thể khuếch tán từ máu vào ruột, rồi lại chuyển thành ion amoni không hấp thu được. Kết quả là hàm lượng amoniac trong máu giảm. Tương tự, sự hấp thu các amin (cũng tham gia gây bệnh não do gan) cũng giảm.

Nguyên nhân chính gây ngộ độc thần kinh trung ương ở người bị hôn mê do gan là tăng amoniac trong máu. Do vậy, lactulose được dùng trong điều trị bệnh não do gan, nhưng cần dùng liều cao. Khoảng 75 - 85% người bệnh có đáp ứng lâm sàng tốt với điều trị lactulose. Vì lactulose không gây độc, nên được dùng thay thế cho các kháng sinh như neomycin, đặc biệt khi cần điều trị lâu hoặc có chống chỉ định với neomycin. Lactulose không có tác dụng điều trị bệnh não không do nitrogen như các bệnh não do thuốc hoặc rối loạn chuyển hóa, điện giải. Lactulose không có tác dụng trong điều trị hôn mê có liên quan đến viêm gan nhiễm khuẩn hoặc các rối loạn cấp khác ở gan. Khi tăng amoniac huyết do rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, dùng lactulose cũng không có tác dụng.

Dược động học

Lactulose hầu như không được hấp thu ở đường tiêu hóa. Thuốc đến ruột già, chủ yếu ở dạng chưa chuyển hóa. Thuốc được chuyển hóa bởi các vi khuẩn, tạo thành các acid hữu cơ, chủ yếu là acid lactic. Bài tiết qua nước tiểu dưới dạng chưa chuyển hóa khoảng 3% hoặc ít hơn. Thuốc thải trừ chủ yếu qua phân.

Chỉ định

- Điều trị bệnh não gan, hôn mê gan (cho người từ 18 tuổi trở lên).
- Điều trị táo bón.

Liều lượng và cách dùng

Đường sử dụng: đường uống. Lactulose có thể được uống nguyên chất hoặc pha loãng với thức uống.

COMPANY

Đông Dược Paracetamol 500 mg
100 g (sachet) 150 ml 200 ml
Đóng gói: Hộp 100 viên
Nên dùng sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ

Tên công ty: COMPANY

Tổng đại lý:

600 ml Viscotaral 500 mg 005 ml 001 ml Viscotaral 500 mg 001 ml
Hojibell Lactose 600 mg 006 ml 003 ml

TK dược; Kinh do

Dược phẩm công ty Đông Dược

Dược phẩm công ty Đông Dược

Địa chỉ: Số 123, Đường số 1, Phường 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0987 654 321, 0987 654 322, 0987 654 323, 0987 654 324

QĐ số: 04/2023/QĐ-ND

Đã ký: 1/20 ml, 300ml, 1/100 ml

Để đảm bảo sức khỏe của
tôi và gia đình, tôi đã đọc kỹ hướng dẫn
sử dụng và tuân thủ các quy định an toàn
của nhà sản xuất. Tôi cam kết không
lạm dụng thuốc và chỉ sử dụng theo
dose khuyến nghị. Tôi đồng ý trả lại
thuốc nếu có bất kỳ phản ứng不良
hoặc tác dụng phụ nào.

Tôi đã đọc kỹ hướng dẫn
sử dụng và tuân thủ các quy định an toàn
của nhà sản xuất. Tôi cam kết không
lạm dụng thuốc và chỉ sử dụng theo
dose khuyến nghị. Tôi đồng ý trả lại
thuốc nếu có bất kỳ phản ứng不良
hoặc tác dụng phụ nào.

Để đảm bảo sức khỏe
tôi và gia đình, tôi đã đọc kỹ hướng dẫn
sử dụng và tuân thủ các quy định an toàn
của nhà sản xuất. Tôi cam kết không
lạm dụng thuốc và chỉ sử dụng theo
dose khuyến nghị. Tôi đồng ý trả lại
thuốc nếu có bất kỳ phản ứng不良
hoặc tác dụng phụ nào.

Cấp giấy

- Điều kiện để cấp giấy: Mua bán hàng (cửa hàng) tại 18/18

Giao hàng

Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng

COMPANITY

Dung dịch Lactulose 670 mg/ml tương đương 5 g/ống 7,5ml,

100 g lactulose/ lọ 150 ml, 200 g lactulose/ lọ 300 ml

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ, dược sĩ.

(Signature)

* Điều trị bệnh não gan, hôn mê gan (chỉ dùng cho người từ 18 tuổi trở lên)

- Người lớn (từ 18 tuổi trở lên):

Liều khởi đầu: 30 - 45 ml/lần, chia 3 - 4 lần/ngày. Sau đó điều chỉnh liều đến liều duy trì để có thể đại tiện 2 - 3 lần trong ngày.

- Trẻ em:

Hiệu quả và độ an toàn cho trẻ em (trẻ sơ sinh đến 18 tuổi) trong điều trị bệnh não gan, hôn mê gan chưa được thiết lập.

- Người già và bệnh nhân suy giảm chức năng gan, thận

Không cần điều chỉnh liều ở người già và bệnh nhân suy giảm chức năng gan thận.

* Điều trị táo bón

Khởi đầu có thể dùng 1-2 lần/ngày, 15 - 45 ml/lần. Trong đợt điều trị nên điều chỉnh liều theo từng người, nhưng nên theo hướng dẫn sau:

Người lớn: 15 ml/lần x 2 lần/ngày, có thể tăng đến 60 ml/ngày, nếu cần thiết. Liều duy trì: 7,5 - 15 ml/ngày.

Trẻ em:

Trẻ em từ 1 tháng – 1 tuổi: 2,5 ml/lần x 2 lần/ngày, điều chỉnh liều theo đáp ứng.

Trẻ em từ 1 – 5 tuổi: 5 ml/lần x 2 lần/ngày, điều chỉnh liều theo đáp ứng.

Trẻ em từ 5 – 10 tuổi: 10 ml/lần x 2 lần/ngày, điều chỉnh liều theo đáp ứng.

Trẻ em từ 10 – 18 tuổi: 15 ml/lần x 2 lần/ngày, điều chỉnh liều theo đáp ứng.

Chống chỉ định

- Người dưới 18 tuổi bị bệnh não gan, hôn mê gan.

- Người bệnh có galactose huyết, chế độ kiêng galactose hoặc chế độ yêu cầu hạn chế lactose.

- Các bệnh lý đại tràng viêm thực thể (như viêm loét đại tràng, bệnh Crohn...), hội chứng tắc hoặc bán tắc, hội chứng đau bụng không rõ nguyên nhân.

- Thủng hoặc có nguy cơ thủng đường tiêu hóa.

- Quá mẫn với bất cứ thành phần nào trong chế phẩm.

Thận trọng

Không nên điều trị táo bón bằng thuốc dài hạn.

Dùng thuốc trong chứng táo bón chỉ là một hỗ trợ cho việc điều trị bằng chế độ vệ sinh và ăn uống:

- Ăn thức ăn giàu chất xơ và uống nhiều nước.

- Tăng vận động và tập thói quen đi cầu.

Ở nhũ nhi và trẻ em, chỉ kê toa thuốc nhuận tràng khi thật sự cần thiết, do có nguy cơ làm mất phản xạ đi cầu bình thường ở trẻ.

Thận trọng với người đái tháo đường vì có một lượng nhỏ lactose và galactose trong chế phẩm.

YTHUOCNGOCANH.COM

Địa chỉ: Số 106 Đường số 10, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
ĐT: 0908 01 7990 | Fax: 002 | Mail: 091 01 7990 | Email: 001

Giao hàng miễn phí toàn quốc
Hỗ trợ mua trả góp qua thẻ tín dụng

(nếu bạn không có tài khoản vay trả góp) hoặc trả góp trả sau

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ | Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

Thời gian trả góp: 12 tháng | Lãi suất: 1,5% | Số tiền tối đa: 100.000.000 VNĐ | Số tiền tối thiểu: 100.000.000 VNĐ

COMPANITY

Dung dịch Lactulose 670 mg/ml tương đương 5 g/ống 7,5ml,

100 g lactulose/ lọ 150 ml, 200 g lactulose/ lọ 300 ml

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ, dược sĩ.

g

Tác dụng không mong muốn (ADR)

Thường gặp, ADR > 1/100

Tiêu hóa: Tiêu chảy, đầy hơi, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa.

Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100

Rối loạn nước và điện giải do tiêu chảy.

Khắc phục

Buồn nôn: có thể được giảm bằng cách dùng thuốc với nước, nước ép trái cây hoặc trong bữa ăn. Nếu bị ỉa chảy, cần giảm liều ngay; nếu vẫn còn ỉa chảy, ngừng dùng thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Không dùng đồng thời với các thuốc nhuận tràng khác, vì gây đại tiện nhiều, làm khó xác định chính xác liều lactulose cho điều trị bệnh não do gan.

Các thuốc kháng acid không hấp thu có thể ảnh hưởng tới sự tạo acid đường ruột của lactulose.

Một số thuốc kháng khuẩn có thể ảnh hưởng đến hệ vi khuẩn đường ruột giúp chuyển hóa lactulose; tuy nhiên, neomycin có thể dùng đồng thời trong điều trị bệnh não do gan.

Thời kỳ mang thai và cho con bú

Có thể sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí

Triệu chứng: Ỉa chảy, đau bụng, nhiễm kiềm do giảm clo huyết, mất nước, hạ huyết áp, giảm kali huyết.

Điều trị: Không có thuốc giải độc đặc hiệu, chủ yếu là điều trị triệu chứng. Đầu tiên là ngừng điều trị và giảm liều. Nếu cần thì điều trị rối loạn nước - điện giải.

Bảo quản: Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TÂM TAY TRẺ EM.



Nhà sản xuất

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

nhà thuốc ngọc anh

COPPER

Đóng hộp 1 lọ 100g
Hộp 100g
Đóng hộp 1 lít
Hộp 1 lít

Tỷ lệ chứa Kẽm trong muối (ADR)

Tỷ lệ ADR < 100%

Đóng gói: Hộp, túi nilon, bao bì giấy, giấy bạc, giấy nhôm

Đóng lít: Hộp, túi nilon

Đóng lít: Hộp, túi nilon

Đóng lít: Hộp, túi nilon

Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, tránh xa tầm tay trẻ em.

Lưu ý: Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đóng lít: Hộp, túi nilon

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Quốc Tế GPCI Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Quốc Tế GPCI Việt Nam

