

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Rx **CONCMIN**

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

*Để xa tầm tay trẻ em*

*Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ*

*Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc*

**CÔNG THỨC:**

Thành phần	Hàm lượng
L-ornithine L-Aspartate	500mg
Tá dược vừa đủ	1 viên

**DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nang mềm

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm, hộp 9 vỉ x 10 viên nang mềm

**CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC**

Các chế phẩm chứa L-ornithine L-aspartate được sử dụng để tăng chuyển hóa amoniac thành urea và glutamin. Đây là một phức hợp muối kép, khác với các thuốc chỉ chứa có L-ornithine, khi vào cơ thể hợp chất này phân ly thành hai acid amin là L-ornithine và L-aspartate. Hai acid amin này là nguyên liệu tham gia vào chu trình ure và quá trình tổng hợp glutamin. Sự tổng hợp glutamin ở nội bào còn nguyên vẹn là phương tiện rất hiệu quả trong việc điều chỉnh lượng amoniac đi vào chu trình tổng hợp urea. Do đó, sự phối hợp L-ornithine và L-aspartate có tác dụng tương hỗ trong quá trình làm giảm nồng độ amoniac, do đó có tác dụng giải độc, bảo vệ tế bào gan. Ngoài ra, L-ornithine và L-aspartate còn gián tiếp tham gia tạo năng lượng ATP để cung cấp năng lượng cho các quá trình tổng hợp urea và kích thích sự hoạt động các chức năng khác của gan, đặc biệt là chức năng chuyển hóa mỡ và tái tạo nhu mô gan. Đây là chức năng quan trọng trong điều trị gan nhiễm mỡ và viêm gan do virus, do nhiễm độc hóa chất, do uống thuốc độc với gan như thuốc lao, ung thư, hoặc do uống rượu....

**CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:** Hiện tại chưa có tài liệu ghi nhận

**CHỈ ĐỊNH:** Trong các tình trạng tăng amoniac huyết trong một số bệnh lý gan, đặc biệt trong hội chứng não gan.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Người bị suy thận

**THẬN TRỌNG:** Không có

**SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

- Phụ nữ có thai: độ an toàn chưa được nghiên cứu
- Phụ nữ cho con bú: có thể dùng thuốc theo chỉ dẫn của thầy thuốc

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Không dùng thuốc đồng thời với phenothiazine.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**

- Người lớn: 1 viên/lần x 3 lần/ngày
- Trẻ em: 1 viên/ngày.

Liều có thể được điều chỉnh theo độ tuổi của bệnh nhân và triệu chứng bệnh.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Thuốc sử dụng an toàn, tác dụng phụ hiếm khi xảy ra, cá biệt có thể gặp một vài trường hợp hơi xáo trộn trong đường tiêu hóa như khó chịu, hơi buồn nôn....tuy nhiên không cần thiết phải ngưng điều trị, các triệu chứng này sẽ biến mất khi ngưng thuốc.

Ghi chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

**SỬ DỤNG QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:** Chưa có tài liệu ghi nhận.

**HẠN DÙNG:** 30 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng nếu thấy viên bị mốc, bị thủng hoặc thấy hiện tượng khác lạ thì phải báo cho nhà sản xuất biết.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 15°C - 30°C .

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).



Nhà sản xuất  
Công ty cổ phần dược phẩm nam hà  
415 Hàn Thuyên Nam Định.

Tel: 0228.3649408 - 3649504, Fax: 3644650.