

Viên nang cứng

**CRILA®  
Forte**

GMP-WHO

Theo TCCS

**Công thức:** cho một viên: Cao khô Trinh nữ hoàng cung (*Crinum latifolium L.*) 500mg, tương đương 2.5mg alcaloid toàn phần.

**Tá dược:** Tinh bột, Aerosil, Natri starch glycolate, Talc, Magnesi stearate ... vđ một viên.

**Dạng bào chế:** Viên nang cứng.

**Chỉ định:**

+ **Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt.** Giảm các triệu chứng của bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt (đi tiểu khó, đi tiểu nhiều lần vào ban đêm)

+ **Điều trị u xơ tử cung**

**Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong thành phần của thuốc.

**Cách dùng:**

+ **Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt:** Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên, sau bữa ăn.

Thường dùng là 8 tuần. Nếu cần lại dùng tiếp đợt khác.

+ **Điều trị u xơ tử cung:** Ngày uống 2 lần, lần thứ nhất 3 viên, lần thứ hai 2 viên, sau bữa ăn.

Thường dùng là 9 tuần. Nếu cần lại dùng tiếp đợt khác.

(Không dùng thuốc quá hạn dùng hoặc nghi ngờ về chất lượng)

**Đóng gói:** - Hộp 01 chai x 20 viên nang cứng.

- Hộp 01 chai x 60 viên nang cứng.

- Hộp 05 túi nhôm x 02 vỉ x 10 viên nang cứng.

**Tác dụng không mong muốn:** Có thể chóng mặt nhẹ, đầy bụng, song rất hiếm và sẽ tự hết sau 1, 2 ngày điều trị.

**Tương tác thuốc:** Chưa có báo cáo.

**Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em:** Chưa nên dùng thuốc này vì chưa có kinh nghiệm lâm sàng đối với nhóm bệnh nhân này. Nếu cần thiết phải sử dụng xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

**Quá liều và xử trí:** Trường hợp quá liều nên ngừng thuốc, điều trị triệu chứng và các biện pháp hỗ trợ.

**Bảo quản:** Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng. Nhiệt độ dưới 30°C

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi Bác sĩ.  
- Để xa tầm tay trẻ em.

**Sản xuất theo Tiêu chuẩn cơ sở**



Sản xuất tại:

**CÔNG TY TNHH THIÊN DƯỢC**

Lô F3, Đường N5, KCN Nam Tân Uyên, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tel: (0650)365.3073 - (08).6264.7547 - (04).6296.3787

Fax: (0650)365.3074; (08).3864.6479