





Rx Thuốc bán theo đơn

CYSMONA

(L-Cystin và Pyridoxin HCl)

Thành phần

Mỗi viên nén dài bao phim chứa:

L-Cystin 500 mg

Pyridoxin hydroclorid (Vitamin B6) 50 mg

Tá dược: Tinh bột gạo, Microcrystalline Cellulose M101, PVP K30, Natri starch glycolate, Magnesi stearate, Aerosil, Hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC) 606, Hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC) 615, Titan dioxyd, Talc, Polyethylen glycol 6000, Màu Quinolein yellow lake, Tartazin yellow lake.

Tính chất dược lý

L-Cystin: là một amino acid thiết yếu trong cơ thể, có công thức hóa học gần gũi với L-Cystein. L-Cystin tham gia vào quá trình tổng hợp keratine (chất sừng) của tóc và móng vì vậy L-Cystin rất cần cho sự tạo thành tóc và móng. Ngoài ra L-Cystin giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm các tổn thương do các gốc tự do gây ra. L-Cystin cũng có tác dụng chống lão hóa do đó giúp làm giảm sự tích tụ các đốm đồi mồi trên da và thúc đẩy giúp mau lành vết thương do bị thương hay do phẫu thuật.

Pyridoxin HCl (Vitamin B6): là một nhân tố cần thiết của L-Cystin, khi vào cơ thể Vitamin B6 được biến đổi thành pyridoxal phosphate và một phần pyridoxamin phosphate. Hai chất này có vai trò quan trọng trong chuyển hóa protein, glucid và lipid. Nó giúp cho L-Cystin thâm nhập vào vùng tạo chất sừng của tóc và móng. Sự cân bằng dinh dưỡng giữa L-Cystin và Vitamin B6 là cần thiết vì nếu thiếu Vitamin B6 sẽ làm cho sự thâm nhập của L-Cystin vào trong vùng tạo sừng bị giảm đi.

Chỉ định:

CYSMONA được dùng điều trị hỗ trợ trong các trường hợp: rụng tóc, tóc chẻ, tóc dễ gãy, móng mềm dễ gãy.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của Bác sĩ.

Liều lượng và đường dùng:

Liều dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể tùy theo chỉ định của Bác sĩ điều trị. Liều dùng thông thường như sau: các bệnh lý về tóc và móng: 2 viên x 2 lần/ngày.

Thời gian điều trị là từ 1 tháng; sau thời gian này, nếu các triệu chứng không giảm, bệnh nhân nên liên hệ với Bác sĩ để có chỉ định phù hợp.

Cách dùng

Uống thuốc với nhiều nước cùng với bữa ăn.

Chống chỉ định

- Bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Cystin – niệu.
- Không dùng chung với levodopa.

Thận trọng:



Vì thuốc có chứa vitamin B6 nên dùng 200mg/ngày và dài ngày (trên 2 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng. Tình trạng này hồi phục khi ngưng dùng thuốc.

Phụ nữ mang thai, cho con bú

Vì tính an toàn trên phụ nữ có thai vẫn chưa được công bố, do đó không nên dùng thuốc trừ khi những lợi ích của việc điều trị cần phải được đặt lên trên mọi nguy cơ khác.

Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Tương tác thuốc

Vitamin B6 trong chế phẩm làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson.

Tác dụng phụ

Thỉnh thoảng: nôn, tiêu chảy, khát nước, đau bụng nhẹ.

Quá liều

Chưa có báo cáo quá liều khi dùng **CYSMONA**. Khi có triệu chứng quá liều, cần ngưng dùng thuốc ngay lập tức và đến trung tâm y tế gần nhất kèm theo thuốc đang dùng.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng.

Dạng trình bày

Hộp 6 vỉ x 10 viên.

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em.

Nhà sản xuất

CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Địa chỉ : Lô B1- 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08 37908860 – 08 37908861, Fax: 08 37908856

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Bộ Minh Hùng





Faint, illegible red text or markings in the upper left quadrant.

