

# DENTANALGI®

GMP-WHO

## THUỐC TRỊ ĐAU RĂNG

### CÔNG THỨC:

Camphor.....	420mg
Menthol.....	280mg
Procaïn hydroclorid.....	35mg
Tinh dầu Đinh hương ( <i>Oleum Caryophylli</i> )...	439mg
Sao đen ( <i>Cortex Hopea</i> ).....	700mg
Tạo giác ( <i>Fructus Gleditsiae australis</i> ).....	140mg
Thông bạch ( <i>Herba Allium fistulosum</i> ).....	140mg
Tá dược (ethanol 96%, nước tinh khiết)...	vừa đủ 7ml

### DƯỢC LỰC HỌC:

*Menthol* làm dẫn các mạch máu ngoại biên tạo cảm giác mát lạnh đi kèm hiệu quả giảm đau sau đó.

*Camphor* khi được phối hợp với các chất chống kích ứng khác sẽ giảm kích ứng các ngọn dây thần kinh làm mất đau, mất cảm giác khó chịu do che lấp cảm giác đau vừa hay nặng ở nội tạng bằng cảm giác đau nhẹ hơn đi từ da ở cùng mức phân bố thần kinh.

*Procaïn hydroclorid* có tác dụng gây tê tại chỗ.

*Sao đen (Cortex Hopea)* thường dùng để chữa các bệnh viêm lợi, sâu răng, làm cho răng chắc lại, răng chậm rụng.

*Thông bạch (Herba Allium fistulosum)* có tác dụng diệt khuẩn rất mạnh.

*Tạo giác (Fructus Gleditsiae australis)* có tác dụng sát trùng, giảm đau.

### CHỈ ĐỊNH:

Trị đau răng, viêm nướu răng, nha chu.

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Tẩm thuốc vào bông đặt nơi đau, 3- 4 lần/ ngày.

Nhỏ 1ml thuốc (30 giọt) vào khoảng 60ml nước chín, khuấy đều, ngậm và súc miệng 3 lần/ ngày.

## **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**THẬN TRỌNG:** Chưa có báo cáo.

## **SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI**

**VÀ CHO CON BÚ:** Được sử dụng.

## **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Chưa có báo cáo.

*Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

## **TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Chưa tìm thấy tài liệu về tương tác thuốc.

## **DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:**

Cồn thuốc. Hộp 1 chai nhựa nhỏ giọt 7ml.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** TCCS.

*Để xa tầm tay trẻ em.*

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*

*Thuốc dùng ngoài, không được uống.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

1017 Hồng Bàng, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37517111 - 028.38778899 Fax: 028.38752048

Sản xuất tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC

tại Bình Dương - Nhà Máy Dược Phẩm OPC - Số 09/ĐX04-TH

Tổ 7, Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Email: info@opcpharma.com Website: www.opcpharma.com