https://nhathuocngocanh.com/

TN-3568-7 (538Y / BSTN)

501/Đ160

MẪU NHÃN

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 22/02/2018

1/ Nhãn vỉ 10 viên

Số lô, Hạn dùng in chìm trên vỉ.

2/ Nhãn hộp 3 vỉ x 10 viên

https://nhathuocngocanh.com/

3/ Nhãn lọ 30 viên

Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim
Bột Hoài sơn.....100 mg
(Tương ứng với 183 mg Hoài sơn)
Cao khô Liên tâm.....65 mg
(Tương ứng với 200 mg Liên tâm)
Cao khô hỗn hợp Dưỡng tâm an thần.....80 mg
(Tương ứng với: 91,25 mg lá Dâu, 91,25 mg lá Vông, 91,25 mg Long nhãn)
Cao khô Bá tử nhân.....10 mg
(Tương ứng với 91,25 mg Bá tử nhân)
Cao khô Toan táo nhân.....10 mg
(Tương ứng với 91,25 mg Toan táo nhân)
Cao khô Liên nhục.....35 mg
(Tương ứng với 175 mg Liên nhục)
Bảo quản:
Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
Tiêu chuẩn áp dụng: **TCCS**
SĐK:

GMP-WHO

Dưỡng Tâm An Thần

DƯỠNG TÂM, THANH NHIỆT, AN THẦN
THANH NHIỆT, BỔ HUYẾT, BỔ TỲ VỊ, BỔ PHẾ THẬN
MẤT NGỦ DO LO ÂU, TÂM THẦN BẤT AN
DÙNG ĐƯỢC CHO NGƯỜI BỊ TIỂU ĐƯỜNG
Lọ 30 viên nén bao phim

Chỉ định:
Thuốc có tác dụng dưỡng tâm, an thần, thông huyết, thanh nhiệt, bổ huyết, bổ tỳ vị, bổ phế thận.
Được chỉ định trong các trường hợp sau:
- Mất ngủ do lo âu, tim đập hồi hộp.
- Tâm thần bất an, hay quên, cơ thể suy nhược, ăn không ngon.
Liều lượng và cách dùng: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Danapha PHARMACEUTICAL JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Sản xuất tại:
KCN. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

4/ Nhãn Hộp 30 viên

https://nhathuocngocanh.com/

5/ Nhãn lọ 100 viên

Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim
Bột Hoài sơn.....100 mg
(Tương ứng với 183 mg Hoài sơn)
Cao khô Liên tâm.....65 mg
(Tương ứng với 200 mg Liên tâm)
Cao khô hỗn hợp Dưỡng tâm an thần.....80 mg
(Tương ứng với: 91,25 mg lá Dâu, 91,25 mg lá Vông, 91,25 mg Long nhãn)
Cao khô Bá tử nhân.....10 mg
(Tương ứng với 91,25 mg Bá tử nhân)
Cao khô Toan táo nhân.....10 mg
(Tương ứng với 91,25 mg Toan táo nhân)
Cao khô Liên nhục.....35 mg
(Tương ứng với 175 mg Liên nhục)
Bảo quản:
Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
Tiêu chuẩn áp dụng: **TCCS**
SĐK:

GMP-WHO

Dưỡng Tâm An Thần

DƯỠNG TÂM, THANH NHIỆT, AN THẦN
THANH NHIỆT, BỔ HUYẾT, BỔ TỲ VỊ, BỔ PHẾ THẬN
MẤT NGỦ DO LO ÂU, TÂM THẦN BẤT AN
DÙNG ĐƯỢC CHO NGƯỜI BỊ TIỂU ĐƯỜNG
Lọ 100 viên nén bao phim

Chỉ định:
Thuốc có tác dụng dưỡng tâm, an thần, thông huyết, thanh nhiệt, bổ huyết, bổ tỳ vị, bổ phế thận.
Được chỉ định trong các trường hợp sau:
- Mất ngủ do lo âu, tim đập hồi hộp.
- Tâm thần bất an, hay quên, cơ thể suy nhược, ăn không ngon.
Liều lượng và cách dùng: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Danapha PHARMACEUTICAL JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Sản xuất tại:
KCN. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

6/ Nhãn Hộp 100 viên

Thành phần: Cho 1 viên nén bao phim
Bột Hoài sơn.....100 mg
(Tương ứng với 183 mg Hoài sơn)
Cao khô Liên tâm.....65 mg
(Tương ứng với 200 mg Liên tâm)
Cao khô hỗn hợp Dưỡng tâm an thần.....80 mg
(Tương ứng với: 91,25 mg lá Dâu, 91,25 mg lá Vông, 91,25 mg Long nhãn)
Cao khô Bá tử nhân.....10 mg
(Tương ứng với 91,25 mg Bá tử nhân)
Cao khô Toan táo nhân.....10 mg
(Tương ứng với 91,25 mg Toan táo nhân)
Cao khô Liên nhục.....35 mg
(Tương ứng với 175 mg Liên nhục)
Bảo quản:
Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
KCN. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

GMP-WHO
Dưỡng Tâm An Thần
DƯỠNG TÂM, THANH NHIỆT, AN THẦN
THANH NHIỆT, BỔ HUYẾT, BỔ TỲ VỊ, BỔ PHẾ THẬN
MẤT NGỦ DO LO ÂU, TÂM THẦN BẤT AN
DÙNG ĐƯỢC CHO NGƯỜI BỊ TIỂU ĐƯỜNG
Hộp 1 lọ x 100 viên nén bao phim
Danapha PHARMACEUTICAL JSC

Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Dưỡng Tâm An Thần

Chỉ định:
Thuốc có tác dụng dưỡng tâm, an thần, thông huyết, thanh nhiệt, bổ huyết, bổ tỳ vị, bổ phế thận.
Được chỉ định trong các trường hợp sau:
- Mất ngủ do lo âu, tim đập hồi hộp.
- Tâm thần bất an, hay quên, cơ thể suy nhược, ăn không ngon.
Liều lượng và cách dùng: Dùng theo chỉ dẫn của Bác sĩ hoặc dùng liều trung bình là:
- Điều trị trạng thái mất ngủ: Uống 2 viên trước khi đi ngủ 1 giờ.
- Điều trị các trạng thái bệnh lý khác (tim đập hồi hộp, tâm thần bất an, hay quên, cơ thể suy nhược ăn không ngon miệng): Uống sau bữa ăn mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
Tiêu chuẩn áp dụng: **TCCS**
SĐK:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Hộp 100 viên nén bao phim
Dưỡng Tâm An Thần
GMP-WHO
Dưỡng Tâm An Thần
DƯỠNG TÂM, THANH NHIỆT, AN THẦN
THANH NHIỆT, BỔ HUYẾT, BỔ TỲ VỊ, BỔ PHẾ THẬN
MẤT NGỦ DO LO ÂU, TÂM THẦN BẤT AN
DÙNG ĐƯỢC CHO NGƯỜI BỊ TIỂU ĐƯỜNG
Hộp 1 lọ x 100 viên nén bao phim
Danapha PHARMACEUTICAL JSC

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0400102097 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DS. Nguyễn Quang Trị, MBA

https://nhathuocngocanh.com/

Dưỡng tâm an thần

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để thuốc xa tầm tay trẻ em - Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TÊN THUỐC: Dưỡng tâm an thần

THÀNH PHẦN-HÀM LƯỢNG: Mỗi viên nén bao phim chứa

Bột Hoài sơn ..... : 100 mg

Tương ứng 183 mg Hoài sơn *(Tuber Dioscoreae persimilis)*

Cao khô Liên tâm ..... : 65 mg

Tương ứng với 200 mg Liên tâm *(Embryo Nelumbinis nuciferae)*

Cao khô hỗn hợp Dưỡng tâm an thần ..... : 80 mg

Tương ứng với

91,25 mg lá Dâu *(Folium Mori albae)*

91,25 mg lá Vông *(Folium Erythrinae variegatae)*

91,25 mg Long nhãn *(Arillus Longan)*

Cao khô Bá tử nhân ..... : 10 mg

Tương ứng với 91,25 mg Bá tử nhân *(Semen Platycladi orientalis)*

Cao khô Toan táo nhân ..... : 10 mg

Tương ứng với 91,25 mg Toan táo nhân *(Semen Ziziphi mauritianae)*

Cao khô Liên nhục ..... : 35 mg

Tương ứng với 175 mg Liên nhục *(Semen Nelumbinis nuciferae)*

Tá dược (Lactose monohydrat, Eragel, microcrystallin cellulose 102, povidon K30, Aerosil, magnesi stearat, sodium starch glycolate, HPMC 606, HPMC 615, talc, titan dioxyd, PEG 400, maltodextrin, màu patent blue) vừa đủ..... :1 viên

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén tròn bao phim màu xanh lơ, mặt viên nhẵn bóng, mùi thơm dược liệu. Cạnh và thành viên lành lặn.

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chỉ định

Thuốc có tác dụng dưỡng tâm, an thần, thông huyết, thanh nhiệt, bổ huyết, bổ tỳ vị, bổ phế thận, được chỉ định trong các trường hợp sau:

- Mất ngủ do lo âu, tim đập hồi hộp.
- Tâm thần bất an, hay quên, cơ thể suy nhược, ăn không ngon.

https://nhathuocngocanh.com/

Cách dùng

Dùng bằng đường uống.

Liều dùng

Dùng theo chỉ dẫn của Bác sĩ hoặc dùng liều trung bình là:

- Điều trị trạng thái mất ngủ: Uống 2 viên trước khi đi ngủ 1 giờ.
- Điều trị các trạng thái bệnh lý khác (tim đập hồi hộp, tâm thần bất an, hay quên, cơ thể suy nhược, ăn không ngon miệng): Uống sau bữa ăn mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

Chống chỉ định

- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Người đang vận hành tàu xe, máy móc, đang làm việc trên cao.
- Người bị trầm cảm.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Thuốc chứa lactose, những bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase, hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này.

THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Thời kỳ mang thai: Không nên sử dụng trừ khi có chỉ dẫn của Bác sĩ.

Thời kỳ cho con bú: Không nên sử dụng trừ khi có chỉ dẫn của Bác sĩ.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC VÀ LÀM VIỆC TRÊN CAO

Thuốc có tác động an thần, gây ngủ, vì vậy, cần khuyên bệnh nhân không nên lái xe, vận hành máy móc hay làm việc trên cao cho đến khi xác định rõ sự nhạy cảm của thuốc đối với bản thân.

TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC KHÁC

Không có thông tin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Không có thông tin.

Thông báo ngay cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Triệu chứng: Không có thông tin.

Xử lí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử lí kịp thời.

https://nhathuocngocanh.com/

CÁC DẤU HIỆU CẦN LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng. Không dùng thuốc nếu thấy có dấu hiệu hư hỏng, giả mạo.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Thuốc được đóng trong vỉ Alu/PVC, hộp 3 vỉ x 10 viên được đóng trong túi nhôm, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

Thuốc được đóng trong lọ nhựa PEHD, hộp 1 lọ 30 viên, hộp 1 lọ 100 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Thuốc được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 0236.3760130/0236.3760131 Fax: 0236.3760127 Email: Info@danapha.com

Và phân phối trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0400102091 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DS. Nguyễn Quang Trị, MBA

https://nhathuocngocanh.com/

Dưỡng tâm an thần

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để thuốc xa tầm tay trẻ em - Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TÊN THUỐC: Dưỡng tâm an thần

THÀNH PHẦN-HÀM LƯỢNG: Mỗi viên nén bao phim chứa

Bột Hoài sơn ..... : 100 mg

Tương ứng 183 mg Hoài sơn *(Tuber Dioscoreae persimilis)*

Cao khô Liên tâm ..... : 65 mg

Tương ứng với 200 mg Liên tâm *(Embryo Nelumbinis nuciferae)*

Cao khô hỗn hợp Dưỡng tâm an thần ..... : 80 mg

Tương ứng với

91,25 mg lá Dâu *(Folium Mori albae)*

91,25 mg lá Vông *(Folium Erythrinae variegatae)*

91,25 mg Long nhãn *(Arillus Longan)*

Cao khô Bá tử nhân ..... : 10 mg

Tương ứng với 91,25 mg Bá tử nhân *(Semen Platycladi orientalis)*

Cao khô Toan táo nhân ..... : 10 mg

Tương ứng với 91,25 mg Toan táo nhân *(Semen Ziziphi mauritianae)*

Cao khô Liên nhục ..... : 35 mg

Tương ứng với 175 mg Liên nhục *(Semen Nelumbinis nuciferae)*

Tá dược (Lactose monohydrat, Eragel, microcrystallin cellulose 102, povidon K30, Aerosil, magnesi stearat, sodium starch glycolate, HPMC 606, HPMC 615, talc, titan dioxyd, PEG 400, maltodextrin, màu patent blue) vừa đủ..... : 1 viên

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén tròn bao phim màu xanh lơ, mặt viên nhẵn bóng, mùi thơm dược liệu. Cạnh và thành viên lành lặn.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ

- Mất ngủ do lo âu, tim đập hồi hộp.
- Tâm thần bất an, hay quên, cơ thể suy nhược, ăn không ngon.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG

Cách dùng: Dùng bằng đường uống.

https://nhathuocngocanh.com/

Liều dùng

Dùng theo chỉ dẫn của Bác sĩ hoặc dùng liều trung bình là:

- Điều trị trạng thái mất ngủ: Uống 2 viên trước khi đi ngủ 1 giờ.
- Điều trị các trạng thái bệnh lý khác (tim đập hồi hộp, tâm thần bất an, hay quên, cơ thể suy nhược, ăn không ngon miệng): Uống sau bữa ăn mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY

- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Người đang vận hành tàu xe, máy móc, đang làm việc trên cao.
- Người bị trầm cảm.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR)

Chưa ghi nhận trường hợp nào có xảy ra tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc.

Thông báo ngay cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY

Không có thông tin.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC

Uống ngay liều đã quên khi nhớ ra. Nếu thời điểm nhớ ra liều đã quên gần với liều tiếp theo thì bỏ qua và chờ đến liều tiếp theo. Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên trước đó.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU

Không có thông tin về dấu hiệu và triệu chứng quá liều.

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO

Đến ngay trung tâm y tế gần nhất và thông báo ngay cho Bác sĩ khi có các biểu hiện bất thường nếu sử dụng quá liều khuyến cáo.

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY

- Cần thông báo cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thuốc nào bao gồm cả thuốc kê đơn và không kê đơn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có ý định mang thai, đang cho con bú, cần thảo luận với Bác sĩ.
- Thuốc chứa lactose, những bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase, hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này.
- Thuốc có tác dụng an thần, gây ngủ, vì vậy cần thận trong khi lái tàu xe hoặc vận hành máy móc.

https://nhathuocngocanh.com/

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ

Khi tác dụng không mong muốn kéo dài hoặc nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Thuốc được đóng trong vỉ Alu/PVC, hộp 3 vỉ x 10 viên được đóng trong túi nhôm, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

Thuốc được đóng trong lọ nhựa PEHD, hộp 1 lọ 30 viên, hộp 1 lọ 100 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

Để thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Thuốc được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 0236.3760130/0236.3760131 Fax: 0236.3760127 Email: Info@danapha.com

Và phân phối trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

DS. Nguyễn Quang Trị, MBA

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng