

ĐƠN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Rx - thuốc bán theo đơn

Erythromycin & Nghệ Nam Hà

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ

Thành phần:

Erythromycin stearat tương đương với Erythromycin base	0,4g
Dịch chiết nghệ tương đương với nghệ tươi	2,0g
Tá dược vừa đủ	10g
Tá dược gồm: Alcol cetostearylic, Polyethylen glycol 400, Propylen glycol, Dầu parafin, Natri laurylsulfat, Nipazin, nước tinh khiết.	

Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da.

Quy cách đóng gói: tuýp 10g, hộp 1 tuýp.

Dược lực học:

Erythromycin là một kháng sinh thuộc nhóm macrolid có phổ tác dụng trên vi khuẩn Gram (+) và một số chủng Gram (-). Erythromycin gắn thuận nghịch với tiểu đơn vị 50 S của ribosom vi khuẩn nhạy cảm và ức chế tổng hợp protein. Tác dụng chính của Erythromycin là kim khuẩn nhưng có thể diệt khuẩn ở nồng độ cao đối với các chủng rất nhạy cảm. Ngoài ra Erythromycin còn có tác dụng làm giảm nồng độ acid béo tự do trong bã nhờn do ức chế gián tiếp lên quá trình chuyển hóa các triglycerides thành các acid béo hoặc là tác động trực tiếp lên quá trình tạo acid béo của tế bào. Các acid béo tự do này là nguyên nhân gây mụn và viêm (sẩn, mụn mủ, nốt, u nang) của mụn trứng cá. Dịch chiết nghệ dùng ngoài có tác dụng sát trùng, diệt nấm, kích thích tạo tế bào mới, giúp vết thương mau lành, không để lại sẹo.

Dược động học: thuốc dùng ngoài da, có tác dụng tại chỗ.

Chỉ định:

- Điều trị mụn nhọt, trứng cá đặc biệt là dạng mưng đờ có mủ.
- Vết thương, vết bỏng đang lên da non.

Chống chỉ định: Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng: Thuốc chỉ dùng bôi ngoài và tránh tiếp xúc với mắt. Trong quá trình sử dụng nếu thấy xuất hiện sự kích ứng nào thì bệnh nhân nên ngừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thuốc sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: thuốc bôi ngoài da nên không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn: Các phản ứng dị ứng ngoài da.

Chú ý: "Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc."

Liều lượng và cách dùng: Rửa sạch chỗ da bị bệnh trước khi bôi thuốc. Bôi thuốc ngày 1 - 2 lần cho tới khi khỏi hẳn. Có thể dùng dài ngày (1-2 tháng) để phòng bệnh trứng cá tái phát.

Quá liều và xử trí: Hiện tại chưa có tài liệu ghi nhận về sử dụng quá liều Erythromycin khi bôi ngoài da.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thấy thuốc bị biến màu hoặc thấy hiện tượng khác lạ thì phải báo cho nhà sản xuất biết.

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở.

Thuốc chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc.



NAMHA PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350 3649408 Email: info@namhapharma.com

Website: www.namhapharma.com