

MẪU HỘP GIẢI CẢM LIÊN NGÂN

KT: 105 x 85 x 65 mm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: M/S/.../2014

CTCP ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU
Thuộc CTCTĐ Dược phẩm và TM SOHACO

LIÊN NGÂN
Giải cảm

• Không gây buồn ngủ
• Nguồn gốc thảo dược

TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

SDK:

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.



Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

**ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

THUỐC ĐÔNG DƯỢC TRỊ CẢM CÚM, NHỨC ĐẦU, VIÊM HỌNG

Giải cảm

LIÊN NGÂN

Không gây buồn ngủ

10 vỉ x 10 viên nang

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MÊ DI SUN
Số 821 - An Lợi - Hòa Lợi - Bến Cát - Bình Dương
Theo hợp đồng gia công với:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU
Do Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội



THÀNH PHẦN: cho 1 viên nang cứng

Cát cánh (Radix Platycodi)	0,27 g
Kim ngân hoa (Flos Lonicerae)	0,45 g
Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)	0,23 g
Kinh giới (Herba Schizonopetiae)	0,20 g
Ngưu bàng tử (Fructus Arctii)	0,30 g
Liên kiều (Fructus Forsythiae)	0,45 g
Đạm trúc điệp (Herba Lophatheri)	0,30 g
Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae)	0,002 g

Tã được (Magnesistearat) vớ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị các trường hợp cảm cúm, sốt, đau, nhức đầu, sốt cao bất rút, Ho, ngứa khô, họng sưng đau.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Người lớn: Mỗi lần uống 2-3 viên, uống 3 lần/ngày.
Trẻ em: uống 1 viên/lần, uống 2-3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Người thể hàn, tỷ lệ hư hàn, tiêu chảy.
Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử đông kinh hoặc co giật do sốt cao.

THUỐC ĐÔNG DƯỢC TRỊ CẢM CÚM, NHỨC ĐẦU, VIÊM HỌNG

Giải cảm

LIÊN NGÂN

Không gây buồn ngủ

10 vỉ x 10 viên nang

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MÊ DI SUN
Số 821 - An Lợi - Hòa Lợi - Bến Cát - Bình Dương
Theo hợp đồng gia công với:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU
Do Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội



M.S.D.N.: 0500402010-C.T.C.P

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÔNG DƯỢC
Á CHÂU**

Q. HÀ ĐÔNG - T.P. HÀ NỘI

Muu

GIÁM ĐỐC
Ds: *Phạm Phan Thanh Vân*



*Phạm
SSE*

Tờ hướng dẫn sử dụng
Viên nang GIẢI CẢM LIÊN NGÂN

Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng + HDSD.

Công thức cho 1 viên nang cứng:

Cát cánh (Radix Platycodi)	0,27g (tương đương 190mg bột mịn)
Kim ngân hoa (Flos Lonicerae)	0,45g (tương đương 270mg bột mịn)
Cam thảo (Radix Glucyrrhizae)	0,23g (tương đương 15mg cao khô)
Kinh giới (Herba Schizonepetae)	0,20g (tương đương 11mg cao khô)
Nguu bàng tử (Fructus Arctii)	0,30g (tương đương 11mg cao khô)
Liên kiều (Fructus Forsythiae)	0,45g (tương đương 22mg cao khô)
Đạm trúc điệp (Herba Lophatheri)	0,30g (tương đương 15mg cao khô)
Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae)	0,002g
Tá dược (Magnesistearat) vừa đủ	1 viên

Chỉ định :

Điều trị các trường hợp cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu, sốt cao bất rút; Ho, miệng khô, họng sưng đau.

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: Mỗi lần uống 2- 3 viên, uống 3 lần/ngày.

Trẻ em: uống 1 viên/lần, uống 2 - 3 lần /ngày .

Chống chỉ định:

Người thể hàn, tỳ vị hư hàn, tiêu chảy.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi , trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:

Sử dụng được cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Người lái xe hoặc vận hành máy đều sử dụng được không gây ảnh hưởng gì.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Chưa có báo cáo.

Thông báo với bác sĩ các tác dụng không muốn gặp phải của thuốc

Quá liều và xử trí:

Chưa có báo cáo.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.



Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDISUN

Địa chỉ: Số 521- An Lợi- Hòa Lợi- Bến Cát- Bình Dương

Tel: 0650.3589036; Fax :0650.3589297; Email: medisun.medisun@gmail.com

Theo hợp đồng gia công với:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU

Địa chỉ: Do Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội.



GIÁM ĐỐC

Ds: *Phạm Phan Thanh Vân*

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

