https://nhathuocngocanh.com/

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	**Giloba**	VN-10405-10

Đơn đề nghị số: **040917/MEGA-QC**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: **Văn phòng đại diện Mega Lifesciences Public Company Limited**

Địa chỉ: **364 Cộng Hòa, Tòa nhà E-Town 1, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh**

Phương tiện quảng cáo: **Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi, panô, áp phích, bảng biển, báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện giao thông cho công chúng**

Số giấy xác nhận: 0439/**2017/XNQC/QLD**

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

10/1/18/7

Tài liệu dành cho công chúng

Giloba

Chỉ định: Suy tuần hoàn não và các biểu hiện chức năng: chóng mặt, nhức đầu, giảm trí nhớ





1 viên mỗi ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ

Thành phần: mỗi viên nang mềm chứa Ginkgo Biloba Phytosome*115 mg. Tương đương với chiết xuất Ginkgo Biloba 40 mg (* theo tiêu chuẩn kỹ thuật của INDENA, Italy). **Chỉ định:** • Suy tuần hoàn não và các biểu hiện chức năng: chóng mặt, nhức đầu, giảm trí nhớ, giảm khả năng nhận thức, rối loạn vận động, rối loạn cảm xúc và nhân cách. • Di chứng tai biến mạch máu não và chấn thương sọ não. • Hội chứng Raynaud, tê lạnh và tím tái đầu chi. • Rối loạn thần kinh cảm giác, tuần hoàn ở mắt, tai mũi họng. • Phòng ngừa và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer's (bệnh sa sút trí tuệ ở người có tuổi). **Chống chỉ định/Thận trọng:** Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em. Nếu sử dụng đồng thời Ginkgo với các thuốc chống đông máu hoặc Aspirin, nên thông báo cho thầy thuốc biết. Không dùng cho bệnh nhân đang bị rối loạn chảy máu. **Tác dụng phụ:** Khi sử dụng chất chiết xuất Ginkgo Biloba trên lâm sàng không gây tác dụng phụ nào quan trọng. Có thể gặp nhức đầu nhẹ trong vòng một, hai ngày, hơi khó chịu ở dạ dày hoặc dị ứng ngoài da ở một số ít người. Tuy nhiên nếu xuất hiện các triệu chứng trên, nên tham khảo ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ. **Liều dùng:** một viên nang mỗi ngày hoặc theo chỉ dẫn của Bác sĩ. **Bảo quản:** Bảo quản nơi khô, mát, dưới 25°C. **Hạn sử dụng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất. **Tiêu chuẩn sản phẩm:** Nhà sản xuất. **Trình bày:** Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm. **Lưu ý:** Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Không dùng thuốc quá hạn ghi trên vỉ thuốc. Không dùng những viên thuốc có bất kỳ dấu hiệu thay đổi bất thường nào. Để xa tầm tay trẻ em. **Nhà sản xuất MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited.** 384 Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate, Pattana 3 Road, Praeksa, Mueang, Samutprakarn 10280, Thái Lan. **Sản xuất theo sự nhượng quyền của: Mega Lifesciences (Australia) Pty. Ltd.** Victoria 3175, Australia. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ **MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited tại TP. HCM:** Phòng 5.12A, tầng 5, số 364, đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: (84-28) 38123166/ Fax: (84-28) 38123168

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế: .../XNQC..., ngày ... tháng ... năm...

MEGA We care

Kích thước: 1:1, 1:5, 1:10, 1:20

https://nhathuocngocanh.com/