

Viên đặt âm đạo

# GINCLOR



- Kiểm soát tình trạng ngứa, khô rát và nấm âm đạo
- Phục hồi hệ vi khuẩn và độ pH của âm đạo
- Phòng ngừa và kiểm soát bệnh nấm Candida

Medical Device CE



SẢN XUẤT TẠI: ITALY

## TÁI LẬP CÂN BẰNG HỆ VI KHUẨN VÀ pH ÂM ĐẠO

### MÔ TẢ

Viên đặt âm đạo GINCLOR là một thiết bị y tế có thành phần từ axit hyaluronic, axit lactic, Axit Boric, Vitamin E, dầu cây trà, Chlorhexidine, chất béo trung tính bản tổng hợp, axit glycyrrhetic 18-beta. Axit hyaluronic ở dạng muối natri với liều lượng 20 mg/viên có tác dụng dưỡng ẩm và bôi trơn chống khô âm đạo, góp phần khôi phục môi trường âm đạo tự nhiên và thoải mái. Axit Lactic thường có trong âm đạo hỗ trợ điều chỉnh độ pH ngay lập tức và tạo điều kiện phục hồi tự nhiên của hệ sinh thái âm đạo. Axit boric, nhờ tồn tại trong môi trường âm đạo, giúp cân bằng pH âm đạo.

### CHỈ ĐỊNH

Viên đặt âm đạo GINCLOR là một thiết bị y tế góp phần phục hồi nhanh chóng môi trường âm đạo và hữu ích trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn và nhiễm trùng Candida tái phát. Chứa axit hyaluronic, axit boric và axit lactic, giúp xóa các triệu chứng do quá trình hydrat hóa âm đạo không cân bằng và / hoặc pH âm đạo.

### LIỀU DÙNG

Đặt mỗi ngày một viên - tốt nhất là vào buổi tối trước khi ngủ - trong 5-7 ngày sau khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt hoặc theo lời khuyên của bác sĩ.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1) Rửa vùng âm đạo dùng cách trước khi sử dụng (tốt nhất là rửa âm đạo bên ngoài và bên trong);
- 2) Rửa tay cẩn thận trước khi mở vỉ lấy viên đặt;
- 3) Nhẹ nhàng đưa viên đặt vào sâu trong âm đạo, tốt nhất ở tư thế nằm ngửa.

### Điều kiện bảo quản

Bảo quản bao bì đã đóng gói đúng cách ở nơi khô ráo, nhiệt độ từ 5°C đến 25°C, tránh ánh sáng và nguồn nhiệt.

### Tác dụng phụ

Có thể nếu quá mẫn với bất kỳ thành phần nào.

### Cảnh báo

Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em. Không nuốt. Không sử dụng nếu gói đã được mở trước đó hoặc bị hỏng. Không sử dụng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng. Hạn sử dụng để cấp đến sản phẩm chưa được mở và bảo quản đúng cách. Không sử dụng sản phẩm trong trường hợp có tổn thương và vết thương ở âm đạo. Trong trường hợp sử dụng đồng thời với các liệu pháp khác, với thuốc hoặc với thiết bị y tế, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ. Không sử dụng sản phẩm trong thời kỳ kinh nguyệt. Không vượt quá liều lượng đã xuất mà không có lời khuyên y tế. Việc sử dụng - đặc biệt nếu kéo dài - có thể dẫn đến các hiện tượng nhạy cảm. Nếu dùng như vậy, hãy ngưng điều trị và hỏi ý kiến bác sĩ để bắt đầu một liệu pháp phù hợp. Điều quan trọng là phải thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về bất kỳ tác dụng không mong muốn nào không được báo cáo trong tờ rơi hướng dẫn.

### Lưu ý khi sử dụng

Trong trường hợp màng trinh còn nguyên vẹn, trước khi sử dụng hãy tham khảo ý kiến bác sĩ phụ khoa về điều kiện sử dụng cụ thể. Sản phẩm dùng một lần, không sử dụng lại nếu bị rơi ra ngoài.

### Quy cách đóng gói

Hộp 2 vỉ x 5 viên.

