

DL 145

MẪU NHÃN

1-Mẫu ống (ống 5ml)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/6/14

GINKOMIFA
 Ginkgo biloba extract 17,5mg 5ml
 T.B-T.M (LM-LV)

SDK: _____
 Sản xuất tại chi nhánh
 CÔNG TY CPDP T.Ư VIDIPHA tỉnh Bình Dương

Số lô SX: _____
 HD _____



2-Mẫu hộp (Hộp 10 ống 5ml) (thu nhỏ 90%)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.Ư VIDIPHA
 194/2, Lê Văn Sỹ, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 ĐT: (08)-38440106 Fax: (84-8)-38440446
 Sản xuất tại chi nhánh
 CÔNG TY CPDP T.Ư VIDIPHA TỈNH BÌNH DƯƠNG
 Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Ginkomifa

Ginkgo biloba extract (Cao bạch quả)
 Hộp 10 ống 5ml

CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN TRỊ
ĐS. KIỀU HỮU

Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN

DUNG DỊCH TIÊM



Hộp 10 ống 5ml

Ginkomifa

Ginkgo biloba extract (Cao bạch quả)

TIÊM BẮP - TIÊM TĨNH MẠCH



VIDIPHA

Ginkomifa

Ginkgo biloba extract (Cao bạch quả)
 Hộp 10 ống 5ml

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

Ginkomifa

Ginkgo biloba extract (Cao bạch quả)
 Hộp 10 ống 5ml

SDK:
 Tiêu chuẩn TCCS

THÀNH PHẦN: Mỗi ống 5 ml chứa:

Cao bạch quả (*Ginkgo biloba extract*).....17,5mg
 Tương ứng Flavonol glycosid toàn phần.....4,2mg
 (Tính trên quercetin, kaempferol và isorhamnetin)
 Tá dược:vd 5ml

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với thuốc.
- Không nên dùng đối với những trường hợp có rối loạn đông máu, đang dùng thuốc chống đông, đang có xuất huyết.
- Do không có bằng chứng lâm sàng đầy đủ cho việc dùng thuốc trong thai kỳ nên không chỉ định thuốc này cho phụ nữ có thai.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Tiêm bắp thịt sâu hoặc tiêm tĩnh mạch chậm:
 Liều dùng: 1 -2 ống/lần, 2 lần/ngày.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM

BAO QUẢN NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C, TRÁNH ÁNH SÁNG

CHỈ ĐỊNH: Thuốc được chỉ định chủ yếu trong điều trị rối loạn tuần hoàn não và ngoại biên,

- Suy tuần hoàn não cấp và mãn tính, giảm trí nhớ, kém tập trung, bệnh sa sút trí tuệ do xơ não và các tình trạng xảy ra sau đột quỵ.
- Rối loạn tuần hoàn máu và thần kinh ở tai như: ù tai, chóng mặt, mất thính lực thoáng qua.
- Rối loạn tuần hoàn máu và thần kinh ở mắt: bệnh võng mạc do tiểu đường, thoái hoá hoàng điểm ở người già.
- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên như bệnh tắc nghẽn động mạch ngoại biên, đau cách hồi, tê lạnh tay chân.

Ginkomifa
 Ginkgo biloba extract (Cao bạch quả)

3.- MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: (MẶT A)

R_x <small>THUỐC BÁN THEO ĐƠN</small>	GINKOMIFA DUNG DỊCH TIÊM
THÀNH PHẦN: Mỗi ống 5ml chứa:	
♦ Hoạt chất chính:	
Cao bạch quả (Ginkgo biloba extract).....17,5mg	
Tương ứng Flavonol glycosid toàn phần4,2mg (<i>Tính trên quercetin, kaempferol và isorhamnetin</i>)	
♦ Tá dược: Propylen glycol, ethanol, benzyl alcohol, natri edetat, natri metabisulfit, sorbitol, dinatri hydrophosphat, natri dihydrophosphat, nước cất pha tiêm v/v 5ml.	
CHỈ ĐỊNH:	
Thuốc được chỉ định chủ yếu trong điều trị rối loạn tuần hoàn não và ngoại biên.	
♦ Suy tuần hoàn não cấp và mãn tính, giảm trí nhớ, kém tập trung, bệnh sa sút trí tuệ do xơ não và các tình trạng xảy ra sau đột quy.	
♦ Rối loạn tuần hoàn máu và thần kinh ở tai như: ù tai, chóng mặt, mất thính lực thoáng qua.	
♦ Rối loạn tuần hoàn máu và thần kinh ở mắt: bệnh võng mạc do tiểu đường, thoái hoá hoàng điểm ở người già.	
♦ Rối loạn tuần hoàn ngoại biên như bệnh tắc nghẽn động mạch ngoại biên, đau cách hồi, tê lạnh tay chân.	
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:	
♦ Quá mẫn với thuốc.	
♦ Không nên dùng đối với những trường hợp có rối loạn đông máu, đang dùng thuốc chống đông, đang có xuất huyết.	
♦ Do không có bằng chứng lâm sàng đầy đủ cho việc dùng thuốc trong thai kỳ nên không chỉ định thuốc này cho phụ nữ có thai.	
LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:	
♦ Tiêm bắp sâu hoặc tiêm tĩnh mạch chậm	
♦ Liều dùng: 1-2 ống/lần, 2 lần/ngày.	
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:	
♦ Một vài tác dụng nhẹ và hiếm gặp như rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng ngoài da.	
Ghi chú: thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc	
THẬN TRỌNG:	
♦ Thuốc không gây tác dụng ngược trên quá trình chuyển hóa đường nên	



CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN TRỊ
DS. KIỀU HỮU



4.- MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: (MẶT B)

dùng được cho các bệnh nhân tiểu đường bị rối loạn tuần hoàn thường xuyên.

- ♦ Thuốc này không phải là thuốc hạ huyết áp và không thể dùng điều trị thay thế cho các thuốc chống cao huyết áp đặc trị.
- ♦ **Phụ nữ mang thai và cho con bú:** Không sử dụng
- ♦ **Lái xe và vận hành máy móc:** (chưa có tài liệu)

TƯƠNG TÁC THUỐC: (chưa có tài liệu)

ĐƯỢC LỢI HỌC:

- ♦ Cao chiết xuất từ lá cây Ginkgo biloba làm tăng tuần hoàn động mạch ở đầu và các chi, bình thường hóa tính thấm của mao mạch trong chứng phù nề tự phát, tăng lưu lượng máu đến não, hoạt hóa sự chuyển hóa năng lượng của tế bào bằng cách gia tăng tiêu thụ glucose ở não bộ và bình thường hóa sự tiêu thụ oxy ở não.
- ♦ Thuốc cũng có tác dụng giảm nguy cơ chứng huyết khối tĩnh mạch tuần hoàn và có những lợi ích đặc biệt đối với hệ tuần hoàn của người cao tuổi.

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC:

- ♦ Thuốc được hấp thu nhanh và phân bố rộng rãi đến các mô, có ái lực trội đối với mô mắt, mô hạch và mô thần kinh đặc biệt là vùng dưới đồi.
- ♦ Thuốc được chuyển hóa ở gan và đào thải theo đường hô hấp, qua phân và qua nước tiểu.

QUÁ LIỀU, XỬ TRÍ: Báo ngay cho bác sỹ nếu dùng quá liều chỉ định.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 ống x 5 ml

BẢO QUẢN: Để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CHÚ Ý: THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ

Không sử dụng thuốc nếu:

- ♦ Dung dịch thuốc bị biến màu, không trong suốt.
- ♦ Ống thuốc bị nứt, vỡ.
- ♦ Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sỹ khi gặp những triệu chứng dị ứng.
- ♦ Để xa tầm tay trẻ em.
- ♦ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
- ♦ Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM
ĐT: (08) - 38440106 Fax: (84 - 8) - 38440446
Sản xuất tại: chi nhánh CÔNG TY CPDP T.Ư VIDIPHA tỉnh Bình Dương
Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương



CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN TRỊ
DS. KIỀU HỮU



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hưng

