

8/0143

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 28/11/2019

GONPAT 750
Box of 30 sachets
Box: 120 x 105 x 53 mm
Sachets: 100 x 50 mm



Oral route

GONPAT 750



Box of 30 sachets x 3 g
Granules

SDK/Visa:
Số lô/Số Lot No:
NSX/Mid:
HD/Exp:

COMPOSITION: Glucosamine sulfate 750 mg (equivalent to glucosamin base 588.8 mg) and excipients, sp. for 1 sachet 3 g.
INDICATIONS: GONPAT 750 sachet is used for symptomatic relief of mild to moderate osteoarthritis.
DOSAGE AND ADMINISTRATION: 2 sachets a day in 2 divided dose, dissolved in a glass of water and taken during meals for a course of 2 - 3 months. If necessary repeat 2 - 3 courses a year.
CONTRAINDICATION AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.
STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**
Manufacturer:
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hamlet 2, Tân Thành Tây Village, Cu Chi District, HCMC.



GONPAT 750



Thuốc uống

GONPAT 750



Hộp 30 gói x 3 g
Thuốc cốm

THÀNH PHẦN: Glucosamin sulfate 750 mg (tương đương glucosamin base 588.8 mg) và các tá dược vừa đủ một gói 3 g.
CHỈ ĐỊNH: Gói GONPAT 750 được dùng để làm giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Mỗi ngày 2 gói, chia làm 2 lần hòa vào trong 1 ly nước và uống vào các bữa ăn. Một đợt từ 2 - 3 tháng tùy tình trạng bệnh, có thể lặp lại 2 - 3 đợt một năm nếu cần.
CHỖNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
ẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.
**ĐOXATAM/TAYTREM.
ĐỘC KÝ HƯƠNG DÂN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**
Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Số 2, Tân Thành Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM

GONPAT 750
WHO - GMP

Handwritten signature



GONPAT 750

Box of 30 sachets

Box: 120 x 40 x 53 mm

Sachet: 100 x 50 mm



Thuốc uống

GONPAT 750



Gói 3 g
Thuốc cốm

Số lô SX/Lot No.:
HD/Exp:

Glucosamin sulfat: 750 mg
Glucosamin baze: 588,8 mg) và
các tá dược vừa đủ một gói 3 g.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Mỗi ngày 2 gói, chia làm 2 lần hòa tan trong 1 ly nước và uống vào các bữa ăn. Một đợt từ 2 - 3 tháng tùy tình trạng bệnh, có thể lặp lại 2 - 3 đợt một năm nếu cần.

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

**ĐẺ XA TẮM TAY TRẼ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, Xã Tân Thành Tây, huyện Củ Chi,
TP. HCM

GONPAT 750

WHO - GMP

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



THÀNH PHẦN: Glucosamin sulfat 750 mg (tương đương với Glucosamin base 588,8 mg) và các tá dược gồm Manitol, Lactose monohydrat, Aspartam, Mùi cam bột, Natri Citrat, Silic dioxyd dạng keo khan, Sunset yellow, Nước tinh khiết vừa đủ 1 gói 3 g.

DẠNG BẢO CHẾ: Thuốc cốm

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 30 gói.

DƯỢC LỰC: Glucosamin là chất chủ yếu tạo nên sụn khớp, có đặc tính kích thích tạo sụn khớp, ức chế các enzym phá hủy sụn khớp và làm tăng sản xuất chất nhầy bôi trơn khớp giúp cử động được dễ dàng. Glucosamin được dung nạp rất tốt và các nghiên cứu cho thấy lợi ích của sử dụng thuốc trong điều trị thoái hóa khớp giảm được mức sử dụng liều thuốc chống viêm Non-steroid và thuốc có tác dụng kéo dài sau vài tháng.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: Thuốc gói GONPAT 750 được dùng để làm giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều lượng: Mỗi ngày 2 gói, chia 2 lần.

Cách dùng: Hòa tan thuốc trong một ly nước và uống vào các bữa ăn, Một đợt điều trị từ 2 – 3 tháng tùy tình trạng bệnh, có thể lặp lại 2 - 3 đợt một năm nếu cần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Quá mẫn cảm với Glucosamin hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc .
- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi (do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị).

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Đối với người cao tuổi, khi dùng lâu dài cần kiểm tra chức năng gan, thận và công thức máu định kỳ.
- Do thuốc điều trị nguyên nhân nên tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau một tuần trở đi, vì vậy nếu đau nhiều có thể kết hợp thêm thuốc giảm đau chống viêm trong những ngày đầu.
- Tuy thuốc không chứa đường nhưng do bản chất thuốc cũng nên thận trọng khi dùng cho bệnh nhân đái tháo đường.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC :

- Người đang dùng thuốc lợi tiểu cần dùng liều lớn hơn : 20mg / kg / ngày.
- Khi dùng chung với Heparin có khả năng làm tăng nguy cơ chảy máu.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có tài liệu đề cập đến.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Glucosamin không gây tác dụng phụ trên dạ dày ruột như các thuốc chống viêm không steroid.
- Tác dụng phụ thường rất nhẹ và thoáng qua. Hiếm khi gặp khó chịu ở dạ dày, nôn, ăn khó tiêu hay tiêu chảy khi đó nên uống thuốc trong bữa ăn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Điện thoại: 08 – 37950.611 / 957 / 994

Fax : 08 - 37950.614

Email: info@bvpharma.com.vn

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN



MÔ TẢ SẢN PHẨM: GONPAT 750 là sản phẩm có thành phần chủ yếu là Glucosamin, là chất chủ yếu tạo nên sụn khớp, có đặc tính kích thích tạo sụn khớp, ức chế các enzym phá hủy sụn khớp và làm tăng sản xuất chất nhầy bôi trơn khớp giúp cử động được dễ dàng. Thuốc được bảo chế ở dạng cốm đóng trong gói nhôm rất tiện lợi và dễ uống, đóng gói mỗi hộp 30 gói.

THÀNH PHẦN VÀ HẠM LƯỢNG: Mỗi gói chứa Glucosamin sulfat 750 mg (tương đương với Glucosamin base 588,8 mg) và các tá dược gồm Manitol, Lactose monohydrat, Aspartam, Mùi cam bột, Natri Citrat, Silic dioxyd dạng keo khan, Sunset yellow, Nước tinh khiết vừa đủ 1 gói 3 g.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ ?

Thuốc này được dùng để làm giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG ?

Liều lượng: Mỗi ngày 2 gói, chia 2 lần.

Cách dùng: Hòa tan thuốc trong một ly nước và uống vào các bữa ăn, Một đợt điều trị từ 2 – 3 tháng tùy tình trạng bệnh, có thể lặp lại 2 -3 đợt một năm nếu cần.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY ?

Không dùng thuốc này khi bị quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi (do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị).

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY.

- Đối với người cao tuổi, khi dùng lâu dài cần kiểm tra chức năng gan, thận và công thức máu định kỳ.
- Do thuốc điều trị nguyên nhân nên tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau một tuần trở đi, vì vậy nếu đau nhiều có thể kết hợp thêm thuốc giảm đau chống viêm trong những ngày đầu.
- Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân đái tháo đường.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY ?

Thuốc có thể gây tương tác với các thuốc lợi tiểu hoặc Heparin nếu dùng kết hợp.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ CÓ DÙNG ĐƯỢC KHÔNG ?

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC.

Tác dụng phụ thường rất nhẹ và thoáng qua. Hiếm khi gặp khó chịu ở dạ dày, nôn, ăn khó tiêu hay tiêu chảy khi đó nên uống thuốc trong bữa ăn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC?

Nếu quên một lần không dùng thuốc thì dùng bù ngay một liều thuốc khi bạn nhớ ra, ngoại trừ lúc đó đã sát gần thời điểm phải dùng liều thuốc tiếp theo. Không được dùng 2 liều thuốc cùng một lúc. Các liều thuốc còn lại nên dùng cho đúng giờ.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU.

Không có báo cáo về sử dụng quá liều.

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO

Nếu như lỡ dùng thuốc quá liều cần báo cáo ngay với bác sĩ của bạn để được hướng dẫn xử trí thích hợp.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ ?

Khi bạn có điều chi thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin, đừng ngần ngại hỏi ngay ý kiến của bác sĩ.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC LÀ BAO LÂU:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc khi đã hết hạn sử dụng được ghi trên nhãn hộp.

CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO ?

Bảo quản nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

Đề xa tầm tay trẻ em.

NGÀY XEM XÉT TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN: 10/09/2013

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Áp 2 - Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh

ĐT : (08) 37950611

Fax : (08) 37950614.

Email: info@bvpharma.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh