

Thuốc nhỏ mắt **HAMERON**

SĐK: VN-15585-12

■ THÀNH PHẦN

Mỗi lọ 5ml chứa:

Hoạt chất: Natri hyaluronat..... 5mg

Tá dược: Dung dịch Benzalkonium clorid, dinatri edetat, acid aminocaproic, dibasis natri phosphat, natri phosphat monobasic, natri clorid, kali clorid, acid hydrocloric, natri hydroxyd, nước tinh khiết vô trùng.

■ MÔ TẢ

Natri hyaluronat là hoạt chất sinh học, được chiết xuất từ mào gà, có tác dụng giữ ẩm trên bề mặt giác mạc, giúp tái tạo biểu mô, nhanh chóng làm lành giác mạc bị tổn thương. Natri hyaluronat tan trong nước tạo thành dung dịch sánh trong suốt, không màu.

■ DẠNG BẢO CHẾ

Dung dịch nhỏ mắt.

■ CHỈ ĐỊNH

- Làm giảm khô mắt và làm chất bôi trơn khi sử dụng kính áp tròng.
- Dùng trong phẫu thuật mắt (ví dụ thay thủy tinh thể) để chống dính và ngăn ngừa tổn thương mô mắt.

■ LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều thông thường là 1 giọt nhỏ vào mắt, 5-6 lần/ngày.

Liều dùng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh.

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng thuốc cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

■ THẬN TRỌNG

Thuốc chỉ dùng để nhỏ vào mắt.

Đề tránh nhiễm khuẩn, không để đầu nhỏ giọt của lọ thuốc chạm vào mắt.

Không được sử dụng khi mang kính sát tròng.

■ TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc này với các thuốc khác.

■ SỬ DỤNG THUỐC Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có những nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng thuốc ở phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú. Chỉ sử dụng thuốc này cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú khi đã cân nhắc lợi ích của việc điều trị với nguy cơ có thể xảy ra.

■ TÁC ĐỘNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không tác động đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

■ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Kích ứng mắt, chảy nước mắt và ngứa mắt đôi khi xảy ra, nhưng hiếm.

** Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

■ QUÁ LIỀU

Chưa có trường hợp quá liều nào khi dùng thuốc nhỏ mắt HAMERON được báo cáo.

■ BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao gói kín, ở nhiệt độ dưới 30°C.

■ HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Dùng thuốc trong vòng 1 tháng kể từ ngày mở nắp.

** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*

■ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ 5ml.



Sản xuất bởi:

SAMCHUNDANG PHARM. CO., LTD.

71, Jeyakongdan 2-gil, Hyangnam-eup,

Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc