

Rx Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin,
xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Để xa tầm với trẻ em.



Kem HOECLODERM

Thành phần: Kem màu trắng có chứa:

Hoạt chất chính: Clobetasol propionate 0,568% kl/kl
(tương đương với Clobetasol 0,05% kl/kl)

Tá dược: Cetomacrogol 1000, Cetostearyl Alcohol, Paraffin trắng mềm, Paraffin lỏng, Chlorocresol, Propylene glycol, Monobasic Sodium Phosphate, nước tinh khiết.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Clobetasol propionate có tác dụng kháng viêm, chống ngứa và co mạch. Khi bôi ngoài da, đặc biệt là trong điều kiện băng kín hoặc da bị tổn thương, thuốc có thể hấp thu đủ để gây tác dụng toàn thân. Corticosteroid gắn mạnh với protein huyết tương. Chỉ có phần corticosteroid không liên kết với protein huyết tương mới có tác dụng dược lý hoặc bị chuyển hóa. Thuốc được chuyển hóa chủ yếu tại gan và thận rồi được đào thải qua nước tiểu.

DƯỢC LỰC HỌC: Clobetasol probionat là một corticosteroid gắn fluor sử dụng tại chỗ có tác dụng kháng viêm, chống ngứa và co mạch.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị ngắn hạn các biểu hiện viêm và ngứa của các bệnh lý da ở mức độ trung bình đến nặng đáp ứng với corticosteroid.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với chế phẩm, mụn trứng cá đỏ, mụn trứng cá thông thường, viêm da quanh miệng, nhiễm virus da nguyên phát (ví dụ như herpes simplex, bệnh đậu mùa). Chống chỉ định dùng kem Hoecloderm để điều trị những tổn thương nhiễm trùng da nguyên phát do nhiễm vi nấm (ví dụ như candida, nấm da), hoặc nhiễm khuẩn (ví dụ như chốc lở), ngứa quanh hậu môn và ngứa sinh dục.

TÁC DỤNG PHỤ: Các phản ứng phụ tại chỗ đã được báo cáo là cảm giác nóng rát, ngứa, kích ứng, khô da, viêm nang lông, chứng tăng lông tóc, phát ban dạng trứng cá, giảm sắc tố, giập da, nhiễm trùng thứ phát, teo da, vân da, ban hạt kê. Dùng corticosteroid liều cao có thể gây ra các triệu chứng loại tăng năng vô thương thận, gồm mặt béo tròn, chứng rậm lông, bướu trâu, chứng đở bừng, đôi khi dẫn đến hội chứng Cushing.

* Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

THẬN TRỌNG: Ngưng dùng thuốc nếu tình trạng kích ứng da hoặc quá mẫn xuất hiện. Đặc biệt cần phải thận trọng khi dùng thuốc cho trẻ em vì khả năng hấp thụ thuốc toàn thân có thể xảy ra khi dùng tại chỗ do đó gây ra tình trạng chậm phát triển. Thận trọng khi bôi thuốc trên diện rộng. Tránh dùng thuốc liên tục trong thời gian dài. Không dùng thuốc để tra mắt.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Rửa sạch và lau khô vùng da bị bệnh, bôi một lớp kem mỏng Hoehocloderm lên vùng da bị bệnh và chà xát kĩ, dùng một hoặc hai lần mỗi ngày theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Nếu những triệu chứng bệnh không được cải thiện, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Chế phẩm này chỉ dùng để điều trị cho tình trạng bệnh hiện tại của bạn mà thôi. Không được để cho người khác dùng chung thuốc và sau khi điều trị sau phải vứt bỏ ống thuốc thừa.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC: Chưa rõ

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Độ an toàn của thuốc khi sử dụng trong thời kỳ mang thai và thời kỳ cho con bú chưa được chứng minh. Do đó, chỉ nên sử dụng thuốc khi lợi ích thu được vượt hẳn rủi ro tiềm tàng có thể xảy đến với thai nhi hoặc trẻ bú mẹ.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa rõ

QUÁ LIỀU: Corticosteroid bôi ngoài da có thể được hấp thu đủ gây ra tác dụng toàn thân như ức chế trực dưới đồi – tuyến yên – thượng thận, tiến triển hội chứng Cushing, tăng đường huyết và glucose niệu. Các xét nghiệm có thể giúp ích trong việc đánh giá tình trạng ức chế trực dưới đồi – tuyến yên – thượng thận bao gồm xét nghiệm cortisol tự do trong nước tiểu và nghiệm pháp kích thích ACTH. Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy trực dưới đồi – tuyến yên – thượng thận bị ức chế, cần ngưng thuốc, giảm tần suất sử dụng hoặc thay bằng một steroid yếu hơn. Có thể cần phải bổ sung corticosteroid tác dụng toàn thân nếu phát hiện thấy các dấu hiệu và triệu chứng cai steroid.

ĐÓNG GÓI: 5g, 15g/ống nhôm mềm/hộp giấy.

BẢO QUẢN: Giữ thuốc trong hộp kín, tránh ánh sáng mạnh. Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C. Thuốc chỉ dùng để thoa ngoài da. Giữ thuốc tránh xa tầm tay trẻ em.

HẠN DÙNG: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng thuốc quá thời hạn sử dụng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Sản xuất bởi:

HOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.

**Lot 10, Jalan Sultan Mohd. 6, Bandar Sultan Suleiman,
42000 Port Klang, MALAYSIA**