

# LEGALON® 140

## Viên nang

Hoạt chất: Cao khô của quả cây Silybum marianum

**Đọc tất cả tờ hướng dẫn sử dụng này cẩn thận trước khi dùng thuốc vì nó chứa thông tin quan trọng cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc thêm hoặc cần thêm lời khuyên xin hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ.**

- Hãy giữ tờ hướng dẫn sử dụng này. Bạn có thể cần đọc lại nó.
- Bạn phải đến gặp bác sĩ nếu các triệu chứng xấu đi hoặc không cải thiện.

### Thành phần

1 viên nang chứa 173,0 mg - 186,7 mg cao khô của quả cây Silybum marianum (36-44:1), tương ứng với 140 mg silymarin (DNPH), được tính dưới dạng silybinin (dung môi chiết: ethyl acetat).

Tá dược: Polysorbat 80, povidon, mannitol, tinh bột natri glycollate (type A), magnesi stearat, oxid sắt màu đỏ E 172, oxid sắt màu đen E 172, titan dioxit E 171, gelatin, natri lauryl sulphat.

### Chỉ định

LEGALON 140 là một dược thảo dùng để điều trị bệnh về gan. Nó được dùng điều trị hỗ trợ trong tổn thương gan do nhiễm độc ở những bệnh nhân bị bệnh viêm gan mạn tính hoặc xơ gan.

*Lưu ý:* Điều trị bằng LEGALON 140 chỉ hữu ích khi loại trừ được chất độc gây tổn thương gan (ví dụ rượu).

### Chống chỉ định

#### Không được dùng LEGALON 140

- nếu bạn bị quá mẫn cảm (dị ứng) với quả cây Silybum marianum hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

### Thận trọng

#### Lưu ý đặc biệt khi dùng LEGALON 140

Việc điều trị bằng thuốc này không phải là biện pháp thay thế để tránh khỏi nguyên nhân gây tổn thương gan (ví dụ rượu).

Hỏi ý kiến bác sĩ nếu thấy vàng da (da nhuộm màu vàng nhẹ đến vàng sẫm, trông trắng mắt đổi màu vàng).

Chưa có đủ dữ liệu về việc dùng thuốc này cho trẻ em. Vì vậy, không nên dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

#### Dùng LEGALON 140 với thức ăn và thức uống

Không có hạn chế đặc biệt.

#### Phụ nữ có thai

Chưa có đủ dữ liệu về việc dùng LEGALON 140 cho phụ nữ có thai. Vì vậy, trong trường hợp này không nên dùng LEGALON 140.

#### Cho con bú

Chưa có đủ dữ liệu về việc dùng LEGALON 140 cho phụ nữ cho con bú. Vì vậy, trong trường hợp này không nên dùng LEGALON 140.

#### Lái xe và sử dụng máy móc

Không có hạn chế đặc biệt.

#### Đang dùng thuốc khác

Xin thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn đang dùng hoặc mới đây đã dùng bất kỳ thuốc nào khác, ngay cả những thuốc không phải do kê đơn.

#### Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác

Chưa được biết.

### Liều dùng và cách dùng

Phải luôn dùng LEGALON 140 chính xác như bác sĩ đã chỉ dẫn cho bạn. Bạn nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn không biết chắc.

Liều thường dùng là 1 viên nang, 3 lần/ngày, tương ứng với 420 mg silymarin.

Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn có ấn tượng là tác dụng của LEGALON 140 quá mạnh hoặc quá yếu.

Đường dùng: Đường uống.

### Quá liều và xử trí

Cho đến nay chưa rõ các dấu hiệu quá liều hoặc ngộ độc. Các tác dụng phụ có thể tăng lên. Nếu cần, hãy để bác sĩ của bạn quyết định biện pháp điều trị triệu chứng.

### Nếu bạn quên dùng LEGALON 140...

Không được dùng một liều gấp đôi để bù cho các liều đơn đã quên.

### Tác dụng khi việc điều trị bằng LEGALON 140 bị ngừng lại:

Chưa được rõ.

### Tác dụng không mong muốn

Giống như tất cả các thuốc, LEGALON 140 có thể có các tác dụng phụ.

Trong trường hợp hiếm gặp đã ghi nhận rối loạn tiêu hóa, ví dụ như tác dụng nhuận trường nhẹ. Phản ứng quá mẫn cảm rất hiếm gặp như ban hoặc khó thở có thể xảy ra; trong trường hợp như thế ngừng điều trị và đến gặp bác sĩ.

**Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào không được đề cập trong tờ hướng dẫn sử dụng này, xin thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ.**

### Bảo quản LEGALON 140

Bảo quản dưới 30°C.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng đã ghi trên bao bì.

### Hạn dùng

60 tháng kể từ ngày sản xuất.

### Quy cách đóng gói

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

Hộp 6 vỉ x 10 viên nang

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

### Nhà sản xuất

MADAUS GmbH, 51101 Cologne, Germany

Cơ sở sản xuất:

Luetticher Str. 5,

53842 Troisdorf, Germany

Tel: +49 221 8998-0

Telefax: +49 221 8998-711

E-Mail: [info@madaus.de](mailto:info@madaus.de)

### Ngày hiệu chỉnh tờ hướng dẫn sử dụng

09-2005 . H/M