

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MEKEN®
MEKEN-080917

MEKEN®

(HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ)

Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Tác dụng - Chỉ định:

* **Tác dụng:**

Bổ huyết, hoạt huyết, ôn kinh, thông mạch.

* **Chỉ định:**

- Hỗ trợ người bị tai biến mạch máu não (Như: xơ vữa động mạch não gây ra tai biến do chảy máu não, tai biến do thiếu máu não trong nhồi máu não hay còn gọi là nhũn não).

- Người bị di chứng sau tai biến mạch máu não như: liệt nửa người, tê chân, tê tay, miệng méo, mắt xếch, nói ngọng.

- Người có dấu hiệu tiền triệu chứng của tai biến mạch máu não: tê chân tay, tê miệng như kiến bò hoặc mất cảm giác nhẹ.

- Người bị bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch, huyết khối trong mạch máu gây đau thắt ngực.

Chống chỉ định:

Trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú.

Trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

Chưa có báo cáo.

Tác dụng không mong muốn: Thuốc có thể gây mất ngủ.

Liều dùng - Cách dùng:

- Liều điều trị: Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên. Uống liên tục 10 ngày sau đó nghỉ 1 ngày. Mỗi đợt điều trị kéo dài 30 ngày. (Có thể dùng 3 đợt liên tục).

- Liều dự phòng tái phát và duy trì: Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.

- Liều dự phòng tai biến mạch máu não: Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Có thể dùng dài ngày.

***Chú ý:** Không uống thuốc trước khi đi ngủ.

Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc:

Chưa có báo cáo.

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

Chưa có báo cáo.

Quá liều và xử trí: Chưa có báo cáo về các tác dụng phụ khi dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều thì các lần dùng tiếp theo sử dụng đúng liều theo chỉ dẫn.

Dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo: Chưa có báo cáo.

Quy cách đóng gói:

Hộp: 2,3 vỉ x 10 viên.

Hộp: 1 lọ 30, 60, 100 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày SX ghi trên hộp sản phẩm.

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 1800.6689 - Fax: 0272.3817.337

**Điện thoại 1800.6689
(trong giờ hành chính)**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MEKEN®

(HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH)

Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Thành phần (Cho 1 viên nén bao phim): Băng phiến (Borneolum Syntheticum) 26,6mg. 500mg cao khô tương đương: Nhân sâm (Radix Ginseng) 800mg, Dương quy (Radix Angelicae sinensis) 800mg, Tần giao (Radix Gentianae macrophyllae) 800mg, Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici) 533,3mg, Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 800mg, Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae) 800mg, Bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae) 800mg, Ngô thù du (Fructus Euodiae rutaecarpae) 533,3mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.

Thuốc dùng cho bệnh gì:

Thuốc có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, ôn kinh, thông mạch. Dùng để hỗ trợ người bị tai biến mạch máu não (Như: xơ vữa động mạch não gây ra tai biến do chảy máu não, tai biến do thiếu máu não trong nhồi máu não hay còn gọi là nhũn não). Người bị di chứng sau tai biến mạch máu não như: Liệt nửa người, tê chân, tê tay, miệng méo, mắt xếch, nói ngọng. Người có dấu hiệu tiền triệu chứng của tai biến mạch máu não: tê chân tay, tê miệng như kiến bò hoặc mất cảm giác nhẹ. Người bị bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch, huyết khối trong mạch máu gây đau thắt ngực.

Khi nào không nên dùng thuốc này:

Trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú

Tác dụng không mong muốn: Thuốc có thể gây mất ngủ.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều dùng:

Cách dùng, đường dùng và liều dùng:

- Liều điều trị: Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên. Uống liên tục 10 ngày sau đó nghỉ 1 ngày. Mỗi đợt điều trị kéo dài 30 ngày. (Có thể dùng 3 đợt liên tục).

- Liều dự phòng tái phát và duy trì: Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.

- Liều dự phòng tai biến mạch máu não: Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Có thể dùng dài ngày.

*Chú ý: Không uống thuốc trước khi đi ngủ.

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này: Chưa có báo cáo.

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc: Nếu quên không dùng thuốc 1 lần, thì tiếp tục dùng thuốc lần tiếp theo đúng liều lượng chỉ dẫn.

Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ: Cần tham vấn bác sĩ khi đang dùng đồng thời với các loại thuốc khác. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều thì các lần dùng tiếp theo sử dụng đúng liều theo chỉ dẫn.

Chú ý: Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Quy cách đóng gói:

Hộp: 2,3 vỉ x 10 viên.

Hộp: 1 lọ 30, 60, 100 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày SX ghi trên hộp sản phẩm.

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 1800.6689 - Fax: 0272.3817.337

**Điện thoại 1800.6689
(trong giờ hành chính)**