

Vaginal suppository

DTP
ĐƯỢC TIỀN PHONG

Metagin

Metronidazole • Nystatin
Neomycin sulfate



Packaging with applicator

Box of 2 blisters x 5 suppositories



Viên đặt âm đạo Metagin

Giới thiệu:

Viên đặt âm đạo Metagin được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh phụ khoa do nhiều nguyên nhân khác nhau như nhiễm khuẩn, nhiễm ký sinh trùng. Được sử dụng trong các trường hợp bị đỏ, ngứa, rát và có dấu hiệu của bệnh nấm và viêm âm đạo, âm hộ.

Thành phần:

Metronidazol, Neomycin sulfat, Nystatin, Hardfat.

Quy cách đóng gói:

Hộp 2 vỉ 6 viên.

Công dụng:

Giúp hỗ trợ điều trị các trường hợp bị nấm âm đạo, viêm nhiễm âm đạo, âm hộ với các biểu hiện như sau: nóng, đỏ và sưng âm đạo và âm hộ, đau rát khi đi tiểu hoặc khi quan hệ tình dục, dịch tiết âm đạo đặc, màu trắng, dạng cục vón như phô mai, có mùi hôi.

Đối tượng không sử dụng:

Những người dị ứng với thành phần của sản phẩm

Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng:

Đặt 1 viên vào trong âm đạo, vào buổi tối, trong vòng 12 ngày liên tiếp.

Cách sử dụng:

Viên đặt nên được đưa vào âm đạo càng sâu càng tốt, và thời gian sử dụng tốt nhất là trước khi đi ngủ vào ban đêm để không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Rửa sạch tay trước khi bóc vỉ và sau khi sử dụng sản phẩm.

Cách sử dụng thanh đẩy:



1 Vệ sinh sạch sẽ tay trước khi sử dụng



2 Bóc viên đặt, để vào phần đầu của thanh đẩy



3 Giữ tư thế thoải mái như đứng, ngồi xổm, cúi người về phía trước bằng thắt lưng, đứng nâng một chân lên ghế hoặc nằm với cẳng chân hơi gấp lại
Đưa thanh đẩy vào âm đạo sâu khoảng 2-3 cm, ấn pittong nhẹ nhàng đẩy viên đặt vào âm đạo



4 Vệ sinh thanh đẩy bằng nước sôi sau khi sử dụng, để khô.
Bảo quản nơi khô ráo



Chú ý:

- Viên đặt có thể mềm hoặc mốc khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

- Trước khi dùng nên để trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ từ 2-8°C. Kiểm tra viên đặt trước khi dùng phải đảm bảo đủ độ cứng, dễ dàng đưa viên đặt vào âm đạo. Bóc viên ra phải nhét ngay vào âm đạo vì rời lớp vỏ, viên dễ tan nhanh

- Nên sử dụng băng vệ sinh để không dây bẩn ra quần áo

Lưu ý:

Nếu xuất hiện các triệu chứng xấu đi trong khi dùng Viên đặt âm đạo **Metagin** hoặc có tình trạng viêm, ngứa kéo dài, hãy thông báo với bác sĩ chuyên khoa.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI.

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội