

Miclacol Blue® - F

CÔNG THỨC:

Camphre Monobromé .. 20 mg
Bleu de Méthylène 20 mg
Tá dược vđ ...1 viên bao đường

CHỈ ĐỊNH:

- Thuốc có tác động làm giảm xung huyết vùng xương chậu, giúp sát khuẩn đường niệu sinh dục.
- Điều trị hỗ trợ tình trạng viêm, đau trong trường hợp nhiễm trùng đường tiểu dưới tái phát không biến chứng.

LIỀU DÙNG:

- Uống 6 - 9 viên/ ngày, chia làm 2 - 3 lần, trong khi ăn, uống với nhiều nước.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người bị suy thận, người bệnh thống phong.
- Trẻ em dưới 15 tuổi.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Thiếu máu, tan máu, buồn

THẬN TRỌNG:

- Bleu de Méthylène gây tan máu đặc biệt ở trẻ nhỏ và người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase.
- Dùng kéo dài Bleu de Méthylène có thể dẫn đến thiếu máu do tăng phá hủy hồng cầu.

TRÌNH BÀY:

- Hộp 05 vỉ x 10 viên.
- Hộp 10 vỉ x 10 viên.

HẠN DÙNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN:

- Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

- Để xa tầm tay của trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

USA - NIC PHARMA Co.,Ltd

Lô 11D, Đường C, KCN Tân Tạo, TP.HCM