



MẪU HỘP CHAI 60 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG  
NASALIS


21430 (T9/1018)  
(3)

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT  
Lần đầu: 17/05/2018



**CÔNG THỨC:**  
Thương nhĩ tử  
Fructus Xanthii strumarii .....150 mg  
Kim ngân hoa  
Flos Lonicerae .....150 mg  
Hoàng cầm  
Radix Scutellariae .....120 mg  
Tân di hoa  
Flos Magnoliae .....80 mg  
Mạch môn  
Radix Ophiopogonis japonici ....120 mg  
Huyền Sâm  
Radix Scrophulariae .....120 mg  
Mẫu Đơn bì  
Cortex Paeoniae suffruticosae ..120 mg  
Địa Hoàng  
Radix Rehmanniae glutinosae ...150 mg  
Tá dược: vớ 1 viên

**PP.Pharco**  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ  
CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM  
Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM  
ĐT: (028) 37.547.997 Web: www.duocphongphu.com.vn



**CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KÈM THEO.

**BẢO QUẢN:**  
Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ 30°C

**SDK:**  
SẢN XUẤT THEO TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẒ EM,  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG,  
DÙNG ĐƯỜNG UỐNG.

SLSX :  
NSX :  
HD :




Handwritten signature



Ngày 28 tháng 08 năm 2018...  
DUYỆT

GIÁM ĐỐC  
D.S. Hồ Vinh Hiển

MẪU NHÃN CHAI 60 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG  
NASALIS

<p><b>CÔNG THỨC:</b>          Thương nhĩ tử          Fructus Xanthii strumarii ..... 150mg          Kim ngân hoa          Flos Lonicerae ..... 150mg          Hoàng cầm          Radix Scutellariae ..... 120mg          Tân di hoa          Flos Magnoliae ..... 80mg          Mạch môn          Radix ophiopogonis japonici .... 120mg          Huyền sâm          Radix Scrophulariae ..... 120mg          Mẫu Đơn bì          Cortex Paeoniae suffruticosae ... 120mg          Địa Hoàng          Radix Rehmanniae glutinosae .. 150mg          Tá dược: vớ 1 viên          SẢN XUẤT THEO TCCS</p>	 <p><b>NASALIS</b><sup>®</sup>          Viêm Xoang  <i>Nguyên gốc          thảo dược</i></p> <p>Thước kê đơn          Chai 60 viên nén bao đường</p> <p>PP. PHARCO          SINCE 1982          GMP          WHO          USARICHPHARM</p>	<p><b>CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:</b> XEM TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KÈM THEO.</p> <p><b>BẢO QUẢN:</b>          Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ 30°C</p> <p><b>SĐK:</b></p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p>ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.          ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG.          DÙNG ĐƯỜNG LƯỢNG.</p> </div> <p>SLSX :          NSX :          HD :</p>
--	--	--

*Handwritten signature*



Ngày .. tháng .. năm ..

DUYỆT

GIÁM ĐỐC  
Ds. Hồ Vinh Hiển



**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC**

**Rx**  
**THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC**

**NASALIS**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

**THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ  
NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC**

**1. Thành phần công thức thuốc:**

**Thành phần dược chất:**

Thương nhĩ tử ( <i>Frutus Xanthii Strumarii</i> )	150 mg
Kim ngân hoa ( <i>Flos Lonicerae</i> )	150 mg
Địa hoàng ( <i>Radix Rehmanniae glutinosae</i> )	150 mg
Huyền sâm ( <i>Radix Scrophulariae</i> )	120 mg
Mạch môn ( <i>Radix Ophiopogonis japonica</i> )	120 mg
Mẫu đơn bì ( <i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i> )	120 mg
Hoàng cầm ( <i>Radix Scutellariae</i> )	120 mg
Tân di hoa ( <i>Flos Magnoliae</i> )	80 mg

**Thành phần tá dược:** Tinh bột sắn, Lactose, Povidon K30, Gelatin, Magnesi stearate, Talc, Đường trắng, Sáp ong trắng.

**Dạng bào chế:** Viên nén bao đường, màu trắng, hình trụ dẹt, hai mặt lõm, nhân bên trong màu nâu xám. Vị ngọt hơi đắng.

**2. Công năng – chỉ định:**

Viêm xoang, viêm mũi dị ứng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, sổ mũi, hắt hơi, nhức đầu, đau nhức vai gáy, cổ, đau vùng xương mặt, vùng trán, ho đàm nhớt, ù tai, nhức mắt.

**3. Cách dùng, liều dùng:**

**Cách dùng:** Dùng đường uống.

**Liều dùng:**

Người lớn: Uống 3 - 4 viên/ lần x 3 lần/ ngày

Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

**Khuyến cáo nếu quên uống một liều thuốc:** Uống ngay 1 liều khi bạn nhớ ra mình đã quên uống thuốc. Nhưng nếu thời gian nhớ ra gần liều kế tiếp thì bỏ liều đã quên và uống như theo thời gian quy định. Không được uống gấp đôi liều trong trường hợp quên dùng thuốc.

**4. Chống chỉ định:**

Không dùng cho trẻ em dưới 01 tuổi, phụ nữ có thai, người tiểu đường

Người tiểu đường, viêm tắc mắt.

**5. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:**

Không nên ăn mặn, thức ăn tanh, không uống nước đá, tắm nước lạnh khi dùng thuốc.

**6. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

**Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai:** Không sử dụng cho phụ nữ có thai

**Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú:** Không có dữ liệu về việc sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú.



**7. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:**

Không gây ảnh hưởng

**8. Tương tác, tương kỵ của thuốc:**

Chưa có báo cáo

**9. Tác dụng không mong muốn:**

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

*Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**10. Quá liều và cách xử trí:**

Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

**11. Quy cách đóng gói:**

– Hộp 1 chai x 60 viên nén bao đường kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

**12. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:**

Điều kiện bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.


Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: Theo TCCS số 08-B-0003 - 2013

**13. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:**

**Tên cơ sở sản xuất:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ – CHI NHÁNH NHÀ MÁY USARICHPHARM

**Địa chỉ:** Lô 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.



TU. CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
*Nguyễn Ngọc Anh*



Ngày 18 tháng 08 năm 2018

Giám đốc

DS. Hồ Vinh Hiển

