

NEW HEPALKEY

SĐK: VD-19706-13

◆ **THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất:

L-Ornithine -L- Aspartate 80 mg
DL-alpha tocopheryl acetate..... 50 mg

Tá dược:

Dầu tỏi, Dầu đậu nành, Sáp ong trắng, Dầu lecithin, Dầu cọ, Dầu anh thảo, Gelatin, Glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, Ethyl vanilin, Nước tinh khiết, Màu vàng số 4 (Tartrazin FCF), Oxid sắt đỏ, Màu xanh số 1 (Brilliant blue FCF), Màu đỏ số 40 (Allura red AC), Titan dioxide.

◆ **DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang mềm

◆ **CHỈ ĐỊNH**

Dùng trong trường hợp tăng amoniac do mắc phải các bệnh về gan: viêm gan cấp và mãn tính, xơ gan, gan nhiễm mỡ.

◆ **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG**

Dùng thuốc theo đường uống.

- Người lớn: Mỗi lần uống 2 viên, ngày 2 lần.
- Trẻ em: Mỗi lần uống 1 viên, ngày 2 lần.

◆ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

- Bệnh nhân suy giảm chức năng thận.
- Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

◆ **THẬN TRỌNG**

- Dùng thuốc lâu ngày, cần chú ý đến lượng urê trong huyết tương và trong nước tiểu.
- Cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai.

◆ **TƯƠNG TÁC THUỐC**

- Vitamin E bảo vệ vitamin A không bị phân huỷ do oxy hóa, làm cho nồng độ vitamin A trong tế bào tăng lên, đồng thời cũng chống lại tác dụng của chứng thừa vitamin A.
- Vitamin E cũng làm tăng thời gian làm đông máu của vitamin K.

◆ **SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Thuốc đi qua sữa mẹ và nhau thai, do vậy chỉ dùng thuốc khi thấy thiếu hụt các thành phần của thuốc (thiếu vitamin E hoặc L-Ornithine và L-Aspartate) trong khẩu phần ăn hàng ngày.

◆ **ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC**

Chưa có tài liệu chứng minh thuốc ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

◆ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**

Thuốc thường được dung nạp tốt. Liều cao có thể gây tiêu chảy, đau bụng và các rối loạn tiêu hóa khác. Cảm giác rát bỏng ở thanh quản hoặc buồn nôn có thể xảy ra.

* Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

◆ **QUÁ LIỀU:** Dùng thuốc quá liều có thể gây đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi...

◆ **BẢO QUẢN:** Bảo quản trong hộp kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

◆ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.

◆ **ĐÓNG GÓI:** Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm. Hộp 12 vỉ x 10 viên nang mềm.

Sản xuất bởi

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương