

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO NUVAGYL



### **Giới thiệu:**

Clindamycin là một loại kháng sinh phổ rộng được sử dụng trong các trường hợp bệnh nhiễm khuẩn do các sinh vật nhạy cảm. Clindamycin phân ly peptidyl-tRNA khỏi ribosome của vi khuẩn, do đó làm gián đoạn quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn. Clotrimazol là một chất chống nấm imidazol được sử dụng chủ yếu trong nhiễm nấm. Clotrimazol ức chế sinh tổng hợp sterol, một thành phần thiết yếu của màng tế bào nấm, do đó làm hỏng và ảnh hưởng đến tính thấm của màng tế bào vì vậy làm rò rỉ và mất các hợp chất nội bào cần thiết, và cuối cùng gây ra sự ly giải tế bào. Với sự kết hợp của hai thành phần trên, **Nuvagyl** có tác dụng hiệu quả trong các trường hợp nhiễm khuẩn và nấm âm đạo rõ và không rõ nguyên nhân.

### **Thành phần**

Clindamycin (dưới dạng clindamycin phosphat) 100 mg, Clotrimazol 100 mg, tween 80, span 80, hard fat vừa đủ 1 viên.

### **Quy cách đóng gói**

Hộp 1 vi 7 viên

Hộp 2 vi 7 viên

### **Công dụng:**

Sử dụng trong các trường hợp: Viêm âm đạo, viêm âm hộ - âm đạo và viêm cổ tử cung gây nên do vi khuẩn *Trichomonas vaginalis*, nấm *Candidas*, *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma sp.* và *Mobilicus*.....

Sử dụng trong các trường hợp nhiễm nấm, vi khuẩn không rõ nguyên nhân

### **Hướng dẫn sử dụng**

Sử dụng 1 viên đặt âm đạo hàng ngày, liên tục trong ít nhất 7 ngày. Trong 1 vài trường hợp sử dụng có thể dùng 2 viên trong 1 ngày.

Viên đặt được đặt vào sâu trong âm đạo. Nên đặt vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Chú ý: Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản ở điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút

Trước khi dùng nên để trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ từ 2°C-8°C. Kiểm tra viên đặt trước khi dùng phải bảo đảm đủ độ cứng, dễ dàng đưa viên đặt vào âm đạo. Bóc viên ra phải nhét ngay vào âm đạo vì rời lớp vỏ, viên dễ tan nhanh

### **Thận trọng:**

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Không nên sử dụng thuốc trong thời kỳ kinh nguyệt

### **Điều kiện bảo quản**

Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Nhà sản xuất**



**Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội**

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.