

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

I. NHÃN HỘP:

GMP-WHO

HỘP 50 VỈ x 10 VIÊN NGẬM

CÔNG THỨC:
 Menthol.....3mg
 Eucalyptol.....0,5mg
 Tá dược vừa đủ.....1 viên

CHỈ ĐỊNH:
 Sát khuẩn vùng miệng và họng. Làm giảm các triệu chứng ho, viêm họng, đau họng, rát cổ, khản tiếng.

CÁCH DÙNG:
 - Người lớn: 10 - 15 viên/ngày.
 - Trẻ em: 3 - 8 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THÔNG TIN KHÁC:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM - SX theo TCCS.
 Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

BỘ Y TẾ
 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 ĐÃ PHÊ DUYỆT
 Lần đầu: 6/2/17

M.S.D.N: 0302533156 - C.T.C.P
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 HÓA - DƯỢC PHẨM
 MEKOPHAR
 QUẬN 11 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Handwritten signature



CTCP HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 297/5 Lý Thường Kiệt-Q.11-TP. HCM-Việt Nam


SDK:

Số lô SX:
 Ngày SX:
 HD :



II. NHÃN VỈ:

(Số lô SX, hạn dùng in phun trên vỉ)



NAS

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

PASTITUSSIN

Viên ngậm

CÔNG THỨC: Cho 1 viên

- Menthol.....3 mg
- Eucalyptol.....0,5 mg
- Tá dược vừa đủ..... 1 viên.

(Đường trắng, Carboxymethylcellulose sodium, Talc, Povidone, Magnesium stearate)

TÍNH CHẤT:

PASTITUSSIN là sự kết hợp của 2 chất:

- Menthol: có tác dụng sát khuẩn, làm giảm ho, giảm đau tại chỗ.
- Eucalyptol: có tác dụng sát khuẩn.

CHỈ ĐỊNH:

- Sát khuẩn vùng miệng và họng. Làm giảm các triệu chứng ho, viêm họng, đau họng, rát cổ, khàn tiếng.

CÁCH DÙNG:

Ngậm viên thuốc cho tan từ từ trong miệng, không nên nhai hay nuốt.

- Người lớn: 10 - 15 viên/ngày.
- Trẻ em: 3 - 8 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Trẻ em dưới 30 tháng.
- Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG:

- Thận trọng với bệnh nhân tiểu đường vì mỗi viên ngậm có chứa 0,75 g đường.

THỜI KỲ MANG THAI – CHO CON BÚ:

Phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Liều sử dụng chưa có tác dụng phụ.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Chưa thấy có tương tác giữa PASTITUSSIN với các thuốc khác.
- Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

QUÁ LIỀU & CÁCH XỬ TRÍ:

- Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRÌNH BÀY: Hộp 50 vi x 10 viên.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.**

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày 25 tháng 03 năm 2014

Tổng Giám Đốc



DS. Huỳnh Thị Lan

TUO.CUC TRUONG
P. TRUONG PHONG
Đỗ Minh Hùng