



Hỗn dịch uống nhỏ giọt

PESACME

Simethicone + Saccaromices Boulardii
Hỗn dịch có tác dụng trên chức năng dạ dày

Hỗn dịch uống ngay PESACME là một sản phẩm gồm:

- Lọ 30ml kèm ống nhỏ giọt chứa nhũ tương Simethicon trong dung dịch nước.
- Chất bảo quản: natri benzoat; chất tạo ngọt: Saccharin sodium; Hương vị dâu.
- Một gói chứa 2g Saccharomyces boulardii, maltodextrins.

Chỉ định Điều trị:

PESACME được chỉ định trong điều trị các trường hợp: các rối loạn tiêu hóa, loạn dưỡng dạ dày ruột, nôn hơi và đau bụng do khí ở trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn.

Dựa vào sự kết hợp của Simethicon (thành phần hoạt tính) và một probiotic (hoạt chất hỗ trợ), chức năng của hỗn dịch uống ngay PESACME là bảo vệ và tái sinh hàng rào sinh học trong ruột (hệ vi sinh vật đường ruột) và cùng lúc giảm sức căng bề mặt của các bong bóng khí trong dạ dày để giúp loại trừ các triệu chứng để cập ở trên.

Simethicon đóng vai trò hoạt động chính (methylpolysiloxane đã được kích hoạt), polymer của methylsiloxane trơ hóa học.

Đặc tính hóa-lý của simethicon là làm giảm sức căng bề mặt; bởi vậy các bong khí trên đường dạ dày-ruột nhập thành các khí tự do, các khí này được thải trừ dễ dàng, việc này giúp giảm tất cả các triệu chứng khó chịu (đau, co cứng, cảm giác căng cứng, ợ hơi, đầy hơi) liên quan tới trường bụng, điển hình của các bệnh trên đường tiêu hóa.

Hoạt động này được hỗ trợ bởi Saccaromyces boulardii hoạt động như là một hệ vi sinh vật tạm thời bảo vệ hệ đường ruột và có tác dụng tốt để hồi phục hệ vi sinh vật. Khi bạn sử dụng trị liệu, các thành phần này được thải trừ trong vài ngày.

Liều lượng và cách dùng:

Liều đơn: 20 giọt chứa 40mg Simethicon

Người lớn: 20-40 giọt, pha loãng trong một chất lỏng, tốt nhất uống sau bữa ăn, 2-4 lần mỗi ngày hoặc theo tư vấn y tế.

Trẻ em: 20 giọt, pha loãng trong một chất lỏng, tốt nhất uống sau bữa ăn, 1-3 lần mỗi ngày hoặc theo tư vấn y tế.

Trẻ sơ sinh: 20 giọt, pha loãng trong một chất lỏng, tốt nhất uống sau bữa ăn, 1-2 lần mỗi ngày hoặc theo tư vấn y tế.

Hướng dẫn sử dụng:

Hỗn dịch Dùng ngay: để đảm bảo sự ổn định và chất lượng của dược phẩm, bột Saccharomyces boulardii được trữ ở môi trường an toàn bên trong gói thuốc và chỉ pha với chất lỏng khi sử dụng. Lắc đều trước khi sử dụng để có được một hỗn dịch đồng nhất. Đậy chặt nắp chai sau mỗi lần dùng. Chú thích ngày tái thiết lập hỗn dịch ở mặt bên của hộp, trong khoảng trống chứa sẵn.

Điều kiện bảo quản:

Bảo quản ở nhiệt độ phòng. Bảo quản sản phẩm đúng cách và tránh xa nguồn nhiệt. Một khi sản phẩm đã được tái thiết lập, nó có thể được bảo quản trong tủ lạnh để cải thiện hoạt động probiotic. Mặc dù vậy, chế phẩm không nên được sử dụng hơn 14 ngày sau khi tái lập hỗn dịch.

Cảnh báo

- Chế phẩm có thể xuất hiện hai lớp riêng rẽ. Sau khi lắc đều sẽ xuất hiện nhũ tương đồng nhất.
- Không sử dụng sản phẩm quá 14 ngày.
- Sau khi tái thiết lập và lắc chế phẩm có thể xuất hiện khối huyền phù không ảnh hưởng tới chức năng và chất lượng của sản phẩm.

- Giữ sản phẩm xa tầm tay trẻ em
- Không sử dụng quá liều khuyến cáo
- Không sử dụng sau ngày hết hạn, ngày hết hạn tham khảo chỉ áp dụng đối với sản phẩm còn nguyên vẹn và bảo quản đúng cách.
- Không sử dụng nếu bao bì không nguyên vẹn
- Tất cả các thành phần tạo thành sản phẩm bao gồm cả ống nhỏ giọt phải được nguyên vẹn.
- Không sử dụng gói bột riêng rẽ mà chỉ để bổ sung thêm vào lọ hỗn dịch.
- Sau một giai đoạn ngắn trị liệu (7 ngày) mà không có kết quả đáng kể, tham khảo bác sỹ.
- Trong trường hợp có phản ứng phụ, ngừng sử dụng chế phẩm và tham khảo bác sỹ để điều chỉnh liệu pháp thích hợp.
- Không sử dụng trong trường hợp nghi ngờ thủng ruột hoặc tắc ruột.
- Trong thời gian sử dụng, nếu bạn thấy ống nhỏ giọt bẩn, làm sạch nó đúng cách trước khi đưa nó lại vào trong lọ để ngăn ngừa khả năng sự ô nhiễm.

Điều quan trọng là thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ của bạn về bất kỳ tác dụng phụ không được liệt kê trong tờ hướng dẫn sử dụng này.

Chống Chỉ định:

Không sử dụng trong trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Tương tác với các thuốc khác và tính tương kỵ.

Không có tương tác với thuốc khác hoặc tương kỵ với các dược phẩm khác được biết hoặc được báo cáo. Trong trường hợp trị liệu với các thuốc dựa trên Levothyroxin tham khảo bác sỹ của bạn trước khi sử dụng chế phẩm.

Phụ nữ mang thai và cho con bú:

Phụ nữ mang thai: Không có dữ liệu đầy đủ về việc sử dụng Pesacme ở phụ nữ mang thai, bởi vậy chỉ sử dụng cho phụ nữ mang thai khi thật sự cần thiết và sau khi được đánh giá bởi bác sỹ.

Phụ nữ cho con bú: Simethicon không được biết có bài tiết vào sữa mẹ hay không, do đó không nên sử dụng trừ khi thật sự cần thiết cho phụ nữ cho con bú và sau khi đánh giá bởi bác sỹ.

Ảnh hưởng của PESACME lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Không có các báo cáo ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng phụ và quá liều:

Simethicone thông thường không có tác dụng phụ khi được dùng theo hướng dẫn trên bao bì hoặc theo chỉ định của bác sỹ; tuy nhiên một số người dùng có thể bị một số tác dụng phụ ít gặp như là:

- Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy; đau bụng và đau hồi tràng và một số trường hợp dị ứng hiếm gặp như:

- Phát ban, sưng mắt, mắt và mũi, sưng cổ họng kèm khó thở (phù mạch)

Nếu gặp trường hợp như trên, lập tức hỏi ý kiến bác sỹ của bạn.

Chưa có triệu chứng quá liều nào được báo cáo.