

Pro-Acidol Plus



THÀNH PHẦN:

- *Bacillus subtilis* R0179 $\geq 10^9$ C
- *Lactobacillus acidophilus* $\geq 10^9$ C
- Fructose Oligosaccharide (FOS) 100g
- Tá dược (Lactose, Hương sữa) vừa đủ 1g

DẠNG BẢO CHẾ: Thuốc bột

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Lọ 50g - Hộp 1 lọ
- Lọ 100g - Hộp 1 lọ

DƯỢC LỰC HỌC:

Pro-acidol plus gồm 2 chủng vi khuẩn có ích cho đường ruột nên có hiệu quả tác dụng cao nhờ tái lập nhanh trạng thái cân bằng hệ vi sinh đường ruột thông qua cơ chế sau:

- *Lactobacillus acidophilus* sản xuất acid lactic và các chất có tác dụng kháng sinh như lactocidin, ngăn cản sự xâm nhập và ức chế sự tăng sinh của các vi khuẩn gây bệnh, giúp cho cơ thể đề kháng với nhiễm khuẩn đường ruột. Ngoài ra, *Lactobacillus acidophilus* còn đóng vai trò sinh lý quan trọng nhờ tổng hợp các vitamin và có khả năng bền vững với 40 loại kháng sinh.
- *Bacillus subtilis* tồn tại trong sản phẩm ở trạng thái bào tử, nhờ vậy khi uống vào dạ dày nó không bị acid cũng như các men tiêu hóa ở dịch vị phá hủy. Ở ruột, bào tử nảy mầm và phát triển thành thể hoạt động, cạnh tranh sinh tồn và ức chế các vi khuẩn gây bệnh đường ruột, tiết các kháng sinh ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, tác dụng lên cả vi khuẩn Gram (-), Gram (+) và nấm gây bệnh, giúp cân bằng hệ vi sinh có ích trong đường ruột, cải thiện hệ thống tiêu hóa, nhất là sau khi sử dụng kháng sinh kéo dài. Ngoài ra, *Bacillus subtilis* còn tổng hợp nhiều chất có hoạt tính sinh học có lợi cho cơ thể như các enzyme thủy phân, các vitamin, acid amin... Chúng cung cấp ngay cho cơ thể một số men cần thiết, làm cho tiêu hóa trở lại bình thường trong khi hệ vi khuẩn ở ruột chưa lập lại trạng thái cân bằng.

CHỈ ĐỊNH:

Hỗ trợ điều trị:

- Rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc dùng thuốc kháng sinh kéo dài như phân sống, đầy bụng, khó tiêu ...
- Trẻ em đi ngoài phân sống.
- Viêm ruột cấp và mãn tính, tiêu chảy, táo bón.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn và trẻ em: Uống 1 - 2 g/ ngày (tương ứng với 1 - 2 muỗng/ ngày). Uống trước bữa ăn 30 phút.
- Trẻ sơ sinh: Uống ½ - 1 g/ ngày (tương ứng với ½ - 1 muỗng/ ngày). Có thể pha với sữa hoặc thức ăn để nguội.
- Trong các trường hợp đầy bụng, khó tiêu, táo bón, tiêu chảy, phân sống, loạn khuẩn đường ruột do thức ăn, rượu bia ...: Uống 3 - 4 g/ ngày (tương ứng với 3 - 4 muỗng/ ngày), cách 3 - 4 giờ dùng 1 g.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thuốc ở dạng bổ sung vi khuẩn nên không có lưu ý và cảnh báo đặc biệt.
- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không có.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Cho đến nay chưa ghi nhận có tác dụng phụ.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Chưa có báo cáo về việc sử dụng quá liều.
- Nếu dùng thuốc quá liều khuyến cáo, bỏ qua liều tiếp theo, sau đó tiếp tục liệu trình như thông thường.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.



Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Văn phòng: 26 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

ĐT: 0258. 3828134 - Fax: 0258. 3828135

Nhà máy: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

ĐT: 0258. 3744263 - Fax: 0258. 3744265

Email: biopharco@dng.vnn.vn

Website: www.biopharco2.com.vn