

Rx-Thuốc bán theo đơn

PROHEPATIS

Dọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đừng xa tay trẻ em.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Thành phần, hàm lượng

Mỗi viên nang mềm chứa:

Hợp chất: Acid ursodeoxycholic..... 200 mg

Tá dược: Dầu đậu nành, dầu lecithin, dầu đậu nành hydrogen hóa 1 phần, chất béo cứng, sáp ong trắng, gelatin, glycerin đậm đặc, ethyl vanillin, titan dioxyd, brilliant blue FCF, quinolin, sunset yellow FCF, allura red AC.

Mô tả sản phẩm

Viên nang mềm hình thuôn, một nửa màu xanh lục đậm, một nửa màu đỏ, bên trong có chứa dịch thuốc sệt màu vàng nhạt.

Quy cách đóng gói

Hộp 20 vỉ x 5 viên nang mềm.

Thuốc dùng cho bệnh gì?

Prohepatis được dùng để làm tan sỏi mật giàu cholesterol. Prohepatis cũng được dùng trong điều trị xơ gan mật nguyên phát và để điều trị cho trẻ em, từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, có bệnh về gan do xơ nang.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Luôn dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ. Bác sĩ sẽ tư vấn về liều lượng bạn nên dùng.

Prohepatis chỉ dùng đường uống. Liều thông thường của người lớn, để làm tan sỏi mật giàu cholesterol, là 2 hoặc 4 viên/ngày, chia làm 2 lần uống sau bữa ăn. Liều thông thường của người lớn để điều trị xơ gan mật nguyên phát là 2-6 viên/ngày, chia làm 2-4 lần uống. Tuy nhiên, liều dùng có thể thay đổi tùy thuộc vào cân nặng của bạn.

Liều dùng của người cao tuổi và trẻ em tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể.

Liều dùng cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, bị chứng xơ nang, được tính dựa trên trọng lượng cơ thể. Thông thường liều khởi đầu hàng ngày là 20mg/kg thể trọng, chia làm 2-3 lần uống, và nếu cần thiết có thể tăng lên tới 30mg/kg thể trọng/ngày.

Ở những bệnh nhân xơ gan mật nguyên phát, triệu chứng có thể tệ hơn vào lúc bắt đầu điều trị, như ngứa có thể tăng, chỉ xảy ra ở vài trường hợp hiếm gặp. Nếu điều này xảy ra, nên tiếp tục với liều dùng hàng ngày thấp hơn. Mỗi tuần, bác sĩ sẽ tăng dần liều hàng ngày, cho đến khi đạt đến liều dùng cần thiết.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về liều lượng đã được kê đơn, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ.

Có thể bạn cần uống Prohepatis kéo dài nhiều tháng để thuốc có hiệu quả. Trong thời gian này bác sĩ sẽ theo dõi tình trạng của bạn.

Khi nào không nên dùng thuốc này?

- không dùng Prohepatis- nếu bạn bị viêm túi mật hoặc đường mật cấp tính
- nếu bạn tắc đường mật
- nếu bạn thường xuyên bị các cơn đau quặn mật (đau định kỳ ở vùng bụng trên). Nếu túi mật có bít không tốt
- nếu sỏi mật của bạn có thể nhìn thấy trên phim X-quang
- nếu bạn đang mang thai hoặc nghĩ rằng bạn có thể có thai
- nếu bạn đẻ sinh có thai
- nếu bạn có lỗ thoát vị bị cắt 1 phần ruột
- nếu bạn bị bít túi mật để não về gan (ngoại trừ bệnh xơ gan mật và các vấn đề về gan do xơ nang ở trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi)
- nếu bạn bị dị ứng với ursodeoxycholic acid (UDCA) hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc.

Trẻ em bị hẹp đường dẫn mật (ở mật), đã phẫu thuật (nối mật-ruột) để điều trị nhưng không thành công hoặc không hồi phục tốt, không dùng Prohepatis.

- trong quá trình điều trị xơ gan mật nguyên phát: đau nghiêm trọng vùng bụng trên bên phải, bệnh gan trở nên tệ hơn - sẽ cải thiện một phần sau khi ngừng điều trị
- vôi hóa sỏi mật
- phát ban ngứa đỏ (mề đay).

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Hãy nói với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ thuốc nào sau đây, kể cả các thuốc không kê đơn:

- colestyramine, colestipol (thuốc hạ cholesterol trong máu), than hoạt hoặc thuốc kháng acid chứa nhôm (giảm chứng khó tiêu). Nếu phải uống thuốc chứa bất kỳ thành phần nào trong số các thành phần này, nên uống cách ít nhất 2 giờ trước hoặc sau khi uống Prohepatis
- ciclosporin (một chất ức chế miễn dịch)
- ciprofloxacin hoặc dapson (kháng sinh)
- rosuvastatin hoặc clofibrate (dùng để hạ cholesterol)
- thuốc tránh thai đường uống hoặc bất kỳ loại nội tiết tố (hormoon) nữ nào, chẳng hạn như estrogen hoặc liệu pháp hormoon thay thế (HRT). Bệnh nhân nữ dùng Prohepatis để làm tan sỏi mật chỉ nên sử dụng các biện pháp tránh thai không chứa nội tiết tố như màng ngăn, vì các thuốc tránh thai chứa nội tiết tố có thể kích thích tạo sỏi mật.

Có thể vẫn an toàn khi dùng Prohepatis, bác sĩ hoặc dược sĩ sẽ cho bạn lời khuyên.

Hãy nói với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn đang dùng hoặc gần đây đã dùng bất kỳ thuốc nào khác, kể cả các thuốc không kê đơn.

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Uống liều đã quên ngay khi nhớ. Nếu gần đến giờ uống liều kế tiếp, bỏ qua liều quên và uống thuốc theo liều khuyến cáo kế tiếp. Không uống liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Trong hộp kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều

Thuốc có thể gây tiêu chảy khi quá liều.

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?

Nếu bạn uống quá nhiều thuốc, liên hệ phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất hoặc bác sĩ ngay lập tức. Mang theo tờ thông tin này và bất kỳ viên thuốc nào còn lại để đưa cho bác sĩ.

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này

Nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ của bạn trước khi dùng Prohepatis.

Prohepatis phải được dùng dưới sự giám sát y khoa. Bác sĩ sẽ kiểm tra chức năng gan của bạn đều đặn mỗi bốn tuần trong ba tháng đầu điều trị. Sau đó, việc theo dõi thực hiện mỗi 3 tháng một lần.

Thông báo ngay cho bác sĩ nếu bạn bị tiêu chảy, vì có thể phải yêu cầu giảm liều hoặc ngừng điều trị với Prohepatis.

Nếu bạn đang điều trị sỏi mật, bác sĩ sẽ theo dõi tiến trình hòa tan sỏi mật.

Nếu bạn đang điều trị xơ gan mật nguyên phát, trong một số ít trường hợp, các triệu chứng của bạn có thể tệ hơn khi bắt đầu điều trị, như ngứa có thể tăng lên. Nếu điều này xảy ra, thông báo ngay cho bác sĩ vì có thể bạn phải giảm liều Prohepatis.

Nên tránh chế độ ăn uống giàu calo và cholesterol khi bạn đang dùng Prohepatis.

Thông tin về tá dược:

Thuốc này chứa tá dược màu sunset yellow PCF có thể gây các phản ứng dị ứng.

Thuốc này chứa dầu đậu nành. Nếu bạn dị ứng với đậu phộng hay đậu nành, không dùng thuốc này.

Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Prohepatis không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Thời kỳ mang thai:

Chưa có bằng chứng đầy đủ về an toàn của thuốc trong thời kỳ mang thai, không nên dùng Prohepatis nếu bạn mang thai, nghĩ rằng bạn có thai hoặc dự định có thai.

Sử dụng một biện pháp tránh thai đáng tin cậy trong suốt quá trình điều trị với Prohepatis. Bệnh nhân nữ dùng Prohepatis để làm tan sỏi mật chỉ cần sử dụng các biện pháp tránh thai không chứa nội tiết tố như màng ngăn, vì các