https://nhathuocngocanh.com/

VD-25054-16/154

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 15/7/2016

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)
S.G.C.N: 4630430002216-Đ.T.N.NG
TX. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

Remos IB_ Nhãn hộp
17/9/2015

https://nhathuocngocanh.com/

Remos IB_Nhãn Tuýp
14/9/2015

MENTHOLATUM
Remos IB
Sản phẩm từ ngứa, viêm da và vết côn trùng cắn

GEL TRỊ NGỨA, VIÊM DA VÀ VẾT CÔN TRÙNG CẮN

MENTHOLATUM

Khối lượng tịnh: 10 g

Chỉ định: Ngứa, vết côn trùng cắn, chàm, viêm da do tiếp xúc, viêm da dị ứng, mề đay, nổi ban, sưng tấy, mẩn đỏ.

Thành phần hoạt chất (trong 10 g): Prednisolone Valerate Acetate 15 mg, Crotamiton 500 mg, Allantoin 20 mg, l-Menthol 350 mg, Isopropyl Methylphenol 10 mg.

- **ĐỂ THUỐC NGOÀI TẦM TAY CỦA TRẺ EM.**
- **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

SĐK:

Hướng dẫn sử dụng: Thoa đều một lượng gel vừa đủ lên vùng da cần trị liệu vài lần trong ngày.

Bảo quản: Nơi khô mát (dưới 30 °C), tránh ánh nắng trực tiếp.

Số lô SX, NSX, HSD: Xem trên đáy tuýp.

ROHTO

Sản xuất bởi: **CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)**
Số 14 VSIP, đường số 5, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Xã An Tân, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại liên lạc: 08-38225522

Thị ấn chính: ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) ★ S.G.C.N: 4630430002 16-Đ.T.N.NG ★ TX. THUẬN AN-T.BÌNH DƯƠNG

https://nhathuocngocanh.com/

S.G.C.N:463043000216-Đ.T.N.NG
CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)
TX. THUẬN AN-T. BÌNH DƯƠNG

Remos IB - Tờ Hướng Dẫn Sử Dụng
17/9/2015

XIN ĐỌC KỸ ĐƠN NÀY TRƯỚC KHI DÙNG, GIỮ ĐƠN ĐỂ TRA CỨU KHI CẦN

THUỐC DÙNG NGOÀI

MENTHOLATUM
Remos IB
Sản phẩm trị ngứa, viêm da và vết côn trùng cắn

MENTHOLATUM

TRỊ NGỨA, VIÊM DA VÀ VẾT CÔN TRÙNG CẮN

THÀNH PHẦN (TRONG 10 g)

Hoạt chất:

Prednisolone Valerate Acetate	15 mg
Crotamiton	500 mg
Allantoin	20 mg
I-Menthol	350 mg
Isopropyl Methylphenol	10 mg

Tá dược: Anhydrous Ethanol, Isostearyl Alcohol, Methylparaben, Butylparaben, Dibutylhydroxytoluene, 1,3-Butylene Glycol, Propylene Glycol, Disodium Edetate, Carboxyvinylpolymer, Hydroxyethylcellulose, Triethanolamine, Cooling Agent 10, nước tinh khiết.

Hoạt chất	Tác dụng	
Prednisolone Valerate Acetate	• Kháng viêm, chống dị ứng	Khắc phục tình trạng ngứa, sưng đỏ, viêm da.
Crotamiton	• Chống ngứa	
I-Menthol	• Chống ngứa	
Isopropyl Methylphenol	• Kháng khuẩn	Ngừa nhiễm trùng.
Allantoin	• Kích thích sự phát triển tế bào, tái tạo mô da	Mau chóng phục hồi da như ban đầu.

DẠNG BÀO CHẾ

Gel thoa da.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 Tuýp 10 g.

CHỈ ĐỊNH

Ngứa, vết côn trùng cắn, chàm, viêm da do tiếp xúc, viêm da dị ứng, mề đay, nổi ban, sưng tấy, mẩn đỏ.


VẾT NGỨA

VIÊM DA

VẾT CÔN TRÙNG CẮN

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Thoa Remos IB một lượng vừa đủ lên vùng da cần trị liệu, vài lần trong ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng thuốc trong trường hợp tổn thương da do nhiễm virus (Herpes simplex, thủy đậu), vi nấm (Candida), vi khuẩn (chốc lở, ung nhọt) hoặc tiền căn mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

https://nhathuocngocanh.com/

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

1. Hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi dùng trong các trường hợp sau:

- Đang theo một quá trình điều trị.
- Gia đình hay bản thân có tiền căn dị ứng.
- Điều trị trên vùng da rộng.
- Chàm nặng.
- Sử dụng liên tục trong thời gian dài.

2. Trước khi dùng thuốc, chú ý:

- Trẻ em hay nhũ nhi dùng thuốc theo sự hướng dẫn của người lớn.
- Chỉ dùng ngoài da. Không thoa lên vùng mắt, niêm mạc, vết thương hở.
- Nếu sản phẩm dây vào mắt hay vùng niêm mạc, nhanh chóng rửa sạch bằng nước hay nước ấm.

3. Trong và sau khi dùng thuốc, chú ý:

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trong các trường hợp sau:

- Trên vùng da bình thường: phát ban, đỏ da, ngứa.
- Trên vùng da trị liệu: nhiễm nấm Trichophyton (nấm kẽ chân, chốc lở), mụn, nổi mủ, ngứa dai dẳng.
- Tình trạng không cải thiện sau 5-6 ngày dùng thuốc.

4. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ khi đang trong tình trạng mang thai hoặc cho con bú.

5. Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

- Không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC KHÁC

Không sử dụng các chế phẩm ngoài da khác trên cùng một vùng cần trị liệu. Hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi sử dụng các chế phẩm khác trong cùng thời gian trị liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Thuốc có thể gây ngứa, phát ban, đỏ da. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Khi dùng quá liều có thể gây ngứa, phát ban, đỏ da. Nếu xảy ra, ngưng dùng thuốc và xin hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ.

BẢO QUẢN

- Vặn chặt nắp sau khi dùng.
- Bảo quản nơi khô mát (dưới 30 ^{o}C), tránh ánh nắng trực tiếp.
- Không chuyển sản phẩm sang vật chứa khác (điều này có thể gây ra việc sử dụng sai và giảm chất lượng sản phẩm).

HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TCCL: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản xuất bởi: **CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)**
Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại liên lạc: 08-38229322

Trụ sở chính: ROHTO PHARMACEUTICAL CO. LTD
OSAKA, JAPAN

ROHTO
www.rohto.com.vn

602