https://nhathuocngocanh.com/

PHIL INTER PHARMA
PHIL INTER PHARMA
No. 25 VSIP Street 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam
Tel: 84-650-3767040, Fax: 84-650-3767039
E-mail: philpharm@vnn.vn

MẪU NHÃN HỘP

Sản phẩm : Viên nang mềm **SEOUL CIGENOL**
Kích thước hộp : 115 x 40 x 115 mm
Tỷ lệ : 70%
Nội dung : như mẫu

SEOUL CIGENOL®

WHO GMP

SEOUL CIGENOL®

12 blisters x 5 soft capsules

COMPOSITIONS: Each soft capsule contains
Cardiaus marianus extract 200mg
(e.g. to 60mg of Silybin 140mg of Silymarin)
Thiamine Nitrate 8mg
Riboflavin 8mg
Pyridoxine HCl 8mg
Nicotinamide 24mg
Calcium Pantothenate 16mg

INDICATIONS:
Auxiliary treatment to followings: chronic liver disease, fatty liver, hepatocirrhosis and toxic liver disease

ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS:
See insert paper

STORAGE:
Tight container, dry and cool place, below 30°C

PACKAGE:
5 Soft capsules/blister, 12 blisters/box

Keep out of reach of children
Read insert paper carefully before using

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

WHO GMP

SEOUL CIGENOL®

12 vỉ x 5 viên nang mềm

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa
Cao Cardiaus marianus 200mg
(tương đương Silybin 60mg, Silymarin 140mg)
Thiamin Nitrat 8mg
Riboflavin 8mg
Pyridoxin Hydrochlorid 8mg
Nicotinamid 24mg
Calci Pantothenat 16mg

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị hỗ trợ trong các bệnh sau: bệnh gan mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan, bệnh nhiễm độc gan

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

BẢO QUẢN: Trong hộp gói kín, nơi khô mát dưới 30°C

ĐÓNG GÓI: 5 viên nang mềm/vỉ, 12 vỉ/hộp

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

PHIL INTER PHARMA
Sản xuất tại CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đường số 8, VSIP, Thuận An, Bình Dương

TP. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
LÊ THANH HIẾU

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA
S.G.P: 4630230000233-Đ.T.N.NG
H. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

https://nhathuocngocanh.com/

PHIL INTER PHARMA

PHIL INTER PHARMA

No. 25, Street No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong
Tel: 0650. 3767 040~ 044 Fax: 0650. 3767 039

MẪU NHÃN VỈ

Sản phẩm	:Viên nang mềm SEOULCIGENOL
Kích thước	:38 x 100 mm
Tỷ lệ	:100%
Nội dung	:như mẫu.

Số lô, HSD sẽ được dập nổi trên vỉ

GENERAL DIRECTOR

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

SOON OH HONG

https://nhathuocngocanh.com/

PHIL INTER PHARMA
PHIL INTER PHARMA
No. 25 VSIP Street 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam
Tel: 84-650-3767040; Fax: 84-650-3767039
E-mail: philpharm@vnn.vn

MẪU NHÃN TOA THUỐC

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
Tránh xa tầm tay trẻ em.

Viên nang mềm SEOULCIGENOL

SĐK:....

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:
Hoạt chất:

Cao carduus marianus.....200mg
(tương đương 60mg Silybin, 140mg silymarin)
Thiamin nitrat.....8mg
Pyridoxin HCl 8mg
Riboflavin.....8mg
Nicotinamid.....24mg
Ca pantothenat.....16mg

Tá dược:
Dầu đậu nành, Lecithin, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin đậm đặc, D-Sorbitol, Methyl paraben, Propyl paraben, Ethyl vanilin, Titan dioxyd, Màu vàng số 4, Màu vàng số 5, Màu đỏ số 40, Màu xanh số 1, Nước tinh khiết.

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị hỗ trợ trong các bệnh sau: bệnh gan mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan, bệnh nhiễm độc gan.

LIỀU DÙNG & CÁCH SỬ DỤNG:
Liều thông thường ở người lớn là mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.
Liều có thể được điều chỉnh tùy theo tuổi bệnh nhân và mức độ trầm trọng của các triệu chứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG
- Dùng thuốc theo đúng liều lượng đã được chỉ dẫn.
- Trẻ em dùng thuốc phải có sự theo dõi của bố mẹ.
- Nếu xảy ra các phản ứng dị ứng, phải ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.
- Nếu các triệu chứng không được cải thiện dù đã dùng thuốc được một tháng, phải ngưng dùng và tham khảo ý kiến của bác sỹ hoặc dược sỹ.
- Thuốc này có chứa phẩm màu vàng số 4 (tartrazin). Nếu có tiền sử nhạy cảm với thành phần này, phải hỏi ý kiến của bác sỹ hoặc dược sỹ trước khi dùng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Do độ an toàn của thuốc khi sử dụng cho phụ nữ có thai chưa được xác định nên chỉ sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai khi đã cân nhắc lợi ích của việc điều trị so với nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi.

TÁC DỤNG PHỤ
- Chưa có báo cáo

**** Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.***

TƯƠNG TÁC THUỐC
Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30^{0}C.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
**** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng***
ĐÓNG GÓI: Hộp chứa 12 vỉ x 5 viên nang mềm.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở.

Sản xuất tại
Công ty TNHH PHIL INTER PHARMA
Số 25, Đường số 8, VSIP, Thuận An, Bình Dương.

Read dosage and administration carefully before using.
For any more information, please consult your doctor or pharmacist.
Keep out of reach of children.

SEOULCIGENOL Soft Capsule

Visa No:...

COMPOSITION: Each soft capsule contains:
Active ingredients

Carduus marianus extract..... 200mg
(As 60mg Silybin, 140mg silymarin)
Thiamine nitrate..... 8mg
Pyridoxine HCl..... 8mg
Riboflavin..... 8mg
Nicotinamide 24mg
Calcium pantothenate 16mg

Inactive ingredients
Soybean oil, Lecithin oil, Palm oil, White wax, Gelatin, C-Glycerin, D-sorbitol solution, Methyl-p-hydroxy benzoate, Propyl-p-hydroxy benzoate, Ethyl vanilin, Titanium dioxide, Yellow No. 4, Yellow No. 5, Blue No.1, Red No.40, Purified water.

INDICATIONS
Auxiliary treatment to followings: chronic liver disease, fatty liver, hepatocirrhosis, and toxic liver disease.

DOSAGE AND ADMINISTRATION
Usually, for adults, one capsule is orally administered 3 times a day.
The dose may be adjusted according to the patient's age and severity of symptoms.

CONTRAINDICATIONS
Patients with hypersensitivity to any component of this medicine.

PRECAUTION
- Should be followed dosage & administration.
- In case of children, administer this drug under the supervision of a patron.
- If hypersensitivity occurs, medication should be discontinued promptly and consult with physician or pharmacist.
- Should stop administration and consult physician or pharmacist when there is no improvement in spite of medication for about 1 month.
- This medicine contains dye yellow # 4 (tartrazine). If you have the history of hypersensitivity to this ingredient, you should consult a doctor or a pharmacist before taking medicine.

PREGNANCY AND LACTATION
Since the safety of this medicine during pregnancy has not been yet established, this medicine should be administered when the potential therapeutic benefits justify the possible risks.

SIDE EFFECTS
None reported.
**** Inform your doctor in case of any adverse reactions related to drug use.***

INTERACTIONS
None reports.

STORAGE: Tight container, dry and cool place, below 30^{0}C.
SHELF LIFE: 36 months from the manufacturing date.
**** Do not use if the drug is out of date***
PACKAGE: Box contains 12 blisters x 5 soft capsules.
SPECIFICATION: Home standard.

Manufactured by
PHIL INTER PHARMA Co., LTD.
No. 25, Street No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong.

GENERAL DIRECTOR
CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA
SOON OH HONG