

MẪU NHÃN VỈ

Sản phẩm : Viên nang mềm SILYVERCELL
Kích thước : 38 x 100 mm
Tỷ lệ : 100%
Nội dung : như mẫu.

100 mm



38 mm

Số lô, HSD sẽ được dập nổi trên vỉ



PHIL PHIL INTER PHARMA

No. 25, No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong
INTER PHARMA Tel: 0650. 3767 040~044 Fax: 0650. 3767 039

MẪU NHÃN HỘP

Sản phẩm : Viên nang mềm **SILYVERCELL 100 viên**

Kích thước hộp : 108 x 202 x 46 mm

Tỷ lệ : 70%

Nội dung : như mẫu



SILYVERCELL®

SILYVERCELL®

SILYVERCELL®

WHO-GMP

20 blisters x 5 soft capsules

Composition: Each soft capsule contains:
Carduus marianus extract 200mg
(e.g. to 60mg of Silybin, 140mg of Silymarin)

Indications, administration, contraindications:
See insert paper

Storage:
Preserve in light-resistant and cool place

Package:
20 blisters x 5 soft capsules /box

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USING



20 vỉ x 5 viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:
Cao Carduus marianus 200mg
(tương đương 60mg Silybin, Silymarin 140mg).

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng

Dùng gói: 20 vỉ x 5 viên nang mềm/hộp

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất tại
PHIL CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đường 25 B, Khu công nghiệp
INTER PHARMA, Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương

SDK: S.G.P. SX
NSX: HP

SILYVERCELL®

SILYVERCELL®

Handwritten signature



**MẪU NHÃN TOA THUỐC
 VIÊN NANG MỀM SILYVERCELL**

Kích thước : 135x 155mm
Tỷ lệ : 1/1
Nội dung :

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
 Để xa tầm tay trẻ em.
 Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.*

Viên nang mềm SILYVERCELL
 SĐK:.....

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất:

Cao Carduus marianus200mg
 (trương đương 60mg Silybin, 140mg Silymarin)

CHỈ ĐỊNH

Dùng thuốc cho những bệnh nhân bị suy chức năng gan, viêm gan cấp tính hoặc mạn tính, xơ gan hoặc dùng để bảo vệ tế bào gan sau khi dùng các thuốc gây độc cho gan.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

-Liều thông thường ở người lớn: 1 viên x 2 hay 3 lần/ngày.

-Liều có thể được điều chỉnh tùy theo độ tuổi và triệu chứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho bệnh nhân vàng da tắc mật và xơ gan ứ mật tiên phát.

THẬN TRỌNG

- Dùng thuốc theo đúng liều lượng đã được chỉ dẫn.

- Chưa có báo cáo về độc tính của thuốc đối với bà mẹ và thai nhi sau khi dùng SILYVERCELL.

- Chưa có báo cáo về độc tính đối với trẻ em.

- Phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ

SILYVERCELL an toàn và dung nạp tốt. Chưa có tác dụng phụ nghiêm trọng nào xảy ra khi dùng SILYVERCELL. Một vài bệnh nhân bị nhức đầu và tiêu chảy khi dùng SILYVERCELL trong vài ngày đầu.

** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*

BAO QUẢN: Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*

ĐÓNG GÓI: hộp chứa 20 vỉ x 5 viên nang.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở.

Sản xuất tại

Công ty TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,
 Thuận An, Bình Dương.

*Read dosage and administration carefully before using.
 Keep out of reach of children.*

For any more information, please consult your doctor or pharmacist.

SILYVERCELL Soft Cap.
 Visa No.:.....

COMPOSITION: Each soft capsule contains:

Active ingredient:

Carduus marianus ext200mg
 (60mg as Silybin, 140mg Silymarin)

INDICATIONS

The drug is used for patients with liver deficiency, acute or chronic liver diseases, cirrhosis or to protect liver cells after using drugs which are toxic for liver.

DOSAGE & ADMINISTRATION

Normal dose in adults: 1 capsules- 2 or 3 times/day. The dose can be adjusted in accordance with age and symptoms.

CONTRA-INDICATION

Do not use for patients with obstructive jaundice and primary biliary cirrhosis.

PRECAUTIONS

Should be followed dosage & administration.

Toxicity to mothers and foetus has not been reported following the use of SILYVERCELL.

- No toxicity to children has been reported.

- Pregnancy and lactation.

SIDE EFFECTS

SILYVERCELL is safe and well tolerated. No serious side effects have occurred with the use of SILYVERCELL. Some patients have reported headache and diarrhoea with the use of SILYVERCELL during the first few days.

** Inform your doctor in case of any adverse reactions related to drug use.*

STORAGE: Tight container, dry and cool place, below 30°C.

SHELF-LIFE: 36 months from manufacturing date.

** Do not use if the drug is out of date.*

PACKAGE: Box contains 20 blisters x 5 soft capsules.

SPECIFICATION: Home standard.

Manufactured by

PHIL INTER PHARMA CO., LTD.

No. 25, street No. 8, Viet Nam – Singapore industrial park,
 Thuận An, Binh Duong.

