

Hộp siro Cam Tùng Lộc 120 ml

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/09/2017



Cách dùng, liều dùng:
Ngày uống 2 đến 3 lần.

Trẻ em:
Dưới 1 tuổi: mỗi lần 5 ml - 10 ml (1-2 thìa cà phê).
Từ 1 - 2 tuổi: mỗi lần 10 ml - 15 ml (2-3 thìa cà phê).
Từ 2 - 6 tuổi: mỗi lần 15 ml - 20 ml (3-4 thìa cà phê).
Trên 6 tuổi: mỗi lần 20 ml - 25 ml (4-5 thìa cà phê).

Người lớn: mỗi lần 30ml (2 thìa canh).

Mỗi đợt dùng từ 3 đến 4 tuần.
Uống trước bữa ăn, có thể uống nguyên chất, hòa vào nước hay trộn với thức ăn hoặc với sữa.

Bảo quản:
Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:**

Lắc kỹ trước khi dùng.

THÀNH PHẦN
(120 ml Siro chứa các dịch chiết từ các dược liệu tương ứng)

Cát lăm sâm	Radix Ginseng	6,00 g
Đảng sâm	Radix Codonopsis pilosulae	12,0 g
Bạch linh	Poria	8,40 g
Bạch truật	Rhizoma Alabacystidis macrocephalae	7,20 g
Cam thảo	Radix Glycyrrhizae	5,40 g
Ý dĩ	Semen Coicis	6,00 g
Hoài sơn	Tuber Dioscoreae perstensis	6,60 g
Khiêm thực	Semen Eurythos	3,60 g
Liên nhục	Semen Nelumbinis	14,4 g
Mạch nha	Fructus Hordei geminalis	6,00 g
Sử quân tử	Semen Carisopalis	4,80 g
Sơn tra	Fructus Mali	6,00 g
Thần khúc	Massa medicata fermentata	2,40 g
Cốc tinh thảo	Flos Ericocauli	1,44 g
Ô tặc cốt	Os Sepiae	2,04 g
Bạch biển đậu	Semen Lablab	3,72 g

Tà dược: (Đường kính, Nipagin) và nước tinh khiết v.v

Công năng:
Bổ tỳ vị, tăng cường tiêu hoá, phòng ngừa còi xương, suy dinh dưỡng.

Chỉ định:
Phòng và điều trị còi xương, suy dinh dưỡng, mồ hôi trộm, rối loạn tiêu hóa, kém ăn, kém ngủ, giun kim, giun đũa...

Chống chỉ định:
Xem đơn hướng dẫn sử dụng.

Mã vạch

NHÀ SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
ĐC: XÃ TRUNG TRẮC - HUYỆN VĂN LÂM - TỈNH HƯNG YÊN
ĐT: 0321.3980593 - 043.8513566
Website: tungloc.com.vn

NHÀ SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
ĐC: XÃ TRUNG TRẮC - HUYỆN VĂN LÂM - TỈNH HƯNG YÊN
ĐT: 0321.3980593 - 043.8513566
Website: tungloc.com.vn



Hộp siro Cam Tùng lộc 180 ml



THÀNH PHẦN
(180 ml Siro chứa các dịch chiết được từ các dược liệu tương ứng)

Cát lâm sâm	Radix Ginseng	9,00 g
Đảng sâm	Radix Codonopsis pilosulae	18,0 g
Bạch linh	Poria	12,6 g
Bạch truật	Fructus Atractylodes macrocephalae	10,8 g
Cam thảo	Radix Glycyrrhizae	8,10 g
Ỗ đi	Semen Coicis	9,00 g
Hoài sơn	Tuber Dioscoreae persimilis	9,90 g
Khiên thực	Semen Euryales	5,40 g
Liên nhục	Semen Nelumbinis	21,6 g
Mạch nha	Fructus Hordei germinatus	9,00 g
Sử quân tử	Semen Oenotherae	7,20 g
Sơn tra	Fructus Malae	9,00 g
Thần khúc	Massa medicata fermentata	3,60 g
Cốc tinh thảo	Flos Erigeroni	2,16 g
Ô tặc cốt	Os Saprae	3,06 g
Bạch biển đậu	Semen Lablab	5,58 g

Tà dược: (Đường kính, Nipagin) và nước tinh khiết v.đ 120 ml

Công năng:
Bổ tỳ vị, tăng cường tiêu hoá, phòng ngừa còi xương, suy dinh dưỡng.

Chỉ định:
Phòng và điều trị còi xương, suy dinh dưỡng, mồ hôi trộm, rối loạn tiêu hóa, kém ăn, kém ngủ, giun kim, giun đũa...

Chống chỉ định:
Xem đơn hướng dẫn sử dụng.

Mã vạch

SIRO CAM 180ml
TÙNG LỘC

NHÀ SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
ĐC: XÃ TRUNG TRẮC - HUYỆN VĂN LÂM - TỈNH HUNG YÊN
ĐT: 0321.3980593 - 043.8513566
Website: tungloc.com.vn

Cách dùng, liều dùng:
Ngày uống 2 đến 3 lần.

Trẻ em:
Dưới 1 tuổi: mỗi lần 5 ml - 10 ml (1-2 thìa cà phê).
Từ 1 - 2 tuổi: mỗi lần 10 ml - 15 ml (2-3 thìa cà phê).
Từ 2 - 6 tuổi: mỗi lần 15 ml - 20 ml (3-4 thìa cà phê).
Trên 6 tuổi: mỗi lần 20 ml - 25 ml (4-5 thìa cà phê).

Người lớn: mỗi lần 30ml (2 thìa canh).

Mỗi đợt dùng từ 3 đến 4 tuần.
Uống trước bữa ăn, có thể uống nguyên chất, hòa vào nước hay trộn với thức ăn hoặc với sữa.

Bảo quản:
Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS
SĐK:

Lắc kỹ trước khi dùng.

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SIRO CAM 180ml
TÙNG LỘC

NHÀ SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
ĐC: XÃ TRUNG TRẮC - HUYỆN VĂN LÂM - TỈNH HUNG YÊN
ĐT: 0321.3980593 - 043.8513566
Website: tungloc.com.vn



Nhãn trên lọ 120 ml

Công năng:
Bổ tỳ vị, tăng cường tiêu hoá, phòng ngừa còi xương, suy dinh dưỡng.

Chỉ định:
Phòng và điều trị còi xương, suy dinh dưỡng, mồ hôi trộm, rối loạn tiêu hóa, kém ăn, kém ngủ, giun kim, giun đũa...

Chống chỉ định:
Xem đơn hướng dẫn sử dụng

Lắc kỹ trước khi dùng.

BÊ XÁ TÂM TÂY TRÈ EM
ĐƯỢC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Mã vạch



SIRO CAM 120ml
TÙNG LỘC

Cách dùng, liều dùng: Ngày uống 2 đến 3 lần.

Trẻ em:
Dưới 1 tuổi: mỗi lần 5 ml - 10 ml(1-2 thìa cà phê).
Từ 1 - 2 tuổi: mỗi lần 10 ml - 15 ml(2-3 thìa cà phê).
Từ 2 - 6 tuổi: mỗi lần 15 ml - 20 ml(3-4 thìa cà phê).
Trên 6 tuổi: mỗi lần 20 ml - 25 ml(4-5 thìa cà phê).
Người lớn: mỗi lần 30ml(2 thìa canh).

Mỗi đợt dùng từ 3 đến 4 tuần.

Uống trước bữa ăn, có thể uống nguyên chất, hòa vào nước hay trộn với thức ăn hoặc với sữa.

Bảo quản:
Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
NHÀ SẢN XUẤT
ĐC: XÃ TRẢNG BÀC - HUYỆN VĂN LÂM - TỈNH HƯNG YÊN
ĐT: 0321.390893 - 030.8513566 - Website: tungloc.com.vn





Nhãn trên lọ 180 ml

Công năng:
Bổ tỳ vị, tăng cường tiêu hoá, phòng ngừa còi xương, suy dinh dưỡng.


Chỉ định:
Phòng và điều trị còi xương, suy dinh dưỡng, mồ hôi trộm, rối loạn tiêu hóa, kém ăn, kém ngủ, giun kim, giun đũa...

Chống chỉ định:
Xem đơn hướng dẫn sử dụng

Lắc kỹ trước khi dùng.

BÊ XÁ TÂM TÂY TRÈ EM
ĐƯỢC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Mã vạch



SIRO CAM 180ml
TÙNG LỘC

Cách dùng, liều dùng: Ngày uống 2 đến 3 lần.

Trẻ em:
Dưới 1 tuổi: mỗi lần 5 ml - 10 ml(1-2 thìa cà phê).
Từ 1 - 2 tuổi: mỗi lần 10 ml - 15 ml(2-3 thìa cà phê).
Từ 2 - 6 tuổi: mỗi lần 15 ml - 20 ml(3-4 thìa cà phê).
Trên 6 tuổi: mỗi lần 20 ml - 25 ml(4-5 thìa cà phê).
Người lớn: mỗi lần 30ml(2 thìa canh).


Mỗi đợt dùng từ 3 đến 4 tuần.

Uống trước bữa ăn, có thể uống nguyên chất, hòa vào nước hay trộn với thức ăn hoặc với sữa.

Bảo quản:
Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
NHÀ SẢN XUẤT
ĐC: XÃ TRẢNG BÀC - HUYỆN VĂN LÂM - TỈNH HƯNG YÊN
ĐT: 0321.390893 - 030.8513566 - Website: tungloc.com.vn





ĐÔNG Y TÙNG LỘC

SIRO CAM TÙNG LỘC

THÀNH PHẦN

(120 ml Siro chứa các dịch chiết được từ các dược liệu tương ứng)

Cát lâm sâm	<i>Radix Ginseng</i>	6,00 g
Đảng sâm	<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>	12,0 g
Bạch linh	<i>Poria</i>	8,40 g
Bạch truật	<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>	7,20 g
Cam thảo	<i>Radix Glycyrrhizae</i>	5,40 g
Ý dĩ	<i>Semen Coicis</i>	6,00 g
Hoài sơn	<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>	6,60 g
Khiếm thực	<i>Semen Euryales</i>	3,60 g
Liên nhục	<i>Semen Nelumbinis</i>	14,4 g
Mạch nha	<i>Fructus Hordei germinatus</i>	6,00 g
Sử quân tử	<i>Semen Quisqualis</i>	4,80 g
Sơn tra	<i>Fructus Mali</i>	6,00 g
Thần khúc	<i>Massa medicata fermentata</i>	2,40 g
Cốc tinh thảo	<i>Flos Eriocaui</i>	1,44 g
Ô tặc cốt	<i>Os Sepiae</i>	2,04 g
Bạch biển đậu	<i>Semen Lablab</i>	3,72 g

Tả dược: (Đường kính, Nipagin) và nước tinh khiết vớ 120ml.

Công năng:

Bổ tỳ vị, tăng cường tiêu hoá, phòng ngừa còi xương, suy dinh dưỡng.

Chi định:

Phòng và điều trị còi xương, suy dinh dưỡng, mồ hôi trộm, rối loạn tiêu hóa, kém ăn, kém ngủ, giun kim, giun đũa...

Cách dùng, liều dùng:

Ngày uống 2 đến 3 lần.
Trẻ em: Dưới 1 tuổi: mỗi lần 5 ml - 10 ml(1-2 thìa cà phê).
Từ 1 - 2 tuổi: mỗi lần 10 ml - 15 ml(2-3 thìa cà phê).
Từ 2 - 6 tuổi: mỗi lần 15 ml - 20 ml(3-4 thìa cà phê).
Trên 6 tuổi: mỗi lần 20 ml - 25 ml(4-5 thìa cà phê).

Người lớn: mỗi lần 30ml(2 thìa canh).

Mỗi đợt dùng từ 3 đến 4 tuần.

Uống trước bữa ăn, có thể uống nguyên chất, hòa tan vào nước, trộn với thức ăn, hoặc sữa.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- Người tiểu đường.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Sử dụng thuốc cho người vận hành máy móc tàu xe: Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người đang vận hành máy móc tàu xe.

Tác dụng không mong muốn: chưa có thông tin.

*Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng: Hiện tại chưa có thông tin.

Quá liều và xử trí: Không dùng thuốc quá liều. Khi quá liều phải theo dõi và thông báo cho thầy thuốc các phản ứng bất lợi của thuốc.

Tương tác thuốc: Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Quy cách: Hộp 1 lọ 120ml và hộp 1 lọ 180 ml siro.

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc”

NHÀ SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II

ĐC: NGỌC LỊCH - TRUNG TRẮC - VĂN LÂM - HUNG YÊN

ĐT: 0321.3980.593 - 04.3851.3566

Website: tungloc.com.vn



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng**

Handwritten signature