



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Hỗn dịch uống SUTRA

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

Mô tả sản phẩm: Hỗn dịch uống.

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói 15 g chứa:

Sucralfat.....1 g

Tá dược: Sorbitol lỏng, bột hương dâu, xanthan gum, methyl paraben, propyl paraben, natri dihydrogen phosphat, natri saccharin, nước tinh khiết, ethanol 96%.

Thuốc dùng cho bệnh gì?

- Điều trị triệu chứng loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày mạn tính, loét lành tính.
- Phòng tái phát loét tá tràng, phòng loét do stress.
- Điều trị triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Sucralfat được uống với 1 ít nước, không nên dùng cùng thức ăn. Phải uống vào lúc đói (ít nhất 1 giờ trước khi ăn, hoặc 2 giờ sau khi ăn).

Điều trị triệu chứng loét tá tràng:

2 gói/lần, mỗi ngày uống 2 lần vào buổi sáng và trước khi đi ngủ.

Thời gian điều trị kéo dài từ 4 - 8 tuần. Cũng cần phải tiến hành điều trị để loại trừ vi khuẩn *Helicobacter pylori*, tham khảo ý kiến bác sĩ.

Điều trị triệu chứng loét dạ dày lành tính:

Người lớn: 1 gói / lần; ngày uống 4 lần.

Điều trị tiếp tục đến khi vết loét lành hẳn (kiểm tra bằng nội soi). Thường cần phải điều trị 6 - 8 tuần.

Người bệnh cũng cần được điều trị để loại trừ vi khuẩn *Helicobacter pylori* tối thiểu bằng metronidazol và amoxicilin, phối hợp với sucralfat và với một thuốc chống tiết acid như thuốc ức chế H₂, histamin hay ức chế bơm proton.

Phòng tái phát loét tá tràng:

1 gói/lần, ngày uống 2 lần. Điều trị không được kéo dài quá 6 tháng.

Loét tá tràng tái phát là do vi khuẩn *Helicobacter pylori*; để loại trừ *Helicobacter pylori*, cần cho một đợt điều trị mới bằng sucralfat phối hợp với kháng sinh.

Điều trị triệu chứng trào ngược dạ dày - thực quản:

1 gói/lần, ngày uống 4 lần, một giờ trước mỗi bữa ăn và khi đi ngủ.

Khi nào không nên dùng thuốc này?

Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn:

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là táo bón, ít gặp rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đầy bụng, khó tiêu, đầy hơi, khô miệng), ngứa ban đỏ, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, buồn ngủ. Hiếm khi bị phản ứng quá mẫn (mây đay, phù Quincke, khó thở, viêm mũi, co thắt thanh quản, mặt phù to), dị vật dạ dày.

Thông báo cho thầy thuốc các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Nên tránh dùng những thuốc hay thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Có thể dùng các antacid cùng với sucralfat trong điều trị loét tá tràng để giảm nhẹ chứng đau. Nhưng không được uống cùng một lúc vì antacid có thể ảnh hưởng đến sự gắn của sucralfat trên niêm mạc. Nên uống antacid trước hoặc sau khi uống sucralfat một nửa giờ.

Các thuốc cimetidin, ranitidin, ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, digoxin, warfarin, phenytoin, theophylin, tetracyclin khi uống cùng với sucralfat sẽ bị giảm hấp thu. Vì vậy phải uống những thuốc này 2 giờ trước hoặc sau khi uống sucralfat.

Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa có báo cáo quá liều

Những điều thận trọng khi dùng thuốc này:

Dùng thận trọng ở người suy thận do nguy cơ tăng nồng độ nhôm trong huyết thanh; nhất là khi dùng dài ngày. Trường hợp suy thận nặng, nên tránh dùng.

- *Phụ nữ có thai:* Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc.

- *Phụ nữ cho con bú:* Chưa biết sucralfat có bài tiết vào sữa hay không. Nếu có bài tiết vào sữa mẹ, lượng sucralfat cũng sẽ rất ít, vì thuốc được hấp thu vào cơ thể rất ít.

Tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc, tuy nhiên trong một số rất ít trường hợp, thuốc có thể gây nhức đầu, chóng mặt.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

ĐÓNG GÓI: Hộp 20 gói x 15 g hỗn dịch uống.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

PHẦN 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói 15 g chứa:

Sucralfat1 g

Tá dược: Sorbitol lỏng, bột hương dâu, xanthan gum, methyl paraben, propyl paraben, natri dihydrogen phosphat, natri saccharin, nước tinh khiết, ethanol 96%.