


MẪU NHÃN

31/151


1. Nhãn lọ 42 viên



2. Nhãn hộp 1 lọ x 42 viên

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 09/9/2015



Ngày SX:
Lô SX:
HD:

M.S.D.N : 0400


CY

3. Nhãn vỉ 21 viên



Số lô SX, Hạn dùng:
In chìm trên vỉ

4. Nhãn hộp 2 vỉ




5. Nhãn hộp 3 vỉ



6. NHÃN LỌ 1000 VIÊN

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa
- Cao khô alkaloid Trinh nữ hoàng cung 80 mg
Tương ứng 2000mg lá Trinh Nữ Hoàng Cung
- Cao khô hỗn hợp 320 mg
Tương ứng với:
Trí mẫu 666 mg
Hoàng bá 666 mg
Ích mẫu 666 mg
Đào nhân 83 mg
Trạch tât 830 mg
Xích thược 500 mg
- Nhục quế 8,3 mg
- Tá dược vừa đủ 1 viên
Bảo quản: Đỗ nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C



Chi định: Phì đại lành tính tuyến tiền liệt & U xơ tử cung.

Liều dùng, cách dùng:

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên, uống sau bữa ăn. Uống liên tục trong 2 tháng.

Chống chỉ định:

- Bí tiêu hoàn toàn do các nguyên nhân khác.

- Phụ nữ có thai và đang cho con bú.

ĐÈ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SĐK :

Ngày SX :

Số lô SX :

HD :

Sản xuất tại : Nhà máy GMP_WHO
KCN. Hòa Khánh, Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

CTY. CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
253 Dung Sĩ Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Đà Nẵng ngày 21 tháng 01 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Quang Tri, MBA



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

VIÊN NÉN BAO PHIM

TADIMAX

THÀNH PHẦN: Cho mỗi viên nén bao phim

Cao khô alkaloid Trinh nữ hoàng cung.....	80 mg
Tương ứng với 2000 mg lá Trinh nữ hoàng cung (Folium Crini latifolii)	
Cao khô hỗn hợp.....	320 mg
Tương ứng với:	
Tri mẫu (Rhizoma Anemarrhenae).....666mg	
+ Hoàng bá (Cortex Phellodendri).....666mg	
+ Ích mẫu (Herba Leonuri japonicae).....666mg	
+ Đào nhân (Semen Pruni).....83mg	
+ Trạch tả (Rhizoma Alismatis).....830mg	
+ Xích thược (Radix Paeoniae).....500mg	
Nhục quế (Cortex Cinnamomi).....	8,3 mg
Tá dược (Eragel, Lactose monohydrat, Povidon K30, Sodium starch glycollat, Aerosil, Magnesi stearat, HPMC 606, HPMC 615, Talc, Titan dioxide, PEG 6000, Màu đen oxyt sắt, Màu đỏ oxyt sắt) vừa đủ.....	1 viên

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC: Không có thông tin.

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt và u xơ tử cung.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG

- Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.
- Uống sau bữa ăn. Uống liên tục trong 2 tháng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bí tiểu hoàn toàn do các nguyên nhân khác.
- Phụ nữ có thai và đang cho con bú.

THẬN TRỌNG

- Uống thuốc sau bữa ăn.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

- Thuốc có thể gây những tác dụng phụ nhẹ và thoáng qua như rối loạn tiêu hoá, mẩn ngứa, chóng mặt. Các tác dụng này thường hết sau 3-5 ngày dùng thuốc, không có trường hợp nào nặng phải ngừng dùng thuốc. Thuốc không ảnh hưởng đến mạch và huyết áp.
- Thuốc không làm thay đổi chỉ số PSA, không ảnh hưởng đến huyết học và chức năng gan, thận.

* *Thông báo ngay cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc.*

KHUYẾN CÁO

- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc khi có nghi ngờ về chất lượng thuốc.
- **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Muốn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ**



TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN

- Hộp 2 vỉ x 21 viên; hộp 1 lọ x 42 viên, hộp 3 vỉ x 21 viên, lọ nhựa 1000 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Bảo quản nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

ĐỀ THUỐC XA TẦM TAY TRẺ EM.

- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Khu Công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Tel : 0511.3760130

Fax : 0511.3760127

Email : info@danapha.com

Điện thoại tư vấn: 0511.3760131

Và được phân phối trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Quang Tri, MBA



TUẤT CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

