

218/Đ/143

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÈ DUYỆT

Lần đầu 27/11/2013

MẪU ĐĂNG KÝ VĨ THUỐC TELANHIS

NL



TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Văn Nên

MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC TELANHIS



MẪU ĐĂNG KÝ TOA THUỐC TELANHIS

<p>Tiêu chuẩn: TCCS TELANHIS</p> <p>THÀNH PHẦN: Fexofenadin HCl 60 mg Tá dược: Laclose, tinh bột mì, polyvinyl pyrrolidon, croscarmellose sodium, magnesi stearat, HPMC 606, HPMC 615, PEG 6000, talc, titan dioxyd, brown HT, ponceau 4 R vừa đủ 1 viên.</p> <p>DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén dài bao phim.</p> <p>ĐƯỢC LỰC HỌC: Fexofenadin là chất chuyển hóa của Terfenadin, một chất kháng histamin có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể H₁, ngoại biên. Fexofenadin ức chế sự co phế quản do kháng nguyên và ức chế sự tiết histamin.</p> <p>ĐƯỢC ĐỘNG HỌC: Fexofenadin được hấp thu nhanh qua đường uống, đạt nồng độ tối đa trong huyết tương sau 2,6 giờ, 60-70% fexofenadin gắn vào protein huyết tương. Nửa đời thải trừ của fexofenadin khoảng 14 giờ, kéo dài hơn ở người suy thận. Fexofenadin được thải trừ qua phân.</p> <p>CHỈ ĐỊNH: Điều trị các triệu chứng viêm mũi dị ứng như: Hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa mũi, ngứa mắt, ngứa vòm miệng và họng.</p> <p>LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: -Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần uống 1 viên, ngày 2 lần. -Người suy thận: Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi bị suy thận hay phải thẩm phân máu uống 1 viên, ngày 1 lần.</p> <p>CHỐNG CHỈ ĐỊNH: -Mẫn cảm với fexofenadin hay bất cứ thành phần nào của thuốc. -Trẻ em dưới 12 tuổi.</p> <p>THẬN TRỌNG: -Thận trọng khi dùng fexofenadin cho người đã có nguy cơ tim mạch hoặc đã có khoảng Q-T kéo dài từ trước. -Thận trọng và điều chỉnh liều thích hợp khi dùng thuốc cho người có chức năng thận suy giảm và người cao tuổi. -Người bệnh không nên tự dùng thêm thuốc kháng histamin nào khác khi đang sử dụng fexofenadin. -Độ an toàn và hiệu quả của thuốc ở trẻ em dưới 6 tuổi chưa được xác định. -Cần ngừng fexofenadin ít nhất 24 - 48 giờ trước khi tiến hành các thử nghiệm kháng nguyên tiềm trong da.</p> <p>TRƯỜNG HỢP PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không nên dùng fexofenadin cho phụ nữ có thai hay cho con bú trừ khi lợi ích điều trị vượt trội những nguy cơ có thể gặp đối với thai nhi hay trẻ đang bú mẹ.</p>	<p>TRƯỜNG HỢP LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Fexofenadin ít có ảnh hưởng trên khả năng lái xe và sử dụng máy móc. Tuy nhiên, nên kiểm tra phản ứng cá nhân để phát hiện những người mẫn cảm.</p> <p>TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Trong các nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát, tỉ lệ gặp tác dụng không mong muốn ở nhóm người bệnh dùng fexofenadin tương tự như nhóm dùng placebo. Các tác dụng không mong muốn của thuốc không bị ảnh hưởng bởi liều dùng, tuổi, giới và chủng tộc của bệnh nhân.</p> <p>Thường gặp, ADR > 1/100: -Thần kinh: Buồn ngủ, mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ, chóng mặt. -Tiêu hóa: Buồn nôn, khó tiêu. -Khác: Nhiễm virus (cảm, cúm), đau bụng kinh, nhiễm khuẩn hô hấp trên, nhുộng h.ly, ho, sốt, viêm tai giữa, viêm xoang, đau lưng.</p> <p>Lý giải, 1/1000 < ADR < 1/100: -Thần kinh: Sợ hãi, rối loạn giấc ngủ, ác mộng. -Tiêu hóa: Khó miệng, đau bụng. Hiếm gặp, ADR < 1/1000: -Da: Ban, mày đay, ngứa. -Phản ứng quá mẫn: Phù mạch, tức ngực, khó thở, đỏ bừng, chuốt phổi.</p> <p>Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc</p> <p>TƯƠNG TÁC THUỐC: -Phối hợp fexofenadin HCl với erythromycin hoặc ketoconazol làm tăng nồng độ fexofenadin trong huyết tương gấp 2-3 lần. Tuy nhiên, sự gia tăng này không đưa đến ảnh hưởng trên khoảng QT. -Thuốc kháng acid chứa gel aluminium hay magnesium làm giảm độ sinh khả dụng của fexofenadin HCl. -Nước ép trái cây, nước ép bưởi có thể làm giảm sinh khả dụng của fexofenadin, do đó nên tránh sử dụng đồng thời.</p> <p>QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Dùng những biện pháp cơ bản để loại bỏ phần thuốc chưa được hấp thu: Uống viên thuốc chưa than hoát hay rửa dạ dày. Cũng cần điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.</p> <p>HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.</p> <p>BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.</p> <p>QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim.</p> <p>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.</p> <p>NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẨY THUỐC.</p>
---	---



CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
Số 045 Quốc lộ 50 Phủ An, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thành

TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Nguyễn Văn Nên

