

**CÔNG THỨC:**

Fexofenadin HCl ..... 180 mg  
 Tá dược vừa đủ ..... 1 viên  
 (Tinh bột biến tính, microcrystalline cellulose M101,  
 croscarmellose sodium, magnesi stearat, HPMC 606, HPMC  
 615, PEG 6000, titan dioxyd, talc, oxyd sắt đỏ, màu cam  
 E110).

**DẠNG BAO CHẾ:** Viên nén bao phim.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 2 vỉ x 10 viên.

**ĐƯỢC DỤNG HỌC:** Telfor với thành phần hoạt chất là fexofenadin là thuốc đối kháng histamin chọn lọc trên thụ thể H1 ngoại vi, dùng để điều trị dị ứng. Ở liều điều trị, thuốc không gây buồn ngủ hay ảnh hưởng đến thần kinh trung ương. Thuốc có tác dụng nhanh và kéo dài do thuốc gắn chặt vào thụ thể H1, tạo thành phức hợp bền vững và tách ra chậm.

**ĐƯỢC DỤNG HỌC:** Fexofenadin được hấp thu nhanh sau khi uống, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau khi uống 2 - 3 giờ. Thức ăn làm giảm nồng độ đỉnh trong huyết tương khoảng 17%. Khoảng 60 - 70% fexofenadin gắn với protein huyết tương, chủ yếu gắn với albumin và alpha1-acid glycoprotein. Thời gian bán thải trung bình của fexofenadin khoảng 14,4 giờ. Khoảng 11% liều fexofenadin uống được thải qua nước tiểu dưới dạng không đổi và 80% được thải qua phân.

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng của bệnh mày đay mạn tính không rõ nguyên nhân ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**THẬN TRỌNG:** Thận trọng theo dõi khi dùng fexofenadin cho người đã có nguy cơ tim mạch hoặc có khoảng QT kéo dài từ trước. Không dùng thêm thuốc kháng histamin nào khác khi đang dùng fexofenadin.

Cần thận trọng và điều chỉnh liều thích hợp khi dùng cho người có chức năng thận suy giảm và cho người cao tuổi (trên 65 tuổi) thường có suy giảm sinh lý chức năng thận. Cần ngừng fexofenadin ít nhất 24 - 48 giờ trước khi tiến hành các thử nghiệm kháng nguyên tiềm trong da. Độ an toàn của fexofenadin 180mg ở trẻ em dưới 12 tuổi chưa được nghiên cứu.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Chưa có nghiên cứu đầy đủ trên người mang thai nên chỉ dùng fexofenadin cho phụ nữ mang thai khi lợi ích của người mẹ vượt trội nguy cơ đối với thai nhi.

Chưa rõ thuốc có bài tiết qua sữa mẹ hay không, nên cần thận trọng khi dùng fexofenadin cho phụ nữ đang cho con bú.

# Telfor 180

Fexofenadin HCl 180 mg

**LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MỘC:**

Tuy fexofenadin ít gây buồn ngủ nhưng vẫn thận trọng khi lái xe hoặc điều khiển máy móc.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Erythromycin hoặc ketoconazol làm tăng nồng độ fexofenadin trong huyết tương do làm tăng hấp thu và giảm thải trừ thuốc này. Tuy nhiên, tương tác không có ý nghĩa trên lâm sàng.

Thuốc kháng acid có chứa gel nhôm hydroxyd và magnesi hydroxyd làm giảm sinh khả dụng của fexofenadin, do gắn kết thuốc ở đường tiêu hóa. Nên uống các thuốc này cách nhau ít nhất 2 giờ.

Nước ép trái cây làm giảm sự hấp thu của fexofenadin, do đó làm giảm hiệu quả của thuốc.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Thường gặp: Thần kinh: buồn ngủ, mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ, chóng mặt. Tiêu hóa: buồn nôn, khó tiêu. Khác: nhiễm virus (cảm, cúm), đau bụng kinh, nhiễm khuẩn hô hấp trên, ngứa họng, ho, sổ mũi, viêm tai giữa, viêm xoang, đau lưng.

Ít gặp: Thần kinh: sợ hãi, rối loạn giấc ngủ, ác mộng. Tiêu hóa: khô miệng, đau bụng.

Hiếm gặp: Da: ban, ngứa. Phản ứng quá mẫn: phù mạch, tức ngực, khó thở, đỏ bừng, choáng phản vệ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRỊ:** Thông tin về độc tính cấp của fexofenadin còn hạn chế. Tuy nhiên, buồn ngủ, chóng mặt, khô miệng đã được báo cáo. Xử trí: sử dụng các biện pháp thông thường để loại bỏ phần thuốc còn chưa được hấp thu ở ổ bụng tiêu hóa. Điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng. Thẩm phân máu làm giảm nồng độ thuốc trong máu không đáng kể (1,7%). Không có thuốc giải độc đặc hiệu.

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 1 viên x 1 lần / ngày. Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Điều kiện bảo quản:**

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh nắng.

**Tiêu chuẩn:** TCCS.

Ghi xuất xứ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀU GIANG** - Chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang  
 Lô B2 - B3, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang  
 ĐT: (0290) 3963454 • Fax: (0290) 3963355

Địa chỉ: Số 10A, KDC Phước Bình, Phường 1, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  
 Điện thoại: 09232 3893000

E-mail: [dhgpharma@mail.dhgpharma.com.vn](mailto:dhgpharma@mail.dhgpharma.com.vn)  
[www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn)

[02]