

Tờ hướng dẫn sử dụng

## A. THÔNG TIN DÀNH CHO BỆNH NHÂN

Thuốc mỡ tra mắt

# TETRACYCLIN 1%

Thuốc bán theo đơn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Để xa tầm tay trẻ em.

**Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gấp phải khi sử dụng thuốc.**

**Thành phần:** Mỗi tuýp 5 gam thuốc mỡ có chứa

Tetracyclin hydrochlorid ..... 50 mg

Tá dược: Vaselin, Lanolin, Parafin rắn vừa đủ 5 gam.

**Mô tả sản phẩm:** Chế phẩm là dạng thuốc mỡ màu vàng

Được đóng trong tuýp nhôm

**Quy cách đóng gói:** Tuýp 5g. Hộp 1 tuýp; Hộp 100 tuýp kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

### Thuốc dùng cho bệnh gì:

Nhiễm khuẩn mắt do *Chlamydia*: bệnh đau mắt hột.

Trong các nhiễm khuẩn mắt khác: chỉ nên dùng tetracycline khi đã chứng minh được vi khuẩn gây bệnh còn nhạy cảm.

Do mức độ kháng thuốc của vi khuẩn nghiêm trọng và hiện nay có nhiều loại thuốc kháng khuẩn khác nên hạn chế việc sử dụng tetracycline trong điều trị.

### Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng:

Tra một lượng nhỏ thuốc mỡ vào mắt bị bệnh, 2-3 lần/ngày, tránh tiếp xúc với bụi sau khi tra thuốc.

Thời gian điều trị cho bệnh đau mắt hột từ 20 ngày đến 2 tháng.

### Khi nào không nên dùng thuốc này:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 8 tuổi, do việc sử dụng các thuốc nhóm tetracycline trong quá trình phát triển của răng (nửa cuối thai kì và trẻ em dưới 8 tuổi) có thể gây biến màu răng vĩnh viễn (vàng, xám, nâu) và thuốc có thể gắn vào và ảnh hưởng tới sự phát triển của xương.

### Tác dụng không mong muốn:

Một số tác dụng không mong muốn có thể xảy ra khi sử dụng thuốc mỡ tra mắt tetracycline:

- Chảy nước mắt, cảm giác xót và nhòe mắt nhất thời,
- Tetracycline có thể gây phát triển quá mức các vi sinh vật không nhạy cảm, kể cả nấm, dẫn đến xảy ra bội nhiễm.
- Răng trẻ kèm phát triển và biến màu khi sử dụng tetracycline cho phụ nữ mang thai và trẻ dưới 8 tuổi.
- Phản ứng dị ứng da, mày đay, phù Quincke, tăng nhạy cảm với ánh sáng khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

### Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gấp phải khi sử dụng thuốc

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này:

Do thuốc dùng dưới dạng tra mắt nên sự tương tác giữa thuốc với các thuốc khác ít xảy ra.

Nếu sử dụng đồng thời với các thuốc khác nên dùng cách khoảng 30-60 phút.

### Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc:

Không cần dùng bù những lần quên sử dụng thuốc với liều gấp đôi cho những lần dùng tiếp theo. Nên sử dụng thuốc trở lại sớm nhất nếu có thể và theo đúng liều lượng khuyến cáo.

### Cần bảo quản thuốc này như thế nào:

Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

### Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Do thuốc dùng ở dạng tra mắt, nên hiếm khi xảy ra hiện tượng quá liều. Đôi khi có thể xảy ra hiện tượng phù nề, kích ứng mắt hoặc phản ứng dị ứng

### Cần làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Nếu có bất kỳ biểu hiện nào bất thường xảy ra khi sử dụng thuốc quá liều khuyến cáo, cần ngưng sử dụng thuốc và phải báo ngay cho bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. Cần phải giữ lại tờ hướng dẫn sử dụng này, mẫu hộp hoặc tuýp thuốc nếu có thể.

Các triệu chứng quá liều bao gồm: phù nề, kích ứng mắt hoặc phản ứng dị ứng.

### Những điều thận trọng khi dùng thuốc này:

- Trước khi dùng tetracycline, phải cho bác sĩ hoặc dược sỹ biết nếu bạn bị dị ứng với tetracycline; hoặc nếu có bất kỳ một dị ứng nào khác. Sản phẩm này có chứa các thành phần không có hoạt tính, có thể gây dị ứng.

- Một số trường hợp dùng tetracycline thấy có phản ứng nhạy cảm với ánh sáng biểu hiện bằng bong bóng nắng khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Người bệnh dùng tetracycline nếu phải tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hay tia tử ngoại cần được cảnh báo về nguy cơ này và cần ngừng thuốc ngay khi có những triệu chứng đầu tiên của ban đỏ.

- Trước khi sử dụng thuốc mỡ tra mắt tetracycline 1%, phải cho bác sĩ hoặc dược sỹ biết về tiền sử bệnh của bạn, đặc biệt là: các vấn đề về mắt khác (như nhiễm trùng mắt trước đó), sử dụng kính áp tròng.

- Khi sử dụng tránh để dầu tuýp thuốc cọ sát vào mắt.

- Đậy kín nắp sau khi dùng, tránh làm nhiễm bẩn đầu tuýp thuốc.

\* **Thời kỳ mang thai:** Trong thời kỳ mang thai, thuốc chỉ nên dùng khi thật cần thiết. Bác sĩ cần cẩn nhắc khi lợi ích điều trị vượt trội rủi ro có thể xảy ra cho thai nhi.

### \* Thời kỳ cho con bú:

Chưa được biết thuốc có đi vào sữa mẹ khi dùng dưới dạng thuốc mỡ tra mắt. Do đó, cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.

### \* Người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, làm công việc trên cao và các trường hợp khác:

Thuốc mỡ có thể gây nhòe mắt sau khi sử dụng, do đó nên đợi đến khi hết nhòe mắt mới lái xe hoặc vận hành máy móc, làm công việc trên cao và các trường hợp khác.

### Khi nào cần tham vấn bác sĩ và dược sỹ:

Khi gặp những tác dụng không mong muốn xảy ra cần phải tham vấn bác sĩ, dược sỹ.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sỹ.

### Hạn dùng:

48 tháng kể từ ngày sản xuất. Số lô sản xuất, hạn dùng được ghi trên hộp giấy.

Không sử dụng thuốc quá 30 ngày kể từ khi mở nắp sử dụng lần đầu.

### Nhà sản xuất:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế,

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tel: 0234.3823099, 3822704 \* Fax: 0234.3826077