

PHUC HUNG
P/H

THÀNH PHẦN (cho 125ml cao lỏng):
 Ma hoàng 10g
 Bán hạ 15g
 Ngũ vị tử 10g
 Tỳ bà diệp 10g
 Cam thảo 10g
 Tế tân 3g
 Can khương 10g
 Hạnh nhân 10g
 Bối mẫu 10g
 Trần bì 10g
 Tá dược vđ 125ml

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
 bên trong hộp.
 Để xa tầm tay trẻ em.
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THUỐC HEN
P/H

PHUC HUNG

CAO LỎNG 125ml

SDK:

CHỈ ĐỊNH:
 Điều trị các thể hen phế quản có
 biểu hiện ho, khó thở, tức ngực,
 đờm nhiều. Phòng chống cơn hen
 tái phát.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn
 sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

THUỐC HEN
P/H

THÀNH PHẦN: (cho 125ml cao lỏng):
 Ma hoàng 10g
 Bán hạ 15g
 Ngũ vị tử 10g
 Tỳ bà diệp 10g
 Cam thảo 10g
 Tế tân 3g
 Can khương 10g
 Hạnh nhân 10g
 Bối mẫu 10g
 Trần bì 10g
 Tá dược vđ 125ml

CHỈ ĐỊNH:
 Điều trị các thể hen phế quản có
 biểu hiện ho, khó thở, tức ngực,
 đờm nhiều. Phòng chống cơn hen
 tái phát.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SDK:

Số lô SX

Ngày SX:

HD :

CAO LỎNG 125ml

THUỐC HEN
P/H



PHUC HUNG

THUỐC HEN
P/H

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
 Liều dùng: Ngày uống 2-3 lần,
 sau bữa ăn:
 Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10-15 ml.
 Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 15-20 ml.
 Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn,
 mỗi lần 25-30 ml.
 Bệnh nặng có thể dùng gấp rưỡi liều trên
 Đợt điều trị 8-10 tuần.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn
 sử dụng thuốc bên trong hộp.

Để xa tầm tay trẻ em.
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước
 khi dùng.

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
 Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung,
 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa,
 huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
 ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

CAO LỎNG 125ml
THUỐC HEN
P/H



PHUC HUNG

BỘ Y TẾ
 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÀ PHƯƠNG DUYỆT
 Lần đầu: 15/11/2016



382/0152

PHUC HUNG

P/H



THÀNH PHẦN (cho 250ml cao lỏng):

Ma hoàng.....	20g
Bán hạ.....	30g
Ngũ vị tử.....	20g
Tỳ bà diệp.....	20g
Cam thảo.....	20g
Tê tân.....	6g
Can khương.....	20g
Hạnh nhân.....	20g
Bối mẫu.....	20g
Trần bì.....	20g
Tã dược.....	vđ 250ml

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THUỐC HEN

P/H



CAO LỎNG 250ml

SDK:

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, đờm nhiều. Phòng chống cơn hen tái phát.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HUNG

THUỐC HEN

P/H

THÀNH PHẦN (cho 250ml cao lỏng):

Ma hoàng.....	20g
Bán hạ.....	30g
Ngũ vị tử.....	20g
Tỳ bà diệp.....	20g
Cam thảo.....	20g
Tê tân.....	6g
Can khương.....	20g
Hạnh nhân.....	20g
Bối mẫu.....	20g
Trần bì.....	20g
Tã dược.....	vđ 250ml

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, đờm nhiều. Phòng chống cơn hen tái phát.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

CAO LỎNG 250ml

THUỐC HEN

P/H



THUỐC HEN

P/H

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Liều dùng: Ngày uống 2-3 lần, sau bữa ăn:

Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10-15 ml.

Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 15-20 ml.

Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25-30 ml.

Bệnh nặng có thể dùng gấp rưỡi liều trên Đợt điều trị 8-10 tuần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Để xa tầm tay trẻ em.


Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HUNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024


CAO LỎNG 250ml

THUỐC HEN

P/H



TÒ HƯƠNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC THUỐC HEN P/H



Thành phần:

Thành phần	Cho 1 lọ X 125ml	Cho 1 lọ X 250ml
Ma hoàng (<i>Herba Ephedrae</i>)	10g	20g
Bán hạ (<i>Rhizoma Typhonii trilobati</i>)	15g	30g
Ngũ vị tử (<i>Fructus Schisandrae</i>)	10g	20g
Tỳ bà diệp (<i>Folium Eriobotryae</i>)	10g	20g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	10g	20g
Tế tân (<i>Herba Asari</i>)	3g	6g
Cần quỳ (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	10g	20g
Hành nhân (<i>Semen Armaniaceae amarum</i>)	10g	20g
Bối mẫu (<i>Bulbus Fritillariae</i>)	10g	20g
Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae</i>)	10g	20g
Ta dược (Natri benzoat, đường kính, nước tinh khiết)	vđ 125ml	vđ 250ml

Dạng bao chế: Cao lỏng.

Quy cách đóng gói: Thuốc được đóng trong lọ nhựa. Hộp 1 lọ X 125ml, hộp 1 lọ X 250ml.

Chỉ định: Điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện ho, khó thở, tức ngực, đờm nhiều. Phòng chống cơn hen tái phát.

Cách dùng & liều dùng:

- Liều dùng: Ngày uống 2 - 3 lần, sau bữa ăn.
- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10 - 15ml.
- Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20ml.
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30ml.
- Bệnh nặng có thể dùng gấp rưỡi liều trên.
- Dợt điều trị 8 - 10 tuần.
- Sau khi kết thúc đợt điều trị, cơn hen nhẹ, thưa dần. Bệnh nhân cần điều trị thêm 3 - 4 đợt nữa, mỗi đợt cách nhau 1 tuần để phòng tránh cơn hen tái phát.
- Khi lên cơn hen, ngoài việc dùng Thuốc hen P/H, có thể phối hợp với các phương pháp chữa của y học hiện đại để làm hết cơn.

Tác dụng phụ: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử đông kinh hoặc co giật do sốt cao. Người cao huyết áp, tư thần

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường; phụ nữ có thai và cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú để đảm bảo an toàn cho thai nhi và cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian dùng thuốc, không nên uống rượu, bia hay ăn các đồ ăn cay, nóng như ớt, hạt tiêu, các thực phẩm dễ gây dị ứng như tôm, cua

Quả liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tương hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thuốc bị mốc, biến màu hoặc thấy có hiện tượng lạ thì phải báo cho nhà sản xuất. Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc:

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

TRƯỞNG PHÒNG

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Cai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Cai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024

PHÒNG