

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 22/11/2016... 2017

THÀNH PHẦN: (cho 1 lọ x 90ml)
Mỗi lọ chứa 90ml cao lỏng (1:1) tương đương với 63g dược liệu được bào chế từ:

Cao đặc dược liệu (10:1).....	4,8g
Ma hoàng	6g
Hạnh nhân	8g
Thạch cao	20g
Cát cánh	8g
Cam thảo	6g
Cao đặc Bách bộ (8:1)	2g

(tương đương với 15g dược liệu)
Tà dược vđ 90ml

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Thuốc ho Ma hạnh P/H
TRỊ HO, HEN SUYỄN
Cao lỏng
Lọ 90ml

CHỈ ĐỊNH: Mát phổi, tiêu đờm - Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày, có đờm đặc, rát cổ, viêm họng, viêm phế quản, hen suyễn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG



Thuốc ho Ma hạnh P/H

Hộp 1 lọ x 90ml

THÀNH PHẦN: (cho 1 lọ x 90ml)
Mỗi lọ chứa 90ml cao lỏng (1:1) tương đương với 63g dược liệu được bào chế từ:

Cao đặc dược liệu (10:1).....	4,8g
Ma hoàng	6g
Hạnh nhân	8g
Thạch cao	20g
Cát cánh	8g
Cam thảo	6g
Cao đặc Bách bộ (8:1)	2g

(tương đương với 15g dược liệu)
Tà dược vđ 90ml

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Hộp 1 lọ x 90ml

Thuốc ho Ma hạnh P/H
TRỊ HO, HEN SUYỄN
Cao lỏng

CHỈ ĐỊNH: Mát phổi, tiêu đờm - Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày, có đờm đặc, rát cổ, viêm họng, viêm phế quản, hen suyễn.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:
Ngày uống 2 - 3 lần, uống sau bữa ăn
- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10 - 15ml.
- Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20ml.
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30ml.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

Hộp 1 lọ x 90ml

Thuốc ho Ma hạnh P/H
TRỊ HO, HEN SUYỄN
Cao lỏng

PHÚC HƯNG



557
793
1/158

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

THUỐC HO MA HẠNH P/H

Thành phần: (cho 1 lọ x 90ml)

Mỗi lọ chứa 90ml cao lỏng (1:1) tương đương với 63g dược liệu được bào chế từ:

Cao đặc dược liệu (10:1) (*Extractum*) : 4,8g

tương đương với:

Ma hoàng (*Herba Ephedrae*) : 6g

Hạnh nhân (*Semen Armeniacae amarum*) : 8g

Thạch cao (*Gypsum fibrosum*) : 20g

Cát cánh (*Radix Platycodi grandiflori*) : 8g

Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) : 6g

Cao đặc Bách bộ (8:1) (*Extractum radices stemonae tuberosae*) : 2g

(tương đương với 15g dược liệu)
Tá dược (natri benzoat, đường kính, nước tinh khiết) : vừa đủ 90ml



Dạng bào chế: Cao lỏng.

Quy cách đóng gói: Thuốc được đóng trong lọ nhựa. Hộp 1 lọ x 90ml.

Chỉ định:

Mát phổi, tiêu đờm. Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày, có đờm đặc, rất cổ, viêm họng, viêm phế quản, hen suyễn.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 2 - 3 lần, uống sau bữa ăn:

- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10 - 15ml.
- Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20ml.
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30ml.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Người cao huyết áp, tự hãn.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian dùng thuốc không nên uống rượu, bia hay ăn các đồ ăn cay, nóng như ớt, hạt tiêu, các thực phẩm dễ gây dị ứng như tôm, cua....

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thuốc bị mốc, biến màu hoặc thấy có hiện tượng lạ thì phải báo cho nhà sản xuất. Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024

