

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 01/4/2013

169 / 17139

**MẪU HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM METHORPHAN - Hộp 1 vỉ x 10 viên**



1 vỉ x 10 viên nén bao phim

**TRAPHACO**

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**

- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng

**CÔNG THỨC:**  
 Dextromethorphan hydrobromid... 15 mg  
 Chlorpheniramin maleat... 4 mg  
 Guaiphenesin... 100 mg  
 Tá dược... vừa đủ... 1 viên

**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**  
 Xem toa hướng dẫn sử dụng  
**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

1 vỉ x 10 viên nén bao phim

**TRAPHACO**

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**

- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811542  
 Tư vấn khách hàng: 18006612  
 Sản xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

ĐỂ XA TÂM TAY TRẒ EM.  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

KT hộp: 105mm x 45mm x 16mm



KT vỉ: 100mm x 41mm. Số lô SX và HD được dập nổi trên vỉ.

*Handwritten signature*

# MẪU HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM THUỐC HO METHORPHAN - Hộp 2 vỉ x 10 viên



2 vỉ x 10 viên nén bao phim

**TRUỐC HO**  
**METHORPHAN**



**Traphaco**

- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG.

**CÔNG THỨC:** Dextromethorphan hydrobromid... 15 mg  
Chlorpheniramin maleat.....4 mg  
Guaiphenesin.....100 mg  
Tá dược.....vừa đủ..... 1 viên

**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**  
*Xem toa hướng dẫn sử dụng*

SĐK:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

2 vỉ x 10 viên nén bao phim

**TRUỐC HO**  
**METHORPHAN**



**Traphaco**

- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng



**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811642  
Tư vấn khách hàng: 18006412  
Sân xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

KT hộp: 105mm x 45mm x 22mm



KT vỉ : 100mm x 41mm. Số lô SX và HD được dập nổi trên vỉ.

# MẪU HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM THUỐC HO METHORPHAN - Hộp 5 vỉ x 10 viên



5 vỉ x 10 viên nén bao phim

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**



- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng



**Traphaco**

**CÔNG THỨC:** Dextromethorphan hydrobromid.... 15 mg  
Chlorpheniramin maleat..... 4 mg  
Guaiphenesin..... 100 mg  
Tá dược.....vừa đủ.....1 viên

**CHỈ ĐỊNH:**  
- Ho khan, ho do dị ứng, ho do cảm cúm.  
- Ho có đờm trong viêm phổi, viêm phế quản, ho do hút thuốc lá quá nhiều.

**LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:**  
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lần x 3-4 lần /ngày.

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
TRƯỚC KHI DÙNG.

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**

SBK:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

5 vỉ x 10 viên nén bao phim

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**



- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng



**Traphaco**

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811542  
Tư vấn khách hàng: 18006612  
Sân xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

KT hộp : 105mm x 45mm x 42mm



KT vỉ : 100mm x 41mm. Số lô SX và HD được dập nổi trên vỉ.

# MẪU HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM THUỐC HO METHORPHAN - Hộp 10 vỉ x 10 viên



10 vỉ x 10 viên nén bao phim

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**

- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng

**Traphaco**




**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**

**CÔNG THỨC:** Dextromethorphan hydrobromid.... 15 mg  
Chlorpheniramin maleat.....4 mg  
Guaiphenesin.....100 mg  
Tá dược.....vừa đủ.....1 viên

**CHỈ ĐỊNH:**  
- Ho khan, ho do dị ứng, ho do cảm cúm.  
- Ho có đờm trong viêm phổi, viêm phế quản, ho do hút thuốc lá quá nhiều

**LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:**  
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lần x 3-4 lần /ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Xem toa hướng dẫn sử dụng.

SBK:  
Số lô SX:  
NSK:  
HD:

10 vỉ x 10 viên nén bao phim

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**

- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng

**Traphaco**




**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811542  
Tư vấn khách hàng: 18006612  
Sản xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội



KT vỉ : 100mm x 41mm.  
Số lô SX và HD được dập nổi trên vỉ.


Khộp: 115mm x 64mm x 46mm

# MẪU HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM THUỐC HO METHORPHAN - Hộp 1 vỉ x 4 viên




1 vỉ x 4 viên nén bao phim

## THUỐC HO METHORPHAN



- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng



**Traphaco**

---

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

---

**THUỐC HO  
METHORPHAN**

**CÔNG THỨC:** Dextromethorphan hydrobromid.... 15 mg  
Chlorpheniramin maleat.....4 mg  
Guaiphenesin.....100 mg  
Tá dược.....vừa đủ.....1 viên

**CHỈ ĐỊNH:**  
- Ho khan, ho do dị ứng, ho do cảm cúm.  
- Ho có đờm trong viêm phổi, viêm phế quản, ho do hút thuốc lá quá nhiều.

**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**  
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lần x 3-4 lần /ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Xem toa hướng dẫn sử dụng.

**SĐK:**  
**SỐ 16 SX:**  
**NSX:**  
**HD:**

---

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

KT hộp: 100mm x 80mm x 10mm

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội | Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811542  
Tư vấn khách hàng: 18006612  
Số 1 xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Mai - Hà Nội

# MẪU HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM THUỐC HO METHORPHAN - Hộp 5 vỉ x 4 viên



5 vỉ x 4 viên nén bao phim

## THUỐC HO METHORPHAN



- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng



### Traphaco

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội | Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811542  
 Tư vấn khách hàng: 18006612  
 Sản xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

**CÔNG THỨC:** Dextromethorphan hydrobromid.... 15 mg  
 Chlorpheniramin maleat.....4 mg  
 Guaiphenesin.....100 mg  
 Tá dược.....vừa đủ.....1 viên

**CHỈ ĐỊNH:**

- Ho khan, ho do dị ứng, ho do cảm cúm.
- Ho có đờm trong viêm phổi, viêm phế quản, ho do hút thuốc lá quá nhiều.

5 vỉ x 4 viên nén bao phim

## THUỐC HO METHORPHAN



- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng



### Traphaco

SDK:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

**LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:**

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lần x 3-4 lần /ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Xem toa hướng dẫn sử dụng.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM  
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

KT hộp: 100mm x 80mm x 35mm

# MẪU HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM THUỐC HO METHORPHAN - Hộp 10 vỉ x 4 viên



10 vỉ x 4 viên nén bao phim

## THUỐC HO METHORPHAN



- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng



**Traphaco**

10 vỉ x 4 viên nén bao phim

# METHORPHAN

**CÔNG THỨC:** Dextromethorphan hydrobromid.... 15 mg  
Chlorpheniramin maleat.....4 mg  
Gualphenesin.....100 mg  
Tá dược.....vừa đủ.....1 viên

**CHỈ ĐỊNH:**

- Ho khan, ho do dị ứng, ho do cảm cúm.
- Ho có đờm trong viêm phổi, viêm phế quản, ho do hút thuốc lá quá nhiều.

**LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:**

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lần x 3-4 lần /ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Xem toa hướng dẫn sử dụng.

10 vỉ x 4 viên nén bao phim

## THUỐC HO METHORPHAN



- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng



**Traphaco**

10 vỉ x 4 viên nén bao phim

# METHORPHAN

SDK:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C,  
tránh ánh sáng.

**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811542

Tư vấn khách hàng: 18006612

Sản xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

KT hộp: 100mm x 80mm x 50mm

MẪU HỘP VIÊN NÉN BAO PHIM THUỐC HO METHORPHAN - Hộp 25 vỉ x 4 viên



25 vỉ x 4 viên nén bao phim

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**




- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng




**Traphaco**

25 vỉ x 4 viên nén bao phim

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**



- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng



**Traphaco**

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**

**CÔNG THỨC:** Dexamethorphan hydrobromid..... 15 mg  
Chlorpheniramin maleat..... 4 mg  
Guafenesin..... 100 mg  
Tá dược..... vừa đủ..... 1 viên

**CHỈ ĐỊNH:**  
- Ho khan, ho do dị ứng, ho do cảm cúm.  
- Ho có đờm trong viêm phổi, viêm phế quản, ho do hút thuốc lá quá nhiều.


**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**  
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lần x 3-4 lần /ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.


**ẢNH HƯỞNG:** Nạp khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

25 vỉ x 4 viên nén bao phim

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**



- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng




**Traphaco**

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**

SBK:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

ĐỂ XÁT TÂM TAY TRẒ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG


**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
75 Yên Ninh - Bồ Đảm - Hồ Nội - TP. (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811542  
Tư vấn khách hàng: 18004412  
Số 1 xuất tại Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội



KT hộp: 100mm x 90mm x 80mm



### MẪU VĨ NHÔM NHÔM VIÊN NÉN BAO PHIM THUỐC HO METHORPHAN - Vĩ 4 viên



KT vĩ: 83mm x 70mm

### MẪU TỜ ĐÍNH KÈM VĨ NHÔM NHÔM 4 VIÊN NÉN BAO PHIM THUỐC HO METHORPHAN

4 viên nén bao phim

**THUỐC HO**  
**METHORPHAN**

- ▶ Giảm ho
- ▶ Long đờm
- ▶ Chống dị ứng

**Traphaco™**

---

**CÔNG THỨC:**  
 Dextromethorphan hydrobromid 15mg  
 Chlorpheniramin maleat..... 4mg  
 Guaiphenesin.....100mg  
 Tá dược.....vừa đủ.....1 viên

**CHỈ ĐỊNH:**  
 - Ho khan, ho do dị ứng, ho do cảm cúm.  
 - Ho có đờm trong viêm phổi, viêm phế quản, ho do hút thuốc lá quá nhiều.

**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**  
 Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lần x 3-4 lần /ngày.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội / Tel: (84-4) 35610724 / Fax: (84-4) 36811542  
 Tư vấn khách hàng: 180066112  
 Sản xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hải - Hoàng Mai - Hoàng Mai - Hà Nội

KT: 165mm x 70mm



**Traphaco**

Toa hướng dẫn sử dụng

Hồ sơ đăng ký Thuốc ho Methorphan

## THUỐC HO METHORPHAN

**TRÌNH BÀY:** Hộp 1,2,5,10 vi x 10 viên nén bao film.

Hộp 1,5,10,25 vi x 4 viên nén bao film.

**CÔNG THỨC:** cho 1 viên

Dextromethorphan hydrobromid	15mg
Chlorpheniramin maleat	4mg
Guaiphenesin	100mg

Tá dược (Lactose, Tinh bột, Avicel, Sodium starch glycolat, Aerosil, Magnesi stearat, Talc, HPMC, PEG 6000, Titan dioxyd, màu FD&C green N<sub>0</sub> 3, màu quinolein lake) .....vđ ..1 viên

**TÁC DỤNG:**

Thuốc ho Methorphan là thuốc trị ho phối hợp gồm 3 thành phần:

- Dextromethorphan hydrobromid: có tác dụng trị ho do có tác dụng lên trung tâm ho ở hành não, có tác dụng tương đương với Codein nhưng không gây nghiện, ít gây tác dụng phụ ở đường tiêu hóa hơn, hiệu quả tác dụng kéo dài hơn (6 – 8 giờ/ 1 liều uống một lần)

- Guaiphenesin (hay Glyceryl Guaiacolate): có tác dụng làm loãng sự nhày dính của đờm và các dịch tiết khác của phế quản khiến việc tống xuất chúng được dễ dàng hơn, thuận lợi cho việc rút ngắn điều trị ho. Đồng thời làm dịu đường hô hấp đang bị kích ứng.

- Chlorpheniramin maleat: là một chất kháng histamin có tác dụng chống ho nguồn gốc dị ứng do tác động lên thụ thể H<sub>1</sub> ngoại biên.

**CHỈ ĐỊNH:**

- Ho khan, ho do dị ứng, ho do cảm cúm
- Ho có đờm trong viêm phổi, viêm phế quản, ho do hút thuốc lá quá nhiều

**LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:**

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/ lần x 3-4 lần /ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người bệnh đang cơn hen cấp
- Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt
- Glacom góc hẹp
- Tắc cổ bàng quang
- Loét dạ dày chít, tắc môn vị tá tràng



**Traphaco**

Hồ sơ đăng ký Thuốc ho Methorphan

Người bệnh đang điều trị các thuốc ức chế MAO

- Người cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ đẻ thiếu tháng

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

- Các tác dụng phụ bao gồm một số rối loạn đường tiêu hóa và thần kinh trung ương có thể xảy ra như buồn nôn; khô miệng; mệt mỏi; chóng mặt; nhịp tim nhanh; đỏ bừng; tác dụng làm dịu, thay đổi từ lơ mơ đến ngủ li bì có thể xảy ra nhưng sẽ giảm bớt sau vài ngày khi ngừng sử dụng thuốc. Ngoài ra hiếm gặp các tác dụng phụ sau: Nổi mào đay, ngoại ban.

*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*

**THẬN TRỌNG:**

- Thuốc có thể gây buồn ngủ, mắt nhanh nhẹn, các bệnh nhân dùng thuốc ho Methorphan không nên lái xe, vận hành máy móc.
- Clorpheniramin có thể làm tăng nguy cơ bí tiểu tiện do tác dụng phụ chống tiết acetylcholin của thuốc, đặc biệt ở người bị phì đại tuyến tiền liệt, tắc đường niệu, tắc môn vị tá tràng và làm trầm trọng thêm ở người bệnh nhược cơ.
- Tác dụng an thần của Clorpheniramin tăng lên khi uống rượu và khi dùng đồng thời với các thuốc an thần khác.
- Người bệnh có nguy cơ biến chứng đường hô hấp hoặc đang bị suy giảm hô hấp và ngừng thở.
- Có nguy cơ sâu răng ở những người bệnh điều trị thời gian dài, do tác dụng chống tiết acetylcholin, gây khô miệng.
- Tránh dùng cho người bệnh bị tăng nhãn áp như bị Glacom.
- Người bệnh bị ho có quá nhiều đờm và ho mạn tính ở người hút thuốc, hen hoặc tràn khí
- Dùng Dextromethorphan có liên quan đến giải phóng Histamin và nên thận trọng với trẻ em bị dị ứng.
- Lạm dụng và phụ thuộc Dextromethorphan có thể xảy ra (tuy hiếm), đặc biệt do dùng liều cao kéo dài

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

- Chỉ dùng cho người mang thai khi thật cần thiết. Dùng thuốc trong ba tháng cuối của thai kỳ có thể dẫn đến những phản ứng nghiêm trọng (như con động kinh) ở trẻ sơ sinh. Nên thận trọng khi dùng thuốc với các chế phẩm có chứa Ethanol.
- Không dùng cho phụ nữ đang cho con bú

**TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC**

Thuốc có thể gây buồn ngủ, mắt nhanh nhẹn, các bệnh nhân dùng thuốc ho Methorphan không nên lái xe, vận hành máy móc.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

- Tránh dùng đồng thời với các thuốc ức chế MAO.



**Traphaco**

*Hồ sơ đăng ký Thuốc ho Methorphan*

Dùng đồng thời với Ethanol, các thuốc ức chế thần kinh trung ương hoặc các thuốc an thần gây ngủ có thể tăng cường tác dụng ức chế thần kinh trung ương.

Quinidin ức chế cytochrom P<sub>450</sub>2D6 có thể làm giảm chuyển hóa dextromethorphan ở gan, làm tăng nồng độ chất này trong huyết thanh làm tăng tác dụng không mong muốn của dextromethorphan.

- Thuốc ho Methorphan có chứa Chlorpheniramin gây ức chế chuyển hóa phenytoin, có thể dẫn tới ngộ độc phenytoin.
- Thuốc có thành phần guaifenesin có thể cho kết quả dương tính giả ở xét nghiệm đo acid vanilylmandelic trong nước tiểu. Cần ngừng dùng guaifenesin 48h trước khi lấy mẫu nước tiểu để làm xét nghiệm này.

**QUÁ LIỀU:**

*Quá liều Dextromethorphan:*

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: liều tối đa 120 mg/24 giờ.

Triệu chứng quá liều : Buồn nôn, nôn, an thần, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiểu tiện, trạng thái mê, ảo giác, mất điều hòa, suy hô hấp, co giật.

Điều trị: Hỗ trợ, dùng naloxon (tác dụng đối kháng opiat) liều 2 mg tiêm tĩnh mạch, cho dùng nhắc lại nếu cần tới tổng liều 10 mg.

*Quá liều Chlorpheniramin:*

Những triệu chứng và dấu hiệu quá liều bao gồm an thần, kích thích nghịch thường hệ TKTW, loạn tâm thần, cơn động kinh, ngừng thở, co giật, tác dụng chống tiết acetylcholin, phản ứng loạn trương lực và trụy tim mạch, loạn nhịp.

Điều trị triệu chứng và hỗ trợ chức năng sống, cần chú ý đặc biệt đến chức năng gan, thận, hô hấp, tim và cân bằng nước, điện giải.

Rửa dạ dày hoặc gây nôn bằng siro ipecacuanha. Sau đó, cho dùng than hoạt và thuốc tẩy để hạn chế hấp thu.

Khi gặp hạ huyết áp và loạn nhịp, cần được điều trị tích cực. Có thể điều trị co giật bằng tiêm tĩnh mạch diazepam hoặc phenytoin. Có thể phải truyền máu trong những ca nặng

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: Ngõ 15, đường ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội



**PHÓ CỤC TRƯỞNG**  
*Nguyễn Văn Thanh*

