

MINOVIR 300 mg

Hộp 01 vỉ x 07 viên nén bao phim

Kích thước: 110 x 73 x 15 mm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19 / 09 / 18

110.00 mm

15.00 mm

73.00 mm

15.00 mm

Rx Thuốc bán theo đơn

MINOVIR 300 mg

Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg
Hộp 01 vỉ x 07 viên nén bao phim



MINOVIR 300 mg

CÔNG TY TNHH HASAN - DERMAPHARM
Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

MINOVIR 300 mg

Số lô SX - Batch No. :
NSX - Mfg. Date :
HD - Exp. Date :

Thành phần

Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg
Tá dược vd 1 viên

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều lượng, Cách dùng, Tương tác, Tác dụng không mong muốn, Thận trọng và các thông tin khác:
Xin đọc hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn cơ sở.
SDK - Reg. No.:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC
KHI DÙNG!

Composition

Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg
Excipients q.s. 1 tablet

Indications, Contraindications, Dosage and Administration, Interactions, Undesirable effects, Precautions and other information: Read carefully the enclosed leaflet.

Store in a dry, below 30°C. Protect from light.
Manufacturer's specification.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE !



8 936024 139148 5

MINOVIR 300 mg

HASAN - DERMAPHARM CO., LTD.
Road No. 2, Dong An Industrial Park, Binh Duong, Vietnam



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Trần Đình Hiếu

MINOVIR 300 mg

Hộp 10 vỉ x 07 viên nén bao phim
Kích thước: 110 x 73 x 75 mm

110.00 mm

75.00 mm

73.00 mm

Rx Thuốc bán theo đơn

MINOVIR 300 mg

Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg
Hộp 10 vỉ x 07 viên nén bao phim



MINOVIR 300 mg

Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg
10 blisters x 07 film-coated tablets



HASAN - DERMAPHARM CO., LTD.
Road No. 2, Dong An Industrial Park, Binh Duong, Vietnam

MINOVIR 300 mg

Thành phần
Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg
Tá dược vd 1 viên

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều lượng, Cách dùng, Tương tác, Tác dụng không mong muốn, Thận trọng và các thông tin khác: Xin đọc hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn cơ sở.
SDK - Reg. No.:

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!**



CÔNG TY TNHH HASAN - DERMAPHARM
Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Trần Đình Hoàng

MINOVIR 300 mg

Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg
Hộp 10 vỉ x 07 viên nén bao phim

Số lô SX - Batch No.:
NSX - Mfg. Date:
HD - Exp. Date:



CÔNG TY TNHH HASAN - DERMAPHARM
Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

Rx Prescription only

MINOVIR 300 mg

Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg
10 blisters x 07 film-coated tablets



MINOVIR 300 mg

Composition
Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg
Excipients q.s. 1 tablet

Indications, Contraindications, Dosage and Administration, Interactions, Undesirable effects, Precautions and other information: Read carefully the enclosed leaflet.

Store in a dry, below 30°C. Protect from light.
Manufacturer's specification.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE!**



HASAN - DERMAPHARM CO., LTD.
Road No. 2, Dong An Industrial Park, Binh Duong, Vietnam

10/10/2023

Mẫu nhãn vỉ 7 viên : **MINOVIR 300 mg**

Kích thước : 105 x 67 mm



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. *Trần Đình Hiên*



bệnh nhân nhiễm phân, vì vậy chỉ sử dụng thuốc khi lợi ích vượt hơn hẳn nguy cơ. Khuyết cáo không nên dùng thuốc ở bệnh nhân suy thận nặng ($Cr_{\text{cre}} < 30$ ml/phút) và bệnh nhân nhiễm phân màu, nếu bắt buộc phải sử dụng, cần điều chỉnh thời gian dùng thuốc và theo dõi chức năng thận chặt chẽ.

Nghiên cứu ở những bệnh nhân bị nhiễm HIV, tenofovir disoproxil fumarat làm tăng nguy cơ giảm mật độ chất khoáng xương ở hông và cột sống. Cần phải đo điều trị thay thế ở những bệnh nhân loãng xương có nguy cơ cao gây xương.

Không chắc chắn về những độc tính lâu dài của tenofovir disoproxil fumarat lên xương/ thận và khả năng phục hồi của các độc tính trên thận khi sử dụng ở trẻ em. Vì vậy, cần cần nhắc nguy cơ và lợi ích khi điều trị và chọn lựa phương pháp theo dõi phù hợp, kể cả quyết định ngưng thuốc và sử dụng phương pháp điều trị thay thế. Cần theo dõi chức năng thận (độ thanh thải creatinin, phosphat huyết (tham)) trước và trong quá trình điều trị tương tự như ở người lớn. Nếu phosphat huyết < 3,0 mg/dl (0,96 mmol/l), cần đánh giá lại chức năng thận trong vòng 1 tuần bao gồm glucose huyết, kali huyết, glucose máu. Không khuyến cáo sử dụng thuốc ở trẻ em suy thận. Cần nhắc điều trị gần đoạn ruột phát hiện bất thường chức năng thận hoặc suy thận tiến triển không rõ nguyên nhân. Các khuyến cáo tránh phối hợp với các thuốc gây độc thận tương tự như ở người lớn, thuốc cũng có thể gây giảm mật độ xương và tăng nguy cơ gãy xương. Nếu phát hiện bất thường về xương, cần thông báo ngay cho bác sĩ.

Đã tiến hành toàn và hiệu quả về việc sử dụng tenofovir disoproxil fumarat còn hạn chế ở bệnh nhân ghép gan, bệnh nhân nhiễm HBV, Kém gan mật, những bệnh nhân này tăng nguy cơ gặp phải các tác dụng không mong muốn nghiêm trọng trên gan và thận. Trong khi điều trị, các đợt bùng phát trong của bệnh viêm gan B mạn tính xảy ra khá phổ biến và đặc trưng bởi tăng ALT huyết thanh. ALT huyết thanh cũng có thể tăng khi điều trị với thuốc kháng virus ở một số bệnh nhân. Ở người suy giảm chức năng gan còn bù, tăng ALT huyết thanh thường không đi kèm với tăng bilirubin huyết thanh hoặc bệnh gan mất bù. Bệnh nhân xơ gan có nguy cơ cao dẫn đến gan mất bù và viêm gan cấp, cần được theo dõi chặt chẽ trong quá trình điều trị với một số thuốc kháng virus không nên ngưng điều trị vì có thể gây viêm gan cấp tính dẫn đến bệnh gan mất bù. Không có dữ liệu an toàn về việc sử dụng thuốc ở bệnh nhân đồng nhiễm viêm gan B và viêm gan C hoặc viêm gan D.

Do nguy cơ đề kháng HIV, tenofovir disoproxil fumarat chỉ nên dùng phối hợp với thuốc kháng virus khác ở bệnh nhân đồng nhiễm HIV-1 và viêm gan B. Có thể tăng nguy cơ bất thường chức năng gan ở bệnh nhân nếu có rối loạn chức năng gan từ trước, bao gồm viêm gan mạn tính tiến triển. Nếu có bất thường chức năng gan, cần xem xét điều trị giảm liều hoặc ngưng điều trị.

Phối hợp tenofovir disoproxil fumarat và ledipasvir/ sofosbuvir có thể gây tăng nồng độ tenofovir trong huyết tương, đặc biệt khi sử dụng trong phác đồ điều trị HIV có chứa thuốc lamivudin được đồng đồng học (ritonavir hoặc cobicistat). An toàn của việc phối hợp tenofovir disoproxil fumarat và các thuốc trên chưa được chứng minh. Cần nhắc nguy cơ và lợi ích khi phối hợp tenofovir disoproxil fumarat, ledipasvir/ sofosbuvir và một thuốc khác ức chế HIV protease (atazanavir hoặc darunavir), đặc biệt ở bệnh nhân rối loạn chức năng thận.

Thăng cân, tăng lipid huyết và glucose huyết có thể xảy ra khi điều trị với tenofovir disoproxil fumarat, nhưng thay đổi này một phần có thể liên quan đến lối sống và quá trình kiểm soát bệnh. Một quần thể nhân quả giữa thuốc và các tác động này vẫn chưa được xác định.

Nhóm thuốc nucleotid/ nucleosid tổng hợp có thể ảnh hưởng đến chức năng ty thể. Đã có các báo cáo về rối loạn chức năng ty thể ở trẻ sơ sinh mắc tình HIV khi tiếp xúc với các thuốc nucleotid/ nucleosid tổng hợp trong từ cung hoặc sau khi sinh. Các phản ứng có hại chính được báo cáo ở trẻ bao gồm rối loạn huyết học (thiếu máu, giảm bạch cầu), rối loạn chuyển hóa (tăng lactat huyết, tăng lipase huyết), các tác động này thường thoáng qua. Rối loạn thần kinh hiếm khi xảy ra (tăng trương lực cơ, co giật, hành vi bất thường) và chưa rõ

các tác động này thường thoáng qua hay kéo dài vĩnh viễn.

Trong giai đoạn khởi đầu sử dụng phác đồ phối hợp các thuốc kháng retrovirus, có thể xảy ra các phản ứng viêm gây ra bởi các yếu tố gây bệnh có hội đồng các bệnh nghiêm trọng hoặc lây nhiễm (ví dụ viêm chứng ở bệnh nhân nhiễm HIV suy giảm miễn dịch nặng (VI đư viêm võng mạc do cytomegalovirus, nhiễm mycobacteria, viêm phổi do *Pneumocystis jirovecii*). Thông thường, các phản ứng này xảy ra trong vòng vài tuần hoặc vài tháng đầu tiên điều trị. Các triệu chứng viêm nên được đánh giá và điều trị khi cần thiết. Rối loạn ty thể (bệnh Graves) cũng được báo cáo, tuy nhiên thời gian khởi phát có thể lâu hơn và xảy ra nhiều tháng sau khi điều trị.

Các trường hợp hoại tử đã được báo cáo, đặc biệt ở những bệnh nhân nhiễm HIV tiến triển hoặc sử dụng phác đồ điều trị phối hợp các thuốc kháng retrovirus mặc dù nguyên nhân bệnh sinh có thể do nhiều yếu tố (dùng corticosteroid, uống rượu, ức chế miễn dịch nghiêm trọng, chỉ số cân nặng cao). Bệnh nhân cần thông báo ngay bác sĩ nếu có các triệu chứng đau nhức, đau khớp, cứng khớp hoặc gãy khớp/khẩn trong việc đi chuyển.

Tenofovir disoproxil fumarat chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân trên 65 tuổi, người cao tuổi thường có nguy cơ cao bị suy thận, cần thận trọng khi điều trị.

Cần phẩm Minoxidil 300 mg có chứa lactose, không sử dụng ở bệnh nhân mắc các rối loạn di truyền hiếm gặp về dung nạp galactose, thiếu hụt lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ mang thai
Kết quả từ các nghiên cứu trên 300 - 1000 phụ nữ mang thai sử dụng tenofovir disoproxil fumarat cho thấy không xuất hiện dị tật hay độc tính lên thai nhi hay trẻ sơ sinh. Nghiên cứu trên động vật cho thấy không có độc tính lên sinh sản. Minoxidil 300 mg có thể được sử dụng trong quá trình mang thai nếu cần thiết.

Phụ nữ cho con bú
Tenofovir disoproxil fumarat bài tiết được qua sữa mẹ. Không có dữ liệu tin cậy về những tác động của tenofovir disoproxil fumarat lên trẻ sơ sinh. Vì vậy, không nên sử dụng Minoxidil 300 mg ở phụ nữ cho con bú. Tuy nhiên, theo quy định chung, phụ nữ nhiễm HIV và HBV khuyến cáo không nên cho con bú để tránh bị lây nhiễm HIV và HBV cho trẻ.

ANH HƯỞNG CỦA THUỐC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

Chưa có nghiên cứu nào về tác động của tenofovir disoproxil fumarat lên khả năng lái xe. Tuy nhiên, bác sĩ cần thông báo cho bệnh nhân và người cơ không lái xe khi xảy ra khi điều trị bằng tenofovir disoproxil fumarat, trong trường hợp này, thân trọng khi lái xe, vẫn hành máy móc, làm việc trên cao hoặc các công việc có thể gây nguy hiểm khác.

TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC KHÁC

Dựa theo các nghiên cứu *in vitro* và com đường đào thải của tenofovir disoproxil fumarat, các tương tác thuốc liên quan đến CYP450 thấp.

Các phối hợp không được khuyến cáo:

Minoxidil 300 mg không nên sử dụng đồng thời với các thuốc khác có chứa tenofovir disoproxil fumarat, tenofovir alafenamid và adefovir dipivoxil.
Didanosin: Phối hợp với tenofovir làm tăng đáng kể giá trị C_{max} và AUC của didanosin, gây tăng độc tính (viêm tụy, bệnh thần kinh, đôi khi có thể gây tử vong). Phối hợp với liều 400 mg didanosin/ ngày gây giảm số lượng tế bào CD4+. Giảm liều didanosin xuống 250 mg kết hợp với tenofovir có thể dẫn đến thất bại trong điều trị nhiễm virus HIV-1.

Các thuốc được đào thải qua thận: Phối hợp tenofovir disoproxil fumarat với các thuốc gây suy giảm chức năng thận hoặc cạnh tranh bài tiết chủ yếu ở ống thận thông qua các protein vận chuyển HOAT1, HOAT3 hoặc MRP4 (cidofovir) có thể làm tăng nồng độ trong huyết thanh của tenofovir và/hoặc các thuốc đồng dùng.
Aminoglycosid, amphotericin B, fosfomicin, ganaclovir, pentamidin, vancomycin, cidofovir hoặc interferon-2. Tránh sử dụng tenofovir disoproxil fumarat khi đang hoặc vừa sử dụng thuốc gây độc thận.

Zalcitabine: Có thể gây ảnh hưởng đến chức năng thận, cần theo dõi chặt chẽ khi sử dụng đồng thời với tenofovir disoproxil fumarat.

Các tương tác khác:

Azidothymidine: Azidothymidine làm tăng nồng độ tenofovir và có thể gây ra các tác dụng không mong muốn của tenofovir liên quan đến liều lượng, bao gồm rối loạn chức năng thận, cần theo dõi chặt chẽ chức năng thận khi phối hợp. Tenofovir làm giảm nồng độ của azidothymidine trong huyết tương.

Lopinavir/ritonavir hoặc darunavir/ritonavir: Tenofovir không làm thay đổi đáng kể được động học của lopinavir/ritonavir hoặc darunavir/ritonavir, ngược lại nồng độ tenofovir tăng khi phối hợp.

Emtricitabine: Không có tương tác có ý nghĩa về mặt lâm sàng nào khi phối hợp tenofovir và emtricitabine.

Indinavir: Làm tăng nồng độ tenofovir và giảm nồng độ indinavir trong huyết tương.

Lamivudin: Tenofovir làm giảm nồng độ lamivudin trong huyết tương.

Thuốc kháng virus viêm gan sởi và C:

Phối hợp ledipasvir/ sofosbuvir với atazanavir/ ritonavir (hoặc darunavir/ritonavir) và emtricitabine/ tenofovir disoproxil fumarat làm tăng nồng độ tenofovir trong huyết tương, có thể tăng tác dụng không mong muốn của tenofovir disoproxil fumarat như rối loạn chức năng thận. Vì vậy, nên thận trọng và thường xuyên theo dõi chức năng thận.

Phối hợp ledipasvir/ sofosbuvir với efavirenz/ emtricitabine/ tenofovir disoproxil fumarat làm tăng nồng độ tenofovir trong huyết tương, có thể tăng tác dụng phụ khi phối hợp với tenofovir bao gồm rối loạn chức năng thận. Vì vậy, nên thận trọng và thường xuyên theo dõi chức năng thận.

Phối hợp sofosbuvir với efavirenz/ emtricitabine/ tenofovir disoproxil fumarat. Không cần hiệu chỉnh liều.

Emtricitabine, efavirenz, nevirapin, saquinavir, melitadon, ribavirin, rifampicin, tacrolimus, hoặc các hormon noreggestinal/ ethinyl estradiol: Không có tương tác có ý nghĩa lâm sàng khi phối hợp tenofovir với các thuốc trên.

Thuốc an: Làm tăng sinh khả dụng của tenofovir disoproxil fumarat.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Nhiễm HIV-1 và viêm gan B: Đã có báo cáo về các biến cố suy thận và bệnh suy lượn gan, kể cả hội chứng Fanconi, thỉnh thoảng có thể dẫn đến bất thường xương (mệt mỏi và trương lực cơ yếu xương). Cần theo dõi chức năng thận ở bệnh nhân dùng Minoxidil 300 mg. Bệnh lý lượn gan thường có thể phức tạp hoặc cải thiện sau khi ngưng thuốc, tuy nhiên đôi thanh thải creatinin giảm có thể không được phục hồi hoàn toàn trong một số trường hợp. Những bệnh nhân có nguy cơ suy thận (có yếu tố nguy cơ, bệnh HIV tiến triển hoặc sử dụng đồng thời các thuốc gây độc thận) tăng nguy cơ không phục hồi hoàn toàn chức năng thận sau khi ngưng thuốc.
Nhiễm HIV-1: Khoảng 1/3 số bệnh nhân có thể có những tác động bất lợi khi điều trị tenofovir disoproxil fumarat kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác. Các phản ứng này thường là những biến cố tiêu hóa từ nhẹ đến vừa, trong đó khoảng 1% bệnh nhân phải ngưng thuốc. Phối hợp với didanosin không được khuyến cáo vì có thể làm tăng các tác dụng không mong muốn, đặc biệt là viêm tụy, nhiễm acid lactic và đôi khi có thể dẫn đến tử vong. Sử dụng các thuốc kháng retrovirus có thể gây tăng cân, tăng nồng độ lipid huyết và glucose huyết. Các trường hợp hoại tử xương cũng đã được báo cáo ở những bệnh nhân sử dụng phác đồ phối hợp thuốc kháng retrovirus.

Nhiễm gan B: Khoảng 1/4 số bệnh nhân gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc, phần lớn ở mức độ nhẹ, thường gặp nhất là buồn nôn (5,4%). Các đợt cấp tính viêm gan đã được báo cáo ở những bệnh nhân đang hay ngưng điều trị viêm gan B.
Các tác dụng không mong muốn đã được quan sát, báo cáo trong quá trình điều trị bằng tenofovir disoproxil fumarat và được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp (ADR > 1/10), thường gặp (1/100 ≤ ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 ≤ ADR < 1/100), hiếm gặp (1/10000 ≤ ADR < 1/1000) và rất hiếm gặp (ADR < 1/10000).
Chuyển hóa và dinh dưỡng: ha phosphat huyết (rất thường gặp), hạ kali huyết (ít gặp), nhiễm acid lactic (hiếm gặp), *Thiếu kẽm*, cholestyrol máu (rất thường gặp), đau đầu (thường gặp), *Tiền hóa*, tiêu chảy, nôn mửa, buồn nôn (rất thường gặp), đau bụng, chóng mặt, đầy

hơi (thường gặp), viêm tụy (ít gặp). *Gan:* tăng transaminase (thường gặp), gan nhiễm mỡ viêm gan (hiếm gặp), *Da và mô dưới da:* ban da (rất thường gặp), phù mạch (hiếm gặp), *Cơ xương và mô liên kết:* tiêu cơ vân, yếu cơ (ít gặp), mềm xương (thể hiện bởi triệu chứng đau xương và có thể dẫn đến gãy xương), bệnh cơ (hiếm gặp), *Thận và tiết niệu:* tăng creatinin, bệnh ống lượn gần (bao gồm hội chứng Fanconi) (ít gặp), suy thận cấp, suy thận, hoại tử ống thận cấp, viêm thận (bao gồm viêm thận kẽ), đái tháo nhạt có nguồn gốc thận (hiếm gặp). *Khác:* suy nhược (rất thường gặp), Mệt mỏi (thường gặp).

Thử sai:

HIV-1: Kết quả đánh giá từ các nghiên cứu sử dụng tenofovir disoproxil fumarat điều trị HIV-1 ở trẻ em cho thấy các tác dụng không mong muốn tương tự như ở người lớn. Giảm tỉ trọng xương và giảm tốc độ lọc cầu thận phức hồi khi ngưng điều trị cũng được báo cáo trong các nghiên cứu.
Viêm gan B: Kết quả đánh giá từ các nghiên cứu sử dụng tenofovir disoproxil fumarat điều trị HBV ở trẻ em cho thấy các tác dụng không mong muốn tương tự như ở người lớn. Giảm tỉ trọng xương cũng được báo cáo trong các nghiên cứu.
Các nhóm đối tượng khác:
+ Người cao tuổi: Chưa có nghiên cứu với nhóm bệnh nhân trên 65 tuổi.
+ Bệnh nhân suy thận: Do tenofovir disoproxil fumarat có thể gây độc thận, cần theo dõi chức năng thận khi điều trị ở người lớn. Không khuyến cáo sử dụng tenofovir disoproxil fumarat ở trẻ em suy thận.
+ Thuốc có thể gây dị ứng do có tá được màu vàng tartrazin.

QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ LÝ

Triệu chứng
Có ít dữ liệu trên lâm sàng về việc sử dụng liều cao hơn liều điều trị (300 mg tenofovir disoproxil fumarat). Trong các nghiên cứu sử dụng tenofovir disoproxil fumarat đồng thời tìm mạch liều 16,7 mg/kg/ ngày trong 7 ngày và liều uống 600 mg/ ngày trong 28 ngày, không phát hiện thấy các tác dụng không mong muốn. Liều cao hơn chưa được nghiên cứu.

Cách xử trí

Trong trường hợp quá liều, bệnh nhân nên được theo dõi các dấu hiệu độc tính của thuốc và sử dụng các biện pháp điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ nếu cần thiết. Tenofovir disoproxil fumarat có thể loại bỏ bằng cách thẩm phân máu, tốc độ thải trừ trung bình bằng thẩm phân máu là 134 ml/phút. Chưa rõ tenofovir disoproxil fumarat có thể loại bỏ bằng phương pháp thẩm phân phúc mạc hay không.

LƯU Ý

Không dùng thuốc quá liều chỉ định.
Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.
Đã xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

BẢO QUẢN

Nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.


HẠN DỤNG

36 tháng (kể từ ngày sản xuất).

TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn cơ sở.

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



CÔNG TY TNHH HASAN - DERMAPHARM
Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

MINOVIR 300 mg

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.
Độc kỵ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THÀNH PHẦN, HÂM LƯỢNG CỦA THUỐC
Dược chất: Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg (tương đương 245 mg tenofovir disoproxil và 136 mg tenofovir).
Tá dược: Lactose monohydrat, cellulose, HPMC 615, HPMC K30, natri croscarmellose, magnesi stearat, PEG 6000, titan dioxide, talc, oxyd sắt đỏ màu xanh lá cây fast green, màu vàng tartrazin.

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Viên nén hình caplet, bao phim màu trắng - hai mặt lõm, cạnh và thành viên láng lán.

QUY CÁCH DÙNG
- Hộp 01 vỉ x 07 viên nén dài bao phim V và M (A/A).
- Hộp 10 vỉ x 07 viên nén dài bao phim V và M (A/A).

THUỐC DÙNG CHO BỆNH CH
- Minovir 300 mg chứa được chất tenofovir disoproxil fumarat, là một thuốc kháng virus để điều trị nhiễm HIV, viêm gan B hay cả hai. Tenofovir là một nucleotide ức chế enzyme phiên mã ngược và hoạt động bằng cách can thiệp vào quá trình làm việc của các enzyme có vai trò quan trọng cho việc sinh sản của virus (enzym phiên mã ngược trong HIV, DNA polymerase trong viêm gan B). Minovir 300 mg nên kết hợp với các thuốc khác để điều trị nhiễm HIV.

- Người lớn.
- Trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, khi các thuốc điều trị hàng đầu không còn hiệu quả do kháng thuốc hoặc gặp phải các tác dụng không mong muốn.

- Minovir 300 mg điều trị viêm gan B mạn tính do virus viêm gan B gây ra ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.
- Minovir 300 mg không phải là phương pháp điều trị bệnh nhiễm HIV, trong khi dùng thuốc ban đầu có thể giảm tải lượng virus hoặc các bệnh khác liên quan đến HIV và vẫn có thể lây nhiễm HIV hay HBV cho người khác, cần có các biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO
Luôn dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Kiểm tra lại với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn không chắc chắn về cách dùng thuốc.

Liều dùng
- Người lớn: 1 viên/ngày, uống trong bữa ăn (bữa ăn chính hay bữa ăn nhẹ).
- Trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, cân nặng ≥ 35 kg: 1 viên/ngày, uống trong bữa ăn (bữa ăn chính hay bữa ăn nhẹ).

Cách dùng
- Uống nguyên viên thuốc với nước, trong bữa ăn.
- Nếu bạn gặp khó khăn khi nuốt, bạn có thể nghiền thuốc, sau đó pha bột thuốc vào khoảng 100 ml nước (nước cốt nước) hoặc nước cam, nước chanh và uống ngay.

- Luôn dùng đúng theo liều hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo thuốc đạt hiệu quả tối nhất và giảm thiểu nguy cơ có kháng thuốc. Không được tự ý thay đổi liều trị khi theo hướng dẫn của bác sĩ.
- Người lớn có các bệnh về thận, bác sĩ sẽ cân nhắc thay đổi thời gian dùng thuốc (kéo dài thời gian giữa các liều).
- Nếu bạn nhiễm HBV, bác sĩ có thể yêu cầu bạn xét nghiệm HIV để biết được bạn có đồng nhiễm HIV và HBV hay không.
- Không được tự ý ngưng sử dụng thuốc mà không có ý kiến bác sĩ, điều này có thể làm giảm tác dụng điều trị của thuốc.
- Nếu bạn nhiễm HBV hoặc đồng nhiễm HIV và HBV, tuyệt đối không nên tự ý ngưng sử dụng thuốc. Một số bệnh nhân đã có các

triệu chứng hoặc kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm gan trở nên tồi tệ hơn sau khi ngưng sử dụng thuốc. Vì vậy, bạn có thể được yêu cầu thực hiện các xét nghiệm máu trong vòng vài tháng sau khi ngưng điều trị. Ở một số bệnh nhân bệnh gan hoặc xơ gan tiến triển, không khuyến cáo ngưng điều trị vì có thể làm trầm trọng hơn bệnh viêm gan. Cần thông báo cho bác sĩ trước khi muốn ngưng thuốc do bất kỳ nguyên nhân nào, đặc biệt nếu bạn gặp phải các tác dụng không mong muốn hoặc mắc phải các bệnh khác. Thông báo cho bác sĩ nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ngưng thuốc, đặc biệt đối với các triệu chứng liên quan đến bệnh viêm gan B và thông báo cho bác sĩ trước khi bạn sử dụng thuốc trở lại.

CHỈ ĐƯỢC DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ
Dùng với tenofovir, tenofovir disoproxil fumarat hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Bao bì đựng các thuốc có chứa tenofovir disoproxil fumarat, tenofovir alafenamid hoặc adefovir dipivoxil.
- Trẻ em dưới 12 tuổi.

TÁ DƯỢC KHÔNG MONG MUỐN
Trong quá trình điều trị nhiễm HIV, bạn có thể bị tăng cân, tăng lượng lipid hoặc lượng đường trong máu, điều này có thể do kết quả của giai đoạn phục hồi bệnh hoặc lối sống.

Cần thông báo cho bác sĩ ngay nếu bạn gặp phải các tác dụng không mong muốn sau:
- Nhiễm toan lactic (dư thừa acid lactic trong máu) hiếm gặp (có thể ảnh hưởng 1 - 10 người trong 10000 người), tuy nhiên có thể gây ra các tác dụng không mong muốn nghiêm trọng có thể gây tử vong. Các triệu chứng của nhiễm acid lactic:
+ Thở nhanh, sâu.
+ Buồn nôn.
+ Buồn nôn, nôn, đau dạ dày.

Một số tác dụng không mong muốn nghiêm trọng khác cần lưu ý:
- **Li gộp (có thể ảnh hưởng 1 - 10 người trong 1000 người):** Đau bụng (do viêm tụy), hoạt tử tế bào ống thận.
- **Hiếm gặp (có thể ảnh hưởng 1 - 10 người trong 10000 người):** Viêm thận, ít tiểu nhiều và cảm giác khát nước; có các thay đổi về nước tiểu, đau lưng gây ra bởi các bệnh về thận (kể cả suy thận); mệt mỏi, đau xương và đôi lúc có thể gây gãy xương), gan nhiễm mỡ.

Nếu bạn gặp phải các tác dụng không mong muốn nghiêm trọng trong trên, cần thông báo cho bác sĩ.
Các tác dụng không mong muốn khác:
- **Rối loạn giấc ngủ (có thể ảnh hưởng nhiều hơn 1 người trong 10 người):** Tiêu chảy, buồn nôn, chóng mặt, phát ban, yếu mệt, giảm phosphat huyết.
- **Thường gặp (có thể ảnh hưởng 1 - 10 người trong 100 người):** Nhức đầu, đau bụng, mệt mỏi, chướng bụng, đầy hơi, bất thường chức năng gan.
- **Li gộp (có thể ảnh hưởng 1 - 10 người trong 1000 người):** Tiêu cơ, đau cơ, yếu cơ, giảm kali huyết, tăng creatinin huyết, bất thường chức năng tụy.

Hiếm gặp (có thể ảnh hưởng 1 - 10 người trong 10000 người): Đau bụng do viêm gan, sưng mắt, môi, lưỡi và họng.
NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO
GỈ KHÁNG SỬ DỤNG THUỐC NÀY
Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những thuốc bạn đang hoặc vừa sử dụng gần đây, bao gồm thuốc không kê đơn, vì Minovir 300 mg có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc khác và ngược lại nếu sử dụng đồng thời.
Nếu bạn nhiễm đồng thời HBV và HIV, không nên ngưng bất kỳ thuốc điều trị HIV nào mà bạn đang sử dụng theo chỉ định của bác sĩ khi bắt đầu điều trị với Minovir 300 mg.
- Không được dùng Minovir 300 mg nếu bạn đang dùng các thuốc khác có chứa tenofovir disoproxil fumarat hoặc tenofovir alafenamid, adefovir dipivoxil (thuốc điều trị viêm gan B mạn tính).
- Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc nếu bạn đang dùng các thuốc gây độc thận sau:

+ Aminoglycosid, pentamidin hoặc vancomycin (thuốc kháng sinh).
+ Amphoterin B (thuốc điều trị nhiễm nấm).
+ Foscaferin, ganciclovir hoặc cidofovir (thuốc kháng virus).
+ Inerteukin-2 (thuốc điều trị ung thư).
+ Adefovir dipivoxil (thuốc trị viêm gan B).
+ Tacrolimus (thuốc ức chế hệ thống miễn dịch).
+ Thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) để giảm đau xương hay đau cơ.

- Các loại thuốc có chứa didanosin (điều trị nhiễm HIV); Dùng Minovir 300 mg với các loại thuốc kháng virus khác có chứa didanosin có thể tăng nồng độ didanosin trong máu và làm giảm số lượng tế bào CD4. Viêm tụy, nhiễm toan lactic khi xảy ra, đôi khi tử vong khi kết hợp tenofovir disoproxil fumarat với didanosin.
- Cần thông báo cho bác sĩ nếu bạn đang dùng thuốc ledipasvir, sofosbuvir, atazanavir, danavir, ritonavir, emtricitabin, efavirenz để điều trị viêm gan C, indinavir, lopinavir, entecavir, lamivudin (các thuốc kháng retrovirus khác).

CẦN LƯU Ý KHI MỘT LẦN QUÊN DÙNG THUỐC
- Bạn cần tuân thủ tuyệt đối chế độ dùng thuốc và không nên quên thuốc. Trong trường hợp quên dùng thuốc, nếu thời điểm nhớ ra dưới 12 giờ so với thời điểm thường dùng, uống ngay sau khi nhớ ra. Nếu bạn quên uống thuốc trên 12 giờ so với thời điểm thường dùng, bỏ qua liều đã quên và tiếp tục uống liều tiếp theo như thường lệ.
- Nếu bạn quên uống 1 giờ sau khi uống thuốc, cần uống liều Minovir 300 mg khác. Nếu nôn quá 1 giờ sau khi uống thuốc, không cần dùng liều thay thế.

CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO
- Nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.
- Không sử dụng thuốc sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên hộp thuốc hay vì thuốc.
- Không nên vứt bỏ thuốc vào nước thải hay rác sinh hoạt. Hỏi ý kiến dược sĩ cách bỏ thuốc không sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU
Có ít dữ liệu về quá liều tenofovir disoproxil fumarat trên người. Tuy nhiên khi sử dụng quá liều, có thể gia tăng nguy cơ gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc.

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO
Thông báo cho bác sĩ hoặc liên lạc ngay với phòng cấp cứu bệnh viện địa phương. Mang theo bao bì còn sót lại của thuốc để bác sĩ biết được chính xác chẩn đoán dựa vào liều thuốc đã dùng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY
- Bạn vẫn có thể gây lây nhiễm HIV trong khi dùng thuốc mặc dù nguy cơ lây nhiễm đã giảm thiểu. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn các cách bảo vệ và thận trọng để tránh lây nhiễm HIV cho người khác. Tương tự, Minovir 300 mg không được chứng minh làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho người khác qua đường tình dục hoặc đường máu, cần áp dụng các biện pháp tránh lây nhiễm cẩn thận.
- Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn có bệnh thận hay xét nghiệm phát hiện có vấn đề với chức năng thận. Không dùng Minovir 300 mg cho trẻ em có vấn đề về thận. Trước khi bắt đầu điều trị, cần xét nghiệm máu để đánh giá chức năng thận. Minovir 300 mg cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng thận của bạn, vì vậy, bác sĩ cần theo dõi chức năng thận trong quá trình điều trị. Ở người lớn có các bệnh về thận, bác sĩ sẽ điều chỉnh chế độ liều bằng cách kéo dài khoảng thời gian giữa các liều thuốc. Không được tự ý giảm liều khi không có chỉ định của bác sĩ và không nên phớt lờ ý kiến của dược sĩ hoặc dược sĩ nếu có nguy cơ độc cho thận (xem thêm mục "Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này").

- Ở người lớn nhiễm HIV khi dùng phối hợp với thuốc kháng virus có thể gây bệnh hoat tử xương (các mô xương chết do thời gian cung cấp máu). Một số bệnh nhân có nguy cơ cao do thời gian điều trị kéo dài, sử dụng corticosteroid, uống rượu, suy giảm miễn dịch nặng, chỉ số cân nặng cao. Các triệu chứng bao gồm cứng khớp.

đau nhức (đặc biệt là hông, đầu gối, vai) và khó khăn trong việc vận động. Các vấn đề về xương (thỉnh thoảng gây gãy xương) có thể xảy ra do tổn thương các tế bào ống thận.
- Thông báo với bác sĩ nếu bạn có tiền sử bệnh gan, viêm gan. Bệnh nhân nhiễm gan B, C mạn tính, điều trị với thuốc kháng virus có nguy cơ gặp phải các biến chứng gan nặng gây tử vong, cần tiến hành xét nghiệm máu theo dõi chức năng gan.

- Nếu bạn bị nhiễm HIV (AIDS) kèm theo nhiễm khuẩn, các triệu chứng của bệnh nhiễm khuẩn và viêm có thể xuất hiện hoặc trầm trọng hơn trong khi bắt đầu điều trị với Minovir 300 mg. Các triệu chứng này là dấu hiệu cho việc có thể bạn đang kháng lại sự nhiễm khuẩn. Chú ý các dấu hiệu của viêm hoặc nhiễm khuẩn ngay sau khi bắt đầu dùng Minovir 300 mg và thông báo với bác sĩ nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường.

- Nhiễm trùng cơ hội, rối loạn tự miễn (hệ thống miễn dịch tự tấn công các mô khỏe mạnh của cơ thể) cũng có thể xảy ra sau khi bắt đầu dùng thuốc điều trị nhiễm HIV. Rối loạn tự miễn có thể diễn ra nhiều tháng sau khi bắt đầu điều trị. Nếu có bất kỳ triệu chứng nhiễm trùng hay các triệu chứng khác như yếu cơ bắt đầu từ bàn chân và bàn tay sau đó di chuyển lên thân, đánh trống ngực, run, tăng động, cần thông báo cho bác sĩ.

- Chưa có các nghiên cứu về sử dụng thuốc ở người > 65 tuổi. Nếu dùng thuốc ở những đối tượng này, bác sĩ cần theo dõi chặt chẽ quá trình điều trị của bạn.
- Minovir 300 mg không sử dụng để điều trị nhiễm HIV hoặc nhiễm HBV ở trẻ em dưới 12 tuổi.

- Chế phẩm Minovir 300 mg có chứa lactose, thông báo cho bác sĩ nếu bạn được chẩn đoán mắc các bệnh về không dung nạp một số loại đường (galactose, glucose...) vì thuốc không được sử dụng trên các đối tượng này.

Phụ nữ mang thai: Các dữ liệu nghiên cứu sử dụng thuốc trên phụ nữ mang thai còn hạn chế. Thông báo cho bác sĩ nếu bạn đang mang thai, nghĩ rằng mình mang thai hoặc có kế hoạch mang thai. Nếu bạn đang dùng Minovir 300 mg khi mang thai, cần thực hiện xét nghiệm máu và các xét nghiệm chẩn đoán khác thường xuyên để phát hiện sự bất thường của thai nhi. Ở trẻ có mẹ dùng các thuốc nhóm nucleotide/ nucleosid trong thời gian mang thai, lợi ích chống lại HIV (lợi hơn những rủi ro có thể xảy ra).

Phụ nữ cho con bú: Không nên cho con bú trong khi điều trị với Minovir 300 mg do thuốc qua sữa mẹ. Nếu bạn bị nhiễm HIV hay HBV, không nên cho con bú để tránh truyền virus cho trẻ.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc: Minovir 300 mg có thể gây chóng mặt. Nếu xảy ra với bạn, không nên lái xe, vận hành máy móc, làm việc trên cao hoặc các công việc có thể gây nguy hiểm khác.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ
- Người cao tuổi.
- Có các bệnh về gan, thận hoặc có tiền sử mắc các bệnh này.
- Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú.
- Loãng xương.

Có các bệnh về không dung nạp một số loại đường.
HẠN DÙNG
36 tháng (kể từ ngày sản xuất).



CÔNG TY TNHH HASAN - DERMAPHARM
Đường số 2, KCN Đông An, Bình Dương, Việt Nam