

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
Để xa tầm tay trẻ em.*

REGATONIC Soft Cap.

SĐK: VD-18562-13

◆ THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất:

| | |
|--|---------|
| L-Citrulline | 10mg |
| Pyridoxine HCl | 25mg |
| DL- α -Tocopheryl acetate (Vitamin E) | 25mg |
| N-acetyl-L-aspartic acid | 10mg |
| Retinyl acetate (Vitamin A) | 2.500IU |
| Cao Vaccinium myrtillus | 100mg |

Tá dược:

Dầu đậu nành, lecithin, dầu cọ, dầu đậu nành hydro hóa một phần, sáp ong trắng, gelatin, glycerin đậm đặc, D-sorbitol, ethyl vanillin, titan dioxyd, màu xanh dương số 1, màu vàng số 5, màu đỏ số 40, methylparaben, propylparaben, nước tinh khiết.

◆ CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ điều trị một số bệnh lý về mắt: cận thị, quáng gà, mờ mắt, suy giảm thị lực do thoái hóa võng mạc ngoại vi hoặc trung tâm, bệnh võng mạc do tiểu đường.

◆ LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG

1 viên x 3 lần mỗi ngày.

Thời gian điều trị là 14 ngày mỗi tháng, sau đó lặp lại nếu cần.

◆ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân bị quá mẫn với thuốc này. Bệnh nhân bị thừa Vitamin A.

◆ THẬN TRỌNG

1. *Sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân sau:*

Trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Bệnh nhân đang dùng thuốc khác có chứa vitamin A.

2. *Thận trọng chung:*

Theo đúng liều lượng và cách dùng được đề nghị.

Khi sử dụng thuốc cho trẻ em, cần có sự giám sát của người lớn.

◆ PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Sử dụng > 10.000 IU vitamin A (Retinol)/ngày ở phụ nữ có thai có thể gây ra dị dạng bào thai, do đó không nên sử dụng > 10.000 IU/ngày ở phụ nữ trong 3 tháng đầu của thai kỳ hoặc phụ nữ nghi ngờ có thai (ngoại trừ những bệnh nhân bị thiếu vitamin A).

◆ TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không có.

◆ TÁC DỤNG PHỤ

Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, ngứa có thể xảy ra ở một số trường hợp tuy nhiên rất hiếm. Khi có các triệu chứng này xảy ra, nên ngưng dùng thuốc.

** Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*

◆ TƯƠNG TÁC THUỐC

Thuốc này có thể làm giảm tác dụng của L-Dopa. Do đó, không nên sử dụng thuốc này đồng thời với chế phẩm chứa L-Dopa.

Thuốc tránh thai uống có thể làm tăng nhu cầu về pyridoxine.

Vitamin E có thể có tác dụng đối kháng với vitamin K.

Sử dụng quá mức lượng dầu khoáng có thể làm giảm hấp thu vitamin E.

Neomycin, cholestyramine, paraffin lỏng có thể làm giảm hấp thu Vitamin A trong cơ thể. Các thuốc tránh thai đường uống làm tăng nồng độ của Vitamin A trong huyết tương.

◆ QUÁ LIỀU

Buồn ngủ, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích, nhức đầu, mờ sáng và co giật, ỉa chảy... Phải ngừng dùng thuốc. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

◆ BẢO QUẢN: Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30°C.

◆ HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

◆ ĐÓNG GÓI: 10 viên/vi, 6 vi và 9 vi/hộp.

Sản xuất tại

Công ty TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.