

127/138

R

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 18.../...01.../...2013



M.S.D.N. 0500 31400 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
HÀ TÂY
HÀ NỘI - TP. HÀ NỘI

TVhepatic

L-Omithine L-Aspartate 450mg
12 BLISTERS OF 05 SOFTGELS



60 Softgels

- ACUTE HEPATITIS
- CHRONIC HEPATITIS
- CIRRHOSIS, FATTY LIVER
- HEPATIC ENCEPHALOPATHY

Composition
L-Omithine L-Aspartate 450mg
Excipients q.s.

Indications, Contraindications, Dosage, Administration - See the package insert inside.

Keep out of reach of children. Carefully read the accompanying instructions before use.

Specifications, Manufacturer, Storage - See in a dry place below 25°C.


DVT
Được sản xuất và phân phối bởi CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
MALAY PHARMAS CLINICAL S.S. S.C
Hà Nội - Hà Đông - Hà Nội
Hà Nội - Hà Đông - Hà Nội City

L-Omithine L-Aspartate 450mg

TVhepatic

TVhepatic

L-Omithine L-Aspartate 450mg
12 VỈ X 05 VIÊN MANG MIỀM



60 viên

- BỆNH GAN MẠN TÍNH
- XƠ GAN, GAN NHIỄM MỠ
- BỆNH GAN GẮP-TÍNH
- BỆNH NAÓ GAN

Thành phần
L-Omithine L-Aspartate 450mg
Tất cả các chất khác q.s.

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng - Liều dùng - Xem hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

ĐỂ XA TÂM TAY BÉ EM ĐƯỢC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Liều chuẩn áp dụng 30°C

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C.

30X 8mg No
Số đăng ký: 127/138
Phạm Ngọc Anh
Hàng nhập khẩu



Hướng dẫn sử dụng thuốc
TVHEPATIC

- **Dạng thuốc:** Viên nang mềm.
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm.
- **Thành phần:** Mỗi viên nang mềm chứa:

L-Ornithin L-Aspartat	450mg
Tá dược vđ	1viên

(Tá dược gồm: Dầu đậu nành, sáp ong, lecithin, aerosil, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol, nước tinh khiết, titan dioxyd, ethyl vanilin, nipagin, nipasol, phẩm màu chocolate, phẩm màu Tartrazin, phẩm màu Sunset yellow, ethanol 90%).

- **Chỉ định:** Hỗ trợ trong điều trị các trường hợp:
 - Viêm gan cấp và mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan.
 - Viêm gan siêu vi, viêm gan do thuốc, do rượu và do hoá chất...
 - Tình trạng chán ăn, mệt mỏi, suy nhược cơ thể do suy tế bào gan.
 - Giải độc gan do rượu.
- **Cách dùng và liều dùng:** Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Trung bình:
Uống mỗi lần 1-2 viên x 1-3 lần/ngày, tùy theo tuổi và triệu chứng bệnh.
Đợt dùng 3-4 tuần. Trong trường hợp bệnh nặng có thể dùng liều gấp đôi.
- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Suy giảm chức năng thận.
- **Thận trọng:** Nếu dùng thuốc không thấy có tiến triển tốt, khi có triệu chứng khó chịu xảy ra hoặc có tác dụng không mong muốn nên ngừng thuốc và hỏi ý kiến của thầy thuốc.
- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Thuốc chỉ dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bú khi thật cần thiết theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Thuốc có thể gây rối loạn tiêu hoá nhẹ, nôn, hoặc buồn nôn.
- * **Ghi chú:** "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".
- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Chưa có tài liệu báo cáo.
- **Quá liều và xử trí:** Chưa có tài liệu báo cáo.
- **Hạn dùng:** 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.
- * **Lưu ý:** Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, dính nang, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C.
- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522203 FAX: 04.33522203

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng giám đốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Nguyễn Bá Lai