


Rx Thuốc kê đơn



VINCOLIN

Citicolin 500mg



22/6/2016

JL



CHỈ ĐỊNH:

- Các rối loạn ý thức do chấn thương đầu
- hoặc sau phẫu thuật não.
- Rối loạn mạch máu não, thiếu máu cục bộ do đột quỵ.
- Bệnh Parkinson có biểu hiện run nặng.

Số đăng ký: VD-23090-15

Nhà Sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

Địa chỉ: số 777 Đường Mê Linh, P. Khai Quang,

TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ nhà máy: Thôn Mẫu Thông, P. Khai Quang,

TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 02113 861233 * Fax: 02113 862774

Nhà phân phối:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO ĐỎ

Địa chỉ: Lô 11 - Đường Công Nghiệp 4

Khu Công Nghiệp Sài Đồng B - Phường Thạch Bàn

Quận Long Biên - Hà Nội



Thành phần: Cho một viên chứa

Được chất: Citicolin natri 522,53 mg

Tinh thể: Tinh thể 500mg Citicolin

Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim

Đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Được lực học: Citicolin là một dẫn xuất của cholin và cytidin được tham gia vào sinh tổng hợp lecithin. Thuốc làm tăng lưu lượng máu và tiêu thụ oxy trong não, được sử dụng trong điều trị rối loạn mạch máu não (bao gồm đột quỵ thiếu máu cục bộ), bệnh parkinson và chấn thương đầu.

Được động học:

- **Hấp thu:** Citicolin sau khi uống được thủy phân thành cholin và cytidin, các chất này được hấp thu gần như hoàn toàn.
- **Phân bố:** Sau khi hấp thu, cholin và cytidin phân bố rộng khắp trong cơ thể. Thuốc có thể qua hàng rào máu não để tổng hợp thành citicolin trong não. Citicolin khi vào hệ thống thần kinh trung ương sẽ kết hợp vào các phân phospholipid màng tế bào và các microsom.
- **Chuyển hóa:** Citicolin được chuyển hóa ở ruột non và gan tạo thành cholin và cytidin.
- **Thải trừ:** 30% được thải trừ qua phân và nước tiểu, còn lại lưu giữ trong các mô hoặc được dùng để tổng hợp phospholipid.

Chỉ định:

- Các rối loạn ý thức do chấn thương đầu hoặc sau phẫu thuật não.
- Rối loạn mạch máu não, thiếu máu cục bộ do đột quỵ.
- Bệnh Parkinson có biểu hiện run nặng.

22/6/2016

TL

Liều dùng - cách dùng:

Dùng 1 viên/lần, 1 - 2 lần/ngày, uống ngay sau khi ăn, hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Thận trọng:

Citicolin không làm hạ huyết áp kéo dài nên không thể thay thế được các thuốc uống tăng huyết áp. Trong trường hợp xuất huyết nội sọ không dùng được liều cao citicolin (trên 500mg một lần) do thuốc có thể làm tăng lưu lượng máu não. Trong trường hợp này, nên chia nhỏ liều dùng (100 đến 200mg x 2 đến 3 lần trong ngày).

Thời kỳ mang thai và cho con bú: Không dùng thuốc

Người vận hành tàu xe, máy móc: Thuốc có thể gây nhức đầu, mệt mỏi. Không lái xe hay vận hành máy móc khi gặp bất kỳ tác dụng không mong muốn nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Citicolin nói chung rất dễ dung nạp. Trong một số trường hợp, có rối loạn nhẹ ở ống tiêu hóa (buồn nôn, nôn, rối loạn thượng vị, tiêu chảy), mệt, đau yếu, nhức đầu, kích động. Thỉnh thoảng có thể gặp hạ huyết áp kèm nhịp tim chậm hoặc nhịp tim nhanh.

"Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Tương tác thuốc:

Không phối hợp citicolin với meclofenoxat.

Không phối hợp citicolin với các thuốc cường phổ giao cảm.

Do citicolin làm tăng hiệu lực của levodopa nên cần thận trọng khi phối hợp hai loại thuốc này.

Tương kỵ: Chưa có báo cáo

Quá liều và xử trí: Chưa có báo cáo

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh nắng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS